

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยวัย 0-5 ปี จำแนกตามอายุ

อายุ (ปี)	กลุ่ม	แผนกกุมารเวชศาสตร์		หน่วยกุมารจิตเวช	
		จำนวน (ราย)	ร้อยละ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
แรกเกิด - 1		17	42.5	2	5.4
1 - 2		13	32.5	5	13.5
2 - 3		6	15.0	5	13.5
3 - 4		2	5.0	16	43.2
4 - 5		2	5.0	9	24.3
รวม		40	100	37	100

จากตารางแสดงว่า ผู้ป่วยวัย 0-5 ปี ที่มารับบริการที่แผนกกุมารเวชศาสตร์ ส่วนมากอายุแรกเกิดถึง 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาคือ อายุ 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.5 น้อยที่สุดคือ อายุ 3-4 ปี และ 4-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.0 เท่ากัน ผู้ป่วยวัย 0-5 ปี ที่มารับบริการที่หน่วยกุมารจิตเวชส่วนมากอายุ 3-4 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.2 รองลงมาคือ อายุ 4-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.3 และน้อยที่สุดคือ อายุแรกเกิด-1 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.4

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยวัย 0-5 ปี จำแนกตามเพศ

เพศ	กลุ่ม	แผนกกุมารเวชศาสตร์		หน่วยกุมารจิตเวช	
		จำนวน (ราย)	ร้อยละ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
ชาย		24	60	28	75.7
หญิง		16	40	9	24.3
รวม		40	100	37	100

จากตารางแสดงว่า ผู้ป่วยวัย 0-5 ปี ที่มารับบริการที่แผนกกุมารเวชศาสตร์ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คือ เพศชายร้อยละ 60 และเพศหญิงร้อยละ 40 ผู้ป่วยที่มารับบริการที่หน่วยกุมารจิตเวช เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเช่นเดียวกัน คือ เพศชายคิดเป็นร้อยละ 75.7 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 24.3

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยวัย 0-5 ปี จำแนกตามลำดับการเกิดในครอบครัว

ลำดับการเกิดในครอบครัว	กลุ่ม	แผนกกุมารเวชศาสตร์		หน่วยกุมารจิตเวช	
		จำนวน (ราย)	ร้อยละ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
บุตรคนแรก		30	75.0	22	59.5
บุตรคนที่สอง		7	17.5	14	37.8
บุตรคนที่สาม		2	5.0	-	-
บุตรคนที่สี่		-	-	-	-
บุตรคนที่ห้า		1	2.5	1	2.7
รวม		40	100	37	100

จากตารางแสดงว่า ผู้ป่วยวัย 0-5 ปี ที่มารับบริการที่แผนกกุมารเวชศาสตร์ ส่วนมากเป็นบุตรคนแรกของครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาคือ เป็นบุตรคนที่สอง คิดเป็นร้อยละ 17.5 น้อยที่สุดคือ บุตรคนที่ 5 มีเพียงร้อยละ 2.5 ที่หน่วยกุมารจิตเวช ส่วนมากเป็นบุตรคนแรกของครอบครัว เช่นเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมาคือ เป็นบุตรคนที่สอง คิดเป็นร้อยละ 37.8 และน้อยที่สุดคือ เป็นบุตรคนที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 2.7

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยวัย 0-5 ปี จำแนกตามจำนวนบุตรในครอบครัว

จำนวนบุตรในครอบครัว	กลุ่ม	แผนกกุมารเวชศาสตร์		หน่วยกุมารจิตเวช	
		จำนวน (ราย)	ร้อยละ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
หนึ่งคน		29	72.5	12	32.4
สองคน		8	20.0	21	56.8
สามคน		2	5.0	3	8.1
สี่คน		-	-	-	-
ห้าคน		1	2.5	-	-
เก้าคน		-	-	1	2.7
รวม		40	100	37	100

จากตารางแสดงว่า ครอบครัวของผู้ป่วยวัย 0-5 ปี ที่มารับบริการที่แผนกกุมารเวชศาสตร์ ส่วนมากมีบุตรเพียงคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 72.5 มีบุตรสองคน คิดเป็นร้อยละ 20 น้อยที่สุดคือ มีบุตรห้าคน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ที่หน่วยกุมารจิตเวชส่วนมากมีบุตรสองคน คิดเป็นร้อยละ 56.8 รองลงมาคือ มีบุตรคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 32.4 และน้อยที่สุดคือ มีบุตรเก้าคน คิดเป็นร้อยละ 2.7

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยวัย 0-5 ปี ที่มารับบริการที่แผนกกุมารเวชศาสตร์
จำแนกตามการวินิจฉัยโรค หรือการมารับบริการ

โรคหรือการมารับบริการ	จำนวน	ร้อยละ
คลินิกสุขภาพเด็กดี	13	32.5
รับภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบ	4	10.0
ไข้	4	10.0
โรคผิวหนัง	4	10.0
โรกระบบทางเดินหายใจ	5	12.5
โรกระบบทางเดินอาหาร	2	5.0
โรคไต	3	7.5
โรกระบบทางเดินปัสสาวะ	3	7.5
**อื่น ๆ	2	5.0
รวม	40	100

** หมายถึง โรคหัดและตาแดง

จากตาราง แสดงว่าผู้ป่วยวัย 0-5 ปี ที่มารับบริการที่แผนกกุมารเวชศาสตร์ส่วนมาก
มารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี จำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมาคือ โรค
ระบบทางเดินหายใจ จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5

ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยวัย 0-5 ปี ที่มารับบริการที่หน่วยกุมารจิตเวช
แผนกจิตเวชศาสตร์ จำแนกตามการวินิจฉัยโรค

การวินิจฉัย	จำนวน	ร้อยละ
Delay Development	8	21.62
Autistic	12	32.43
Sexual Abuse	1	2.70
Normal child	3	8.11
School Refusal	1	2.70
Delay Speech & ADD	1	2.70
Delay speech	4	10.81
Habitual disorder	1	2.70
Elective mutism & emotional disorder	1	2.70
ADD	1	2.70
Stuttering	1	2.70
Enuresis	1	2.70
Temper Tantrum	1	2.70
Aggressive behavior	1	2.70
รวม	37	100

จากตาราง แสดงว่าผู้ป่วยวัย 0-5 ปี ที่มารับบริการที่หน่วยกุมารจิตเวช มาด้วย
Autistic มากที่สุด จำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.43 รองลงมาคือ Delay
development จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.62

ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยวัย 0-5 ปี ที่มารับบริการที่หน่วยกุมารจิตเวช
แผนกจิตเวชศาสตร์ จำแนกตามพฤติกรรมที่ผู้ป่วยแสดงบ่อยครั้ง

34

พฤติกรรม	จำนวน	ร้อยละ
พัฒนาการช้ากว่าเด็กที่อยู่ในวัยเดียวกัน	7	18.92
กระดูกที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น ขยิบตา ทำหน้าขยุกขยิก หรือถอนหายใจบ่อย ๆ	1	2.70
กัดเล็บ	2	5.41
เล่นอวัยวะเพศบ่อย ๆ	2	5.41
กินมากเกินไป	1	2.70
เลือกหรือปฏิเสธอาหาร	12	32.43
มีปัญหากลืน	18	48.65
ฝันร้าย	1	2.70
ปัญหาการนอน	1	2.70
กลัวหรือวิตกกังวลเกินไป	5	13.51
ไม่ร้องไห้ เคลื่อนไหวเชิงซ้ำหรือขาดความกระปรี้กระเปร่า	4	10.81
เรียกร้องความสนใจมาก	7	18.92
ทำถูทึ้งมือลงเท้าหรืออารมณ์ร้อน	4	10.81
ไม่เชื่อฟัง	6	16.22
ทำลายสิ่งของเมื่อโกรธหรือไม่พอใจ	1	2.70
รังแกหรือทำร้ายผู้อื่น	3	8.11
ต้องการอะไรต้องได้ทันที ทนต่อความคับข้องใจไม่ได้	9	24.32
ขบถ่ายไม่เป็นที่	1	2.70
ไม่อยู่นิ่ง ลุกลุกกลนมากหรืออยู่ไม่สุข	9	24.32
ฟังพาผู้ใหญ่มากเกินไป	3	8.11

จากตารางแสดงว่า ผู้ป่วยมีปัญหากลืนจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.65
รองลงมาคือ เลือกหรือปฏิเสธอาหารคิดเป็นร้อยละ 32.43

ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละของบิดาจำแนกตามอายุ

อายุ (ปี)	กลุ่ม	แผนกกุมารเวชศาสตร์		หน่วยกุมารจิตเวช	
		จำนวน (ราย)	ร้อยละ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
20 - 25		9	22.5	-	-
26 - 30		14	35.0	8	21.6
31 - 35		13	32.5	9	24.3
36 - 40		3	7.5	15	40.5
41 - 45		1	2.5	4	10.8
46 - 50		-	-	1	2.7
รวม		40	100	37	100

จากตารางแสดงว่า บิดาของผู้ป่วยวัย 0-5 ปี ที่มารับบริการที่แผนกกุมารเวชศาสตร์ ส่วนมากอายุระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.5 น้อยที่สุดคือ บิดาที่มีอายุระหว่าง 41-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.5 ที่หน่วยกุมารจิตเวช บิดาส่วนมากอายุระหว่าง 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.3 น้อยที่สุดคือ บิดาที่มีอายุระหว่าง 46-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.7

ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละของบิดาจำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด



ระดับการศึกษา	กลุ่ม	แผนกกุมารเวชศาสตร์		หน่วยกุมารจิตเวช	
		จำนวน (ราย)	ร้อยละ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
ประถมศึกษา		12	30.0	5	13.5
มัธยมศึกษา		14	35.0	6	16.2
อาชีวศึกษา		5	12.5	3	8.1
ปริญญาตรี		7	17.5	16	43.2
ปริญญาโท		1	2.5	2	5.4
อื่น ๆ		* 1	2.5	** 4	10.8
ไม่ได้รับการศึกษา		-	-	1	2.7
รวม		40	100	37	100

* หมายถึง เหน็ดเหนื่อย

** หมายถึง อนุปริญญา พ.บ. เติร์มมอดุมจากต่างประเทศ และแพทยศาสตร์

จากตารางแสดงว่า บิดาของผู้ป่วยวัย 0-5 ปี ที่มารับบริการที่แผนกกุมารเวชศาสตร์ ส่วนมากมีระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30.0 น้อยที่สุดคือระดับปริญญาโท และเหน็ดเหนื่อย คิดเป็นร้อยละ 2.5 เท่ากัน ที่หน่วยกุมารจิตเวช บิดาของผู้ป่วยส่วนมากมีระดับการศึกษาสูงสุดคือ ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 43.2 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 16.2 และน้อยที่สุดคือ ไม่ได้รับการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.7

ตารางที่ 10 จำนวนและร้อยละของบิดาจำแนกตามอาชีพ

อาชีพ	กลุ่ม	แผนกกุมารเวชศาสตร์		หน่วยกุมารจิตเวช	
		จำนวน (ราย)	ร้อยละ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ		9	22.5	11	29.7
เกษตรกร		1	2.5	-	-
ธุรกิจส่วนตัว		3*	7.5	9**	24.3
ค้าขาย		6	15.0	5	13.5
กรรมกรหรือรับจ้าง		21	52.5	9	24.3
ไม่ได้ประกอบอาชีพ		-	-	3	8.1
รวม		40	100	37	100

* หมายถึง ธุรกิจ โรงเรียน โรงกลึง และทนาย

** หมายถึง ธุรกิจรีสอร์ท โรงงานของเล่น ธุรกิจการส่งออกอาหาร บริษัททำเฟอร์นิเจอร์ บริษัทขนส่งทางบก กิจการรถรับจ้าง

จากตารางแสดงว่า บิดาของผู้ป่วยวัย 0-5 ปี ที่มารับบริการที่แผนกกุมารเวชศาสตร์ ส่วนมากประกอบอาชีพกรรมกรหรือรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาคืออาชีพรับราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 22.5 น้อยที่สุด คือ อาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 2.5 ที่หน่วยกุมารจิตเวช บิดาของผู้ป่วยส่วนมากประกอบอาชีพรับราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ คิดเป็น ร้อยละ 29.7 รองลงมาคือ ทำธุรกิจส่วนตัวและกรรมกรหรือรับจ้าง มีจำนวนเท่ากัน คิดเป็น ร้อยละ 24.3 และน้อยที่สุดคือ ไม่ได้ประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 8.1

ตารางที่ 11 จำนวนและร้อยละของครอบครัว จำแนกตามรายได้ต่อเดือนของทั้งครอบครัว
จากงานหลัก

รายได้ (บาท/เดือน)	กลุ่ม	แผนกumarเวชศาสตร์		หน่วยกุมารจิตเวช	
		จำนวน (ราย)	ร้อยละ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
ต่ำกว่า 3,000		5	12.5	2	5.4
3,001 - 5,000		13	32.5	3	8.1
5,001 - 7,000		9	22.5	2	5.4
7,001 - 9,000		5	12.5	4	10.8
9,001 - 11,000		6	15.0	2	5.4
มากกว่า 11,001 ขึ้นไป		2	5.0	24	64.9
รวม		40	100	37	100

จากตารางแสดงว่า ครอบครัวของผู้ป่วยวัย 0-5 ปี ที่มารับบริการที่แผนกกุมาร-เวชศาสตร์ ส่วนมากมีรายได้ต่อเดือน ประมาณ 3,001-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมาคือ รายได้ 5,001-7,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.5 และรายได้มากกว่า 11,001 บาทขึ้นไปมีน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 5.0 ครอบครัวของผู้ป่วยที่หน่วยกุมารจิตเวชส่วนมากมีรายได้ต่อเดือนประมาณมากกว่า 11,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 64.9 รองลงมาคือ รายได้ 7,001-9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.8 และรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาท 5,001-7,000 บาท และ 9,001-11,000 บาท มีจำนวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 5.4 เท่ากัน

ตารางที่ 12 จำนวนและร้อยละของที่มาของรายได้ของครอบครัว

ที่มาของรายได้	กลุ่ม	แผนกกุมารเวชศาสตร์		หน่วยกุมารจิตเวช	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
สามี		20	50.0	18	46.7
ภรรยา		1	2.5	3	8.1
สามีและภรรยา		18	45.0	14	37.8
**อื่น ๆ		1	2.5	2	5.4
รวม		40	100	37	100

** หมายถึง รายได้ส่วนใหญ่มาจากสามีและภรรยาบ้างบางส่วน และจากดอกเบี้ยยธนาคาร

จากตารางแสดงว่า ที่มาของรายได้ของครอบครัวของผู้ป่วยวัย 0-5 ปี ที่มารับบริการที่แผนกกุมารเวชศาสตร์ ส่วนมากมาจากสามี คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ จากสามีและภรรยา คิดเป็นร้อยละ 45.0 น้อยที่สุดคือ รายได้มาจากภรรยาและสามีกับภรรยาบ้างบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 2.5 เท่ากัน ที่หน่วยกุมารจิตเวชรายได้ของครอบครัวส่วนมากมาจากสามี คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมาคือ มาจากสามีและภรรยาคิดเป็นร้อยละ 37.8 และน้อยที่สุดคือ รายได้มาจากสามีและภรรยาบ้างบางส่วน และ ดอกเบี้ยธนาคารคิดเป็นร้อยละ 5.4

ตารางที่ 13 จำนวนและร้อยละของครอบครัว จำแนกตามสมาชิกในครอบครัว

สมาชิกในครอบครัว	กลุ่ม	แผนกกุมารเวชศาสตร์		หน่วยกุมารจิตเวช	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
สามี ภรรยา และบุตร		20	50.0	12	32.4
สามี ภรรยา บุตร และพี่เลี้ยงบุตร		-	-	6	16.2
สามี ภรรยา บุตร และญาติผู้ใหญ่		14	35.0	11	29.7
สามี ภรรยา บุตร ญาติผู้ใหญ่ และพี่เลี้ยงบุตร		4	10.0	6	16.2
อื่น ๆ		*2	5.0	**2	5.4
	รวม	40	100	37	100

* หมายถึง สามี ภรรยา บุตร และอา

** หมายถึง สามี ภรรยา บุตร และน้ำ

จากตารางแสดงว่า ครอบครัวของผู้ป่วยวัย 0-5 ปี ที่มารับบริการที่แผนกกุมารเวชศาสตร์ ประกอบด้วยสามี ภรรยา และบุตร มีจำนวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ ครอบครัวที่ประกอบด้วย สามี ภรรยา บุตร และญาติผู้ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 35.0 และครอบครัวประกอบด้วย สามี ภรรยา บุตร และอา มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.0 ที่หน่วยกุมารจิตเวช ครอบครัวประกอบด้วย สามี ภรรยา และบุตรมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.4 รองลงมาคือ ครอบครัวที่ประกอบด้วย สามี ภรรยา บุตรและญาติผู้ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 29.7 ครอบครัวที่ประกอบด้วยสามี ภรรยา บุตร และน้ำมีจำนวนน้อยที่สุดคือ คิดเป็นร้อยละ 5.4

ตารางที่ 14 จำนวนและร้อยละของบิดา จำแนกตามประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็ก

ประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็ก	กลุ่ม	แผนกกุมารเวชศาสตร์		หน่วยกุมารจิตเวช	
		จำนวน (ราย)	ร้อยละ	จำนวน (ราย)	ร้อยละ
มี		12	30.0	18	48.7
ไม่มี		28	70.0	19	51.4
รวม		40	100	37	100

จากตารางแสดงว่า บิดาของผู้ป่วยวัย 0-5 ปี ที่มารับบริการที่แผนกกุมารเวชศาสตร์ ส่วนมากไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็ก คิดเป็นร้อยละ 70.0 ส่วนบิดาที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กมีเพียงร้อยละ 30.0 ที่หน่วยกุมารจิตเวช บิดาส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 51.4 และบิดาที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กมีเพียงร้อยละ 48.7

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 15 จำนวนและร้อยละของผู้ที่เลี้ยงดูบุตรวัย 0-5 ปี เป็นส่วนใหญ่

ผู้เลี้ยงดู	กลุ่ม	แผนกกุมารเวชศาสตร์		หน่วยกุมารจิตเวช	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดา		-	-	2	5.4
บิดาและมารดา		2	5.0	-	-
มารดา		23	57.5	17	45.9
บิดา, มารดา และญาติผู้ใหญ่		1	2.5	1	2.7
ญาติผู้ใหญ่		9	22.5	6	16.2
บิดาและญาติผู้ใหญ่		-	-	1	2.7
มารดาและพี่เลี้ยงบุตร		1	-	2	5.4
มารดาและญาติผู้ใหญ่		1	2.5	1	2.7
พี่เลี้ยงบุตร		1	2.5	5	13.5
บิดา, มารดาและจ้างเลี้ยง		-	-	1	2.7
จ้างเลี้ยง		3	7.5	-	-
รวม		40	100	37	100

จากตารางแสดงว่า ผู้ที่เลี้ยงดูผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกกุมารเวชศาสตร์ และ หน่วยกุมารจิตเวชเป็นส่วนใหญ่คือ มารดา คิดเป็นร้อยละ 57.5 และ 45.93 ตามลำดับ รองลงมาคือ ญาติผู้ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 27.5 และ 16.2 ตามลำดับ

ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบทบาทบิดาในการเลี้ยงดูบุตร

บทบาทในการเลี้ยงดูบุตร	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
บทบาทด้านการเป็น ผู้หาเลี้ยงครอบครัว	3.07	1.34
บทบาทด้านการเป็นผู้ดูแลและเลี้ยงดูบุตร	3.35	1.38
บทบาทด้านการเป็นผู้ปกป้อง คุ้มครองสมาชิกของครอบครัว	3.57	1.53
บทบาทด้านการเป็นสื่อกลางของ ครอบครัวและสังคม	3.26	1.37

จากตารางแสดงว่า บิดาปฏิบัติบทบาทด้านการเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองสมาชิกของครอบครัวมากที่สุด และปฏิบัติรองลงมา คือ บทบาทด้านการเป็นผู้ดูแลและเลี้ยงดูบุตร

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 17 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทบิดาในการเลี้ยงดูบุตร ของบิดาผู้ป่วย
ทั้งสองแผนก

บทบาทในการเลี้ยงดูบุตร	กลุ่ม	แผนกกุมารเวชศาสตร์		หน่วยกุมารจิตเวช		คะแนน t
		ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	
บทบาทด้านการเป็น ผู้หาเลี้ยงครอบครัว		3.13	1.30	3.01	1.38	0.46 ^{NS}
บทบาทด้านการเป็นผู้ดูแลและเลี้ยงดูบุตร		3.55	1.34	3.13	1.39	1.58 ^{NS}
บทบาทด้านการเป็นผู้ปกป้อง คุ้มครองสมาชิกของครอบครัว		3.65	0.46	3.49	0.38	1.70 ^{NS}
บทบาทด้านการเป็นสื่อกลางของ ครอบครัวและสังคม		3.26	0.37	3.26	0.49	-

NS = Non Significant

จากตารางแสดงว่า บิดาของผู้ป่วยวัย 0-5 ปี ที่มารับบริการที่แผนกกุมารเวชศาสตร์
และหน่วยกุมารจิตเวช ปฏิบัติบทบาทด้านการเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองสมาชิกของครอบครัวมากที่สุด

ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบทบาทบิดาด้านการเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว
จำแนกตามรายชื่อ

บทบาทของบิดา (ข้อ)	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
1. แบ่งและเก็บรายได้ส่วนหนึ่ง ไว้สำหรับบุตร	2.90	1.43
2. วางแผนการใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร	2.90	1.41
3. ประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้ น้อยลงเมื่อมีบุตร	3.39	1.20
4. หารายได้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร	2.99	1.35
5. ลดการเข้าสังคมเมื่อมีบุตร	3.23	1.17
6. เลือกซื้อของที่จำเป็นสำหรับ บุตร เช่น เสื้อผ้า	3.09	1.29
7. จัดหาของเล่นให้บุตร	3.01	1.29

จากตารางแสดงว่า บิดาปฏิบัติบทบาทด้านการเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวในข้อประหยัด
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้น้อยลงเมื่อมีบุตรมากที่สุด รองลงมาคือ การลดการเข้าสังคมเมื่อมีบุตร

ตารางที่ 19 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทบิดาผู้ป่วยทั้งสองแผนก ด้านการเป็น
ผู้หาเลี้ยงครอบครัว จำแนกตามรายชื่อ

บทบาทบิดา (ชื่อ)	กลุ่ม	แผนกกุมารเวชศาสตร์		หน่วยกุมารจิตเวช		คะแนน t
		ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	
1. แบ่งและเก็บรายได้ส่วนหนึ่ง ไว้สำหรับบุตร		3.03	1.40	2.76	1.44	1 ^{NS}
2. วางแผนการใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร		3.08	1.44	2.73	1.35	0.25 ^{NS}
3. ประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้ น้อยลงเมื่อมีบุตร		3.73	1.07	3.03	1.22	2.92 ^{**}
4. หารายได้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร		3.18	1.34	2.78	1.54	1.48 ^{NS}
5. ลดการเข้าสังคมเมื่อมีบุตร		3.35	1.15	3.11	1.18	0.96 ^{NS}
6. เลือกซื้อของใช้ที่จำเป็นสำหรับ บุตร เช่น เสื้อผ้า		2.95	1.12	3.24	1.44	-1.12 ^{NS}
7. จัดหาของเล่นให้บุตร		2.63	1.22	3.43	1.24	-3.2 ^{**}

NS = Non Significant

**p < .05

จากตารางแสดงว่า บทบาทด้านการเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวของบิดาผู้ป่วยวัย 0-5 ปี ที่มารับบริการที่แผนกกุมารเวชศาสตร์ปฏิบัติมากที่สุดคือ ประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้น้อยลงเมื่อมีบุตร และบิดาผู้ป่วยที่หน่วยกุมารจิตเวช ปฏิบัติในข้อจัดหาของเล่นให้บุตรมากที่สุด และบทบาทบิดาในข้อประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้น้อยลงเมื่อมีบุตรและจัดหาของเล่นให้บุตรของบิดาผู้ป่วยทั้งสองแผนกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .05

ตารางที่ 20 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบทบาทบิดาด้านการเป็นผู้ดูแลและเลี้ยงดูบุตร จำแนกตามรายข้อ

บทบาทบิดา (ข้อ)	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
9. แสดงความสนใจบุตร เช่น ทักทาย หรืออุ้มเมื่อกลับจากทำงานนอกบ้าน	4.23	1.06
10. หาเวลาเพื่ออยู่ใกล้ชิดบุตร	4.06	1.12
11. ให้ความสนใจหรือพูดคุยกับบุตร เมื่อบุตรเข้ามาหาขณะที่กำลังทำงาน	3.64	1.34
12. เล่นหยอกล้อกับบุตรด้วยความสนิทสนมเป็นกันเอง	4.29	0.99
13. ปรับอารมณ์ให้ราบเรียบเมื่อโกรธหรือไม่พอใจก่อนติดต่อกับบุตร	3.55	1.28
14. ทำความเข้าใจพฤติกรรม การแสดงออก หรือความต้องการของบุตร เช่น การร้องไห้	3.68	1.16
17. จัดเตรียมอาหารให้บุตรรับประทาน	2.79	1.44
18. อาบน้ำให้บุตร	2.70	1.35
19. จัดเตรียมเสื้อผ้าให้บุตรใส่	2.78	1.30
20. จัดเตรียมที่นอนให้บุตรหรือพาบุตรไปนอน	2.97	1.35

(ต่อ) ตารางที่ 20

บทบาทบิดา (ข้อ)	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
21. ดูแลความเรียบร้อยของบุตรขณะ ที่บุตรนอนหลับ	3.16	1.27
22. ดูแลบุตรแทนภรรยา	2.94	1.25
23. หาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร เพื่อสร้างความมั่นใจในการ เลี้ยงดูบุตร	2.74	1.34

จากตารางแสดงว่า บิดาปฏิบัติบทบาทด้านการเป็นผู้ดูแลและเลี้ยงดูบุตรในข้อ เล่น
หยอกล้อกับบุตร ด้วยความสนิทสนมเป็นกันเองมากที่สุด และรองลงมา คือ แสดงความสนใจบุตร
เช่น ทักทาย หรืออ้อมเมื่อกลับจากทำงานนอกบ้าน

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 21 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทบิดาผู้พลัดถิ่นสองแผนกด้านการเป็น
ผู้ดูแลและเลี้ยงดูบุตร จำแนกตามรายชื่อ

บทบาทบิดา (ข้อ)	กลุ่ม	แผนกกุมารเวชศาสตร์		หน่วยกุมารจิตเวช		คะแนน t
		ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	
9. แสดงความสนใจบุตร เช่น กักตัก หรืออุ้มเมื่อกลับจาก ทำงานนอกบ้าน		4.33	0.98	4.14	1.12	0.83 ^{NS}
10. หาเวลาเพื่ออยู่ใกล้ชิดบุตร		4.38	0.97	3.73	1.18	2.71 ^{**}
11. ให้ความสนใจหรือพูดคุยกับบุตร เมื่อบุตรเข้ามาหาขณะที่กำลัง ทำงาน		3.63	1.46	3.65	1.19	-0.08 ^{NS}
12. เล่นหยอกล้อกับบุตรด้วยความ สนิทสนมเป็นกันเอง		4.48	0.81	4.08	1.12	1.82 ^{NS}
13. ปรับอารมณ์ให้ราบเรียบเมื่อโกรธ หรือไม่พอใจก่อนติดต่อกับบุตร		3.60	1.37	3.49	1.18	0.42 ^{NS}
14. ทำความเข้าใจพฤติกรรม แสดงออก หรือความต้องการ ของบุตร เช่น การร้องไห้		3.65	1.15	3.70	1.16	-0.2 ^{NS}
17. จัดเตรียมอาหารให้บุตรรับประทาน		3.05	1.48	2.51	1.35	2.57 ^{**}
18. อาบน้ำให้บุตร		3.05	1.38	2.32	1.21	2.81 ^{**}
19. จัดเตรียมเสื้อผ้าให้บุตรใส่		3.25	1.16	2.27	1.24	3.92 ^{**}



(ต่อ) ตารางที่ 21

กลุ่ม บทบาทบิดา (ชื่อ)	แผนกกุมารเวชศาสตร์		หน่วยกุมารจิตเวช		คะแนน t
	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	
20. จัดเตรียมที่นอนให้บุตรหรือพาบุตร ไปนอน	3.35	1.24	2.57	1.35	3.0**
21. ดูแลความเรียบร้อยของบุตรขณะ ที่บุตรนอนหลับ	3.35	1.19	2.95	1.31	1.6 ^{NS}
22. ดูแลบุตรแทนภรรยา	3.25	1.24	2.60	1.17	2.6**
23. หาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร เพื่อสร้างความมั่นใจในการ เลี้ยงดูบุตร	2.80	1.36	2.68	1.32	0.46 ^{NS}

NS = Non Significant

**p < .05

จากตารางแสดงว่า บทบาทด้านการเป็นผู้ดูแลและเลี้ยงดูบุตรของบิดาผู้ป่วยวัย 0-5 ปี ที่มารับบริการที่แผนกกุมารเวชศาสตร์ปฏิบัติมากที่สุดคือ เล่นหยอกล้อกับบุตรด้วยความสนิทสนม เป็นกันเอง ส่วนบิดาผู้ป่วยที่หน่วยกุมารจิตเวชปฏิบัติในข้อแสดงความสนใจบุตร เช่น ทักทาย หรือ อุ้มเมื่อกลับจากทำงานนอกบ้านมากที่สุด และบทบาทบิดาในข้อหาเวลาเพื่ออยู่ใกล้ชิดบุตร จัดเตรียมอาหารให้บุตรรับประทาน, อาบน้ำให้บุตร จัดเตรียมเสื้อผ้าให้บุตรใส่ จัดเตรียมที่นอนให้บุตรหรือพาบุตรไปนอน และ ดูแลบุตรแทนภรรยา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น .05

ตารางที่ 22 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบทบาทบิดาด้านการเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองสมาชิกของครอบครัว จำแนกตามรายข้อ

บทบาทบิดา (ข้อ)	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
15. สังเกตอาการหรือสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับบุตร เช่น ปวดท้อง เจ็บคอ	3.97	1.26
16. ปลอบโยนบุตรเมื่อเกิดอารมณ์กลัว เช่น กลัวคน แปลกหน้า, กลัวเสียงดัง	3.86	1.22
24. หาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตราย และการดูแลบุตร ขณะเจ็บป่วย	3.27	1.37
29. ดูแลบุตรเมื่อเจ็บป่วย เช่น เช็ดตัวเมื่อมีไข้, ป้อนยาตามเวลา	3.47	1.44
31. ให้คำแนะนำภรรยาหรือสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร	3.12	1.17
32. ร่วมแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือภรรยา หรือสมาชิกในครอบครัว เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร	3.58	1.29

(ต่อ) ตารางที่ 22

บทบาทบิดา (ข้อ)	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
33. พบบุตรหรือสับสนุนให้ภรรยา หรือญาตินำบุตรไปรับภูมิคุ้มกัน หรือการตรวจรักษาจากแพทย์ เมื่อเจ็บป่วย	4.27	0.95
34. ดูแลซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่อาจ เป็นอันตรายต่อบุตร	3.68	1.30
37. พบบุตรไปเที่ยวในที่ที่เหมาะสม กับเด็ก เช่น สวนสัตว์ สนาม เด็กเล่น	2.94	1.35

จากตารางแสดงว่า บิดาปฏิบัติบทบาทด้านการเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองสมาชิกของครอบครัวมากที่สุด คือ พบบุตรหรือสับสนุนให้ภรรยา หรือญาตินำบุตรไปรับภูมิคุ้มกัน หรือตรวจรักษาจากแพทย์ เมื่อเจ็บป่วย รองลงมา คือ สังเกตอาการหรือสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับบุตร เช่น ปวดท้อง เจ็บคอ

ตารางที่ 23 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทผู้ช่วยทั้งสองแผนกด้านการเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองสมาชิกของครอบครัว จำแนกตามรายชื่อ

บทบาทบิดา (ชื่อ)	แผนกกุมารเวชศาสตร์		หน่วยกุมารจิตเวช		คะแนน t
	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
15. ลังเกตอาการหรือสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับบุตร เช่น ปวดท้อง เจ็บคอ	4.00	1.22	3.95	1.29	0.19 ^{NS}
16. ปลอบโยนบุตรเมื่อเกิดอารมณ์กลัว เช่น กลัวคนแปลกหน้า, กลัวเสียงดัง	3.75	1.28	3.97	1.15	-0.88 ^{NS}
24. หาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตราย และการดูแลบุตรขณะเจ็บป่วย	3.38	1.34	3.16	1.40	0.81 ^{NS}
29. ดูแลบุตรเมื่อเจ็บป่วย เช่น เช็ดตัวเมื่อมีไข้, ป้อนยาตามเวลา	3.75	1.21	3.16	1.59	2.19 ^{**}
31. ให้คำแนะนำภรรยาหรือสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร	3.18	1.20	3.05	1.14	0.52 ^{NS}
32. ร่วมแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือภรรยา หรือสมาชิกในครอบครัว เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร	3.73	1.22	3.43	1.35	1.23 ^{NS}

(ต่อ) ตารางที่ 23

บทรักษา (ชื่อ)	แผนกกุมารเวชศาสตร์		หน่วยกุมารจิตเวช		คะแนน t
	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	
33. พยาทรหรือสนับสนุนให้ภรรยา หรือญาติพาบุตรไปรับภูมิคุ้มกัน หรือการตรวจรักษาจากแพทย์ เมื่อเจ็บป่วย	4.45	0.71	4.08	1.12	1.68 ^{NS}
34. ดูแลซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่อาจ เป็นอันตรายต่อบุตร	3.85	1.19	3.49	1.39	1.38 ^{NS}
37. พาบุตรไปเที่ยวในที่ที่เหมาะสม กับเด็ก เช่น สวนสัตว์ สนาม เด็กเล่น	2.75	1.41	3.14	1.26	-1.5 ^{NS}

NS = Non Significant

**p < .05

จากตารางแสดงว่า บทรักษาด้านการเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองสมาชิกของครอบครัวที่บิดาผู้ป่วยวัย 0-5 ปี
ที่มารับบริการที่แผนกกุมารเวชศาสตร์และหน่วยกุมารจิตเวชปฏิบัติมากที่สุด คือ พยาทรหรือสนับสนุนให้ภรรยาหรือ
ญาติพาบุตรไปรับภูมิคุ้มกันหรือการตรวจรักษาจากแพทย์เมื่อเจ็บป่วย และบทรักษาในข้อดูแลบุตรเมื่อเจ็บป่วย เช่น
เช็ดตัวเมื่อมีไข้, ป้อนยาตามเวลา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .05

ตารางที่ 24 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบทบาทบิดาด้านการเป็นสื่อกลางของ
ครอบครัวและสังคม

บทบาทบิดา (ข้อ)	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรได้ เล่นกับเด็กอื่น ทั้งในวัยเดียว กันและต่างวัย	3.14	1.36
25. ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับบุตร เช่น เล่นของเล่นกับบุตร	3.22	1.25
26. สนับสนุนและให้กำลังใจบุตรให้มี โอกาสทำกิจกรรมใหม่ ๆ ด้วย ตนเอง	3.13	1.39
27. อบรมสั่งสอนให้บุตรทำในสิ่งที่ ถูกต้อง เช่น ไม่รังแกผู้อื่น	3.61	1.41
28. สนับสนุนและชมเชยบุตร เมื่อ ปฏิบัติในสิ่งที่ดี เช่น ยกมือไหว้ แบ่งสิ่งของให้ผู้อื่น ฯลฯ	3.91	1.33
30. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เกี่ยวกับบุตร	3.64	1.30
35. เป็นแบบอย่างแก่คนอื่นในครอบครัว ในการเลี้ยงดูบุตร	2.97	1.30
36. นำบุตรไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้าน หรือญาติพี่น้อง	2.96	1.37

(ต่อ) ตารางที่ 24

บทบาทบิดา (ข้อ)	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
38. ร้องเพลงกล่อม เล่านิทาน หรือ อ่านหนังสือสำหรับเด็กให้บุตรฟัง	2.32	1.19
39. ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร	3.42	1.27
40. ช่วยภรรยาในการสร้างสุขนิสัยที่ดี ให้บุตร เช่น ให้บุตรรับประทาน อาหารให้เป็นเวลา	3.47	1.32

จากตารางแสดงว่าบิดาปฏิบัติบทบาทด้านการเป็นสื่อกลางของครอบครัวและสังคมมากที่สุดข้อในข้อสนับสนุนและชมเชยบุตร เมื่อปฏิบัติในสิ่งที่ดี เช่น ยกมือไหว้ แบ่งสิ่งของให้ผู้อื่น ฯลฯ รองลงมาคือ ข้อมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับบุตร

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 25 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบทบาทบิดาผู้ป่วยทั้งสองแผนก ด้านการเป็น
สื่อกลางของครอบครัวและสังคม

บทบาทบิดา (ข้อ)	กลุ่ม	แผนกกุมารเวชศาสตร์		หน่วยกุมารจิตเวช		คะแนน t
		ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรได้ เล่นกับเด็กอื่น ทั้งในวัยเดียว กันและต่างวัย		3.00	1.43	3.30	1.27	1.15 ^{NS}
25. ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับบุตร เช่น เล่นของเล่นกับบุตร		3.15	1.26	3.30	1.25	-0.63 ^{NS}
26. สนับสนุนและให้กำลังใจบุตรให้มี โอกาสทำกิจกรรมใหม่ ๆ ด้วย ตนเอง		3.00	1.41	3.27	1.35	-1.00 ^{NS}
27. อบรมสั่งสอนให้บุตรทำในสิ่งที่ ถูกต้อง เช่น ไม่รังแกผู้อื่น		3.50	1.52	3.73	1.27	-0.85 ^{NS}
28. สนับสนุนและชมเชยบุตร เมื่อ ปฏิบัติในสิ่งที่ดี เช่น ยกมือไหว้ แบ่งสิ่งของให้ผู้อื่น ฯลฯ		3.78	1.42	4.05	1.21	1.04 ^{NS}
30. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เกี่ยวกับบุตร		3.60	1.37	3.68	1.21	-0.31 ^{NS}
35. เป็นแบบอย่างแก่คนอื่นในครอบครัว ในการเลี้ยงดูบุตร		3.40	1.3	2.68	1.19	2.88 ^{**}
36. นำบุตรไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้าน หรือญาติพี่น้อง		2.90	1.28	3.03	4.00	-0.30 ^{NS}

(ต่อ) ตารางที่ 25

บทบาทบิดา (ข้อ)	กลุ่ม	แผนกกุมารเวชศาสตร์		หน่วยกุมารจิตเวช		คะแนน t
		ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน	
38. ร้องเพลงกล่อม เล่านิทาน หรือ อ่านหนังสือสำหรับเด็กให้บุตรฟัง		2.48	1.24	2.16	1.10	1.28 ^{NS}
39. ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร		3.50	1.36	3.32	1.16	0.70 ^{NS}
40. ช่วยภรรยาในการสร้างสุขนิสัยที่ดี ให้บุตร เช่น ให้บุตรรับประทานอาหาร อาหารให้เป็นเวลา		3.58	1.20	3.35	1.44	0.88 ^{NS}

NS = Non Significant

**p < .05

จากตารางแสดงว่า บทบาทด้านการเป็นสื่อกลางของครอบครัวและสังคมที่บิดาผู้ป่วย
วัย 0-5 ปี ที่มารับบริการที่แผนกกุมารเวชศาสตร์และหน่วยกุมารจิตเวชปฏิบัติมากที่สุดคือ การ
สนับสนุนและชมเชยบุตรเมื่อปฏิบัติในสิ่งที่ดี เช่น ยกมือไหว้ แบ่งสิ่งของให้ผู้อื่น และบทบาท
ด้านการเป็นแบบอย่างแก่คนอื่นในครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น .05