

## บทที่ 2

### อุปกรณ์และวิธีการวิจัย

#### 1. สัตว์ทดลอง

ใช้หนูขาว (rat) พันธุ์ Wistar เพศผู้หนักประมาณ 180-200 กรัม จากสำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

#### 2. การเตรียมไมโทคอนเดรียจากตับหนูขาว

เตรียมโดยใช้วิธีของ Hogeboom (1955) ซึ่ง Myers และ Slater (1957) เป็นผู้บรรยายไว้ โดยดัดแปลงเล็กน้อย การเตรียมและปฏิบัติการ ตับและไมโทคอนเดรียจะแช่อยู่ใน medium ที่เย็นจัด ซึ่งบรรจุอยู่ในภาชนะที่แช่ในน้ำแข็ง (ice-cold) การปั่นแยกไมโทคอนเดรียจากตับหนูทำโดยใช้ refrigerated centrifuge ซึ่งควบคุมอุณหภูมิตลอดการเตรียมไว้ที่ 4 °C

ขั้นตอนการเตรียมแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลัก คือ

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียม liver homogenate

ขั้นตอนที่ 2 การปั่นแยกไมโทคอนเดรียจาก liver homogenate


ขั้นตอนที่ 1 การเตรียม liver homogenate

1. ทำให้หนูตายทันทีโดยการตีที่หัวบริเวณท้ายทอยแล้วทำ cervical dislocation จากนั้นผ่าตัดเปิดหน้าท้องแล้วรีบตัดตับมาล้างด้วยสารละลาย isolated medium ที่ประกอบด้วย 0.25 M sucrose และ 1 mM EGTA (pH 7.2) ที่เย็นจัดหลาย ๆ ครั้งจนหมดเลือด แล้วแช่ตับในสารละลาย isolated medium ปริมาตรประมาณ 60-70 ml.


2. ตัดตับด้วยกรรไกรออกเป็นชิ้นเล็กประมาณ 0.3-0.5 ซม. ล้างเลือดอีกครั้งด้วยสารละลาย isolated medium จากนั้นนำไป homogenize ด้วย Heidolph glass homogenizer type 50203 RZR 2 ประมาณ 2-3 นาที (6-7 ครั้ง) จะได้ liver homogenate ประมาณ 60-80 ml.

**ขั้นตอนที่ 2** การปั่นแยกไมโทคอนเดรียจาก liver homogenate

นำ liver homogenate ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาปั่นแยก (centrifuge) ให้ได้ไมโทคอนเดรีย โดยใช้ Hitachi High Speed Refrigerated Centrifuge Himac model CR 20B 3 rotor model RP 18-3 โดยปั่นแยกทั้งหมด 3 ครั้ง ตามแผนภาพ ในรูปที่ 15 และ 16



รูปที่ 15 แสดงขั้นตอนการแยกไมโทคอนเดรียจาก rat liver homogenate โดยใช้ differential centrifuge (Hogeboom, 1955; Myers and Slater, 1957)



รูปที่ 16 ภาพประกอบการเตรียมไมโทคอนเดรีย

pellets ที่ได้จากการปั่นครั้งที่ 3 จะเห็นแยกเป็น 2 ชั้นชัดเจนในหลอด centrifuge ชั้นบนจะเห็นเป็นสีชมพูและเกาะกันอยู่อย่างหลวม ๆ คือ ชั้นของไมโครโซม (microsomes) ส่วนชั้นล่างที่มีสีน้ำตาลและเกาะกันแน่น คือ ชั้นของไมโทคอนเดรีย ส่วนของ supernatant fluid ทั้งและล่างส่วนที่เป็นไมโครโซมออกให้หมดด้วย 0.25 M sucrose เล็กน้อย จนเหลือเพียงส่วนของไมโทคอนเดรียที่มีสีน้ำตาล นำมา resuspend ด้วย 0.25 M sucrose ประมาณ 2-3 ml. homogenize ด้วยมืออย่างเบา ๆ จะได้ mitochondrial suspension สำหรับใช้ในการทดลอง ความเข้มข้นของไมโทคอนเดรียคิดเป็นปริมาณโปรตีน มีค่าประมาณ 30-60 mg/ml. และเมื่อใช้ glutamate + malate เป็นตัวตั้งเผลท จะได้ค่า RCI ประมาณ 5-8

### การเตรียม osmotic-shocked mitochondria

นำ mitochondrial pellets ที่เตรียมได้จากการปั่นครั้งที่ 3 ดังวิธีดังกล่าวข้างต้นมา resuspend ในสารละลาย 0.01 M sucrose ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง หมุนกวนช้า ๆ ด้วย magnetic stirrer ให้ suspension เข้ากันตลอดเวลา เมื่อครบกำหนดเวลานำ osmotic-shocked mitochondria ที่ได้เก็บในภาชนะแช่น้ำแข็ง (ice-bath) เพื่อนำไปใช้ในการทดลองต่อไป

### 3. การเตรียม Incubation medium ที่ใช้ในการทดลอง

incubation medium ที่ใช้ในการวิจัยแบ่งตามสภาวะการทดลอง ได้ดังนี้

3.1 incubation medium ที่ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับศึกษาอัตราการหายใจของไมโทคอนเดรีย

ประกอบด้วย	HEPES buffer	40 mM (60 mOsm)
	MgCl <sub>2</sub>	2 mM (6 mOsm)
	KCl	92 mM (184 mOsm)

(เป็น isotonic buffer ความเข้มข้นรวม 250 milliosmolar) ปรับ pH ของ incubation medium นี้ให้เป็น 7.2

3.2 incubation medium ที่ใช้ศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลง pH ใน medium จะมีส่วนประกอบเช่นเดียวกับใน incubation medium ในข้อ 3.1 แต่ปรับ pH ให้เป็น 6.8, 7.2 และ 7.6


3.3 hypotonic incubation medium สำหรับวัดอัตราการหายใจของ osmotic-shocked mitochondria ประกอบด้วย HEPES buffer 40 mM, MgCl<sub>2</sub> 2 mM, KCl 29.5 mM

3.4 incubation medium สำหรับศึกษาการทำงานของเอนไซม์โมโนเอมีน ออกซิเดส (monoamine oxidase, MAO) ประกอบด้วย 0.025 M inorganic phosphate ( $\text{KH}_2\text{PO}_4$ ) buffer pH 7.2

#### 4. การวัดอัตราการใช้ออกซิเจนของไมโทคอนเดรียในสภาวะต่าง ๆ

การวัดอัตราการใช้ออกซิเจนของไมโทคอนเดรีย ใช้เทคนิคที่เรียกว่า polarographic oxygen electrode technique (Sordahl et al., 1971) เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยส่วนสำคัญ คือ Gilson reaction chamber (รูปที่ 17) ซึ่งมีความจุประมาณ 1.8-2.0 ml. ประกอบด้วยผนังแก้ว 2 ชั้น และมีฝาจุก (stopper) เปิดและปิดได้ ตรงกลางฝาจุกมีรูเล็ก ๆ สำหรับเติมสารต่าง ๆ ลงไปทำปฏิกิริยากับไมโทคอนเดรียใน reaction chamber ทำให้ออกซิเจนจากภายนอกไม่สามารถเข้าไปรบกวนปริมาณออกซิเจนใน reaction chamber ขณะทำการทดลอง เมื่อไมโทคอนเดรียใช้ออกซิเจนไปในการทำปฏิกิริยา ปริมาณของออกซิเจนใน reaction chamber จะลดลง ซึ่งสามารถติดตามอัตราการลดลงของออกซิเจนนี้ได้ โดยใช้ Clark oxygen electrode ต่อเชื่อมกับ reaction chamber โดยส่วนของ electrode จะสัมผัสอยู่กับของเหลวใน chamber และปริมาณการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนที่วัดได้โดย oxygen electrode นี้ จะถูกส่งไปยังเครื่อง biological oxygen monitor (YSI model 53) ซึ่งจะมีหน้าปัทม์บอกปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ใน reaction chamber ในขณะนั้น ๆ ซึ่งสามารถบันทึกอัตราการลดลงของออกซิเจนใน reaction chamber ด้วย Gilson recorder (Model N2) บันทึกผลที่ได้ออกมาในลักษณะของกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับของออกซิเจนในสภาวะต่าง ๆ tracing ที่ปรากฏบนกระดาษบันทึกโดยวิธีนี้เรียกว่า oxygen-electrode tracing (polarographic tracing, oxygraph tracing)


ในระหว่างการ incubate ไมโทคอนเดรียทำปฏิกิริยากับสารต่าง ๆ ใน reaction chamber นั้น จะมี magnetic stirrer ขนาดเล็กหมุนกวนสารละลายอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ส่วนประกอบต่าง ๆ ของปฏิกิริยาใน reaction chamber เข้ากันดีตลอดเวลา ใช้น้ำที่ปรับอุณหภูมิจากอ่างควบคุมอุณหภูมิไหลผ่านเข้าและออกส่วนของ chamber ชั้นนอก (water jacket) ซึ่งห่อหุ้ม reaction chamber ไว้อีกทีหนึ่ง น้ำที่มีอุณหภูมิตามที่ต้องการจะวนเวียนหล่อเลี้ยงอยู่รอบนอก reaction chamber ทำให้อุณหภูมิของการทดลองใน reaction chamber คงที่ตามที่ต้องการ ในที่นี้ควบคุมอุณหภูมิให้ คงที่ที่  $37^\circ\text{C}$



รูปที่ 17 แสดง incubation chamber ที่ใช้ในการทดลองเพื่อวัดอัตราการหายใจของไมโทคอนเดรียในสถานะต่าง ๆ ซึ่งจะมี oxygen electrode คอยติดตาม oxygen tension ใน reaction chamber แล้วอ่านและบันทึกผลด้วย oxygraph apparatus (oxygen monitor + recorder)

เมื่อเริ่มทำปฏิกิริยาปริมาณออกซิเจนใน chamber จะมีค่าที่ระดับ 100 % saturation แต่เมื่อไมโทคอนเดรียมีการหายใจ ปริมาณออกซิเจนใน chamber จะค่อย ๆ ลดลง วัดอัตราการลดลงของออกซิเจนใน chamber ได้ด้วย Clark oxygen electrode ซึ่งมี Ag/AgCl electrode เป็นขั้ว anode ล้อมรอบด้วย platinum electrode ซึ่งทำหน้าที่เป็นขั้ว cathode (รูปที่ 18) เมื่อต้องการใช้งานจะใช้ half saturated KCl solution ฉาบผิวขั้ว electrode ทั้งสอง ทำหน้าที่เป็น salt bridge และมี YSI membrane (standard type) หุ้มปิดที่ขั้วของ electrode โดย membrane ชนิดนี้ยอมให้เฉพาะออกซิเจนผ่านเท่านั้น


ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ขั้วทั้งสองขณะทำการทดลอง คือ





CATHODE : platinum electrode

ANODE : Ag/Ag/Cl electrode



รูปที่ 18 แสดงลักษณะของ Clark oxygen electrode ซึ่งเป็น Ag/AgCl electrode เป็นขั้ว anode และมี platinum electrode เป็นขั้ว cathode

ปฏิกิริยาระหว่างขั้วทั้งสองจะมี polarizing voltage 0.8 V เมื่อทำปฏิกิริยาดังสมการข้างต้น จะมีการไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่าง 2 ขั้ว เกิดขึ้นและกระแสที่เกิดขึ้นนี้จะถูกส่งไปยัง amplifier ซึ่งทำหน้าที่ขยายกระแสเข้าสู่ recorder บันทึกเป็น tracing ต่อไป ปริมาณกระแสจะแปรผันตาม ปริมาณออกซิเจนใน chamber ทำให้สามารถวัดอัตราการใช้ออกซิเจนของไมโทคอนเดรียได้

##### 5. การศึกษาถึงการทำงานของเอนไซม์ monoamine oxidase

อาศัยหลักการในการติดตามการใช้ออกซิเจนของไมโทคอนเดรียเช่นเดียวกัน monoamine oxidase เป็นเอนไซม์ที่พบบริเวณเยื่อหุ้มชั้นนอก (outer membrane) ของไมโทคอนเดรีย ทำหน้าที่ในการออกซิไดซ์สารพวก amine โดยกระบวนการ oxidative deamination ดังปฏิกิริยาต่อไปนี้



เนื่องจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้จำเป็นต้องใช้ออกซิเจน ดังนั้นจึงสามารถศึกษา activity ของเอนไซม์ monoamine oxidase ได้โดยการติดตามปริมาณออกซิเจนที่ลดลงใน reaction chamber เมื่อใช้ substrates และ incubation medium ที่เหมาะสม ในการวิจัยนี้จะใช้ tyramine เป็น substrates และใช้ phosphate buffer เป็น incubation medium นอกจากนี้จะเติม respiratory chain inhibitor คือ rotenone ลงใน reaction chamber ด้วย เพื่อยับยั้งการออกซิไดซ์ endogenous substrates

ของไมโทคอนเดรีย ทำให้ออกซิเจนที่ถูกใช้ไปนั้นเกิดจากการที่ monoamine oxidase ออกซิไดซ์ amine substrate ที่เติมลงไปเพียงอย่างเดียว จากหลักการที่กล่าวมานี้ ทำให้ทราบถึง monoamine oxidase activity ได้

### การแบ่งภาวะการหายใจของไมโทคอนเดรีย (Mitochondrial respiratory states)

เนื่องจากองค์ประกอบสำคัญของการหายใจของไมโทคอนเดรีย มีหลายประการ เช่น การมีออกซิเจน วัฏสเตรท ADP+Pi หรือการมี uncoupler หรือไม่มี เป็นต้น Chance and William(1956) ได้จัดแบ่งภาวะการหายใจของไมโทคอนเดรียตามองค์ประกอบสำคัญ เป็นดังนี้

State	Condition
1	มีเพียง O <sub>2</sub>
2	มี O <sub>2</sub> และ ADP
3 (active state)	มี O <sub>2</sub> ADP และ Substrate
3u	มี uncoupler
4 (resting state)	มี O <sub>2</sub> และ Substrate
5	มีเพียง Substrate
6	การหายใจถูกยับยั้งด้วย excess Ca <sup>2+</sup>

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## 6. การคำนวณดัชนีควบคุมการหายใจ อัตราส่วน P/O และอัตราการใช้ออกซิเจนของไมโทคอนเดรีย

### 6.1 การคำนวณค่าดัชนีควบคุมการหายใจ (Respiratory Control Index, RCI)

นอกจาก Chance and William จะแบ่งภาวะ (states) การหายใจของไมโทคอนเดรียเป็นภาวะต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว ยังแสดงวิธีคำนวณค่าดัชนีควบคุมการหายใจ (RCI) ซึ่งเป็นค่าที่ใช้แสดงการควบคู่ (coupling) กันของกระบวนการออกซิเดชันและกระบวนการฟอสฟอริเลชัน ค่า RCI นี้แสดงถึงคุณภาพของไมโทคอนเดรียที่เตรียมได้ว่ามีคุณภาพดี คือเป็น intact mitochondria หรือไม่ โดยปกติแล้วจะมีค่า RCI = 5-8 การคำนวณค่า RCI ทำตามวิธีดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{RCI} &= \frac{\text{อัตราการใช้ออกซิเจนของไมโทคอนเดรียใน state 3}}{\text{อัตราการใช้ออกซิเจนของไมโทคอนเดรียใน state 4}} \\ &= \frac{\text{ความชัน (slope) ของ tracing ใน state 3}}{\text{ความชัน (slope) ของ tracing ใน state 4}} \end{aligned}$$


จากตัวอย่าง oxygraph tracing ในรูปที่ 19 การหาความชันของ tracing ใน state 3 และ state 4 ทำได้โดยกำหนดให้เส้นที่ลากขนานแกน X ของทั้ง 2 states ยาวเท่ากันดังนี้

$$\text{RCI} = \frac{Y_1/X}{Y_2/X} = \frac{Y_1}{Y_2}$$


### 6.2 การคำนวณค่า P/O ratio

P/O ratio คือ อัตราส่วนของจำนวนโมเลกุลของ ATP ที่ถูกสร้างขึ้นต่อออกซิเจน 1 อะตอม ( $1/2 \text{ O}_2$ ) ใน state 3 respiration ค่า P/O ratio สามารถคำนวณได้ตามวิธีที่บรรยายไว้โดย Estabrook (1967) ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้


$$\text{P/O} = \frac{\text{จำนวน nmoles ของ ATP ที่ถูกสร้างขึ้น}}{\text{จำนวน n atoms ของออกซิเจนที่ถูกใช้ระหว่างการเกิด state 3}}$$



รูปที่ 19 ตัวอย่าง oxygraph tracing เพื่อแสดงวิธีการหาค่า RCI



รูปที่ 20 ตัวอย่าง oxygraph tracing เพื่อแสดงวิธีการหาค่าอัตราส่วน P/O



รูปที่ 21 ตัวอย่าง oxygraph tracing เพื่อแสดงวิธีการหาอัตราการใช้ ออกซิเจนของไมโทคอนเดรียใน ระยะต่างๆ

จำนวน nmoles ของ ATP ที่สร้างขึ้นจะเท่ากับ nmoles ของ ADP ที่เติมลงไปทำปฏิกิริยา และสามารถคำนวณจากความเข้มข้นและปริมาตรของ ADP ที่เติมเข้าไป

จำนวน n atoms ของออกซิเจนที่ถูกใช้ในการทำปฏิกิริยาระหว่างการเกิด state 3 สามารถได้จาก oxygraph tracing ดังตัวอย่างที่ 20 ดังนี้

$$\text{จำนวน n atoms ของออกซิเจนที่ใช้ระหว่างการเกิด state 3} = \frac{Q \times S}{P}$$

โดยที่ P = ความสูงของเส้น P ในรูป

Q = ความสูงของเส้น Q ในรูป

S = จำนวน n atoms ของออกซิเจนที่ละลายอิมตัวอยู่ใน reaction mixture ก่อนที่จะถูกไมโทคอนเดรียใช้ไปในการทำปฏิกิริยา

ค่า S นี้ขึ้นอยู่กับปริมาตรของ reaction mixture ที่ทำปฏิกิริยาใน reaction chamber และอุณหภูมิของการทดลอง คือ ถ้ามีปริมาตรของ reaction mixture มาก ออกซิเจนก็จะละลายอิมตัวอยู่ได้มาก และถ้าอุณหภูมิต่ำ ออกซิเจนก็จะละลายอิมตัวอยู่ได้มากกว่าเมื่ออุณหภูมิสูง

การคำนวณค่า S จะหาได้จาก ค่าปริมาณของออกซิเจนที่ละลายอิมตัวใน incubation mixture 1 ml. (A) คูณด้วยปริมาตรทั้งหมดของ reaction mixture ที่ทำปฏิกิริยา จะได้จำนวนของออกซิเจนที่ละลายอิมตัวใน reaction mixture ทั้งหมด การคำนวณค่าปริมาณของออกซิเจนที่ละลายอิมตัวใน incubation mixture 1 ml. หาได้จากสมการ

$$A = \frac{s \times P \times N \times 10^4}{V \times 100} \text{ n atoms O/ml.}$$

เมื่อ A = จำนวน n atoms. ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ 1 ml.

s = ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซึมออกซิเจน (absorption coefficient) ที่อุณหภูมิที่ทำการทดลอง(ปริมาตรของออกซิเจนเมื่อถูกเปลี่ยนไปอยู่ที่ 0 °C และ 760 mm. แล้วถูกดูดซึมโดยน้ำหนึ่งหน่วยปริมาตร เมื่อความดันของก๊าซเท่ากับ 760mm.) โดยมีค่าเท่ากับ 0.02373 ที่อุณหภูมิ 37 °C

$P =$  สัดส่วนของออกซิเจนในบรรยากาศ = 21 %

$N =$  จำนวนอะตอมใน 1 โมเลกุลของออกซิเจน = 2

$V =$  ปริมาตรก๊าซที่ 0 °C ความดัน 1 บรรยากาศเทียบกับ 1 กรัมโมล มีค่าเท่ากับ 22,400 ml.

เมื่อแทนค่าเหล่านี้ลงในสมการดังกล่าว คำนวณหาค่าปริมาตรของออกซิเจนที่ละลายอิมตัวในน้ำ 1 ml. (A) ที่อุณหภูมิ 37 °C มีค่าเท่ากับ 444.9 n atoms O/ml.

### 6.3 การคำนวณอัตราการใช้ออกซิเจนของไมโทคอนเดรียในระยะต่าง ๆ

จากตัวอย่าง oxygraph tracing ในรูปที่ 21 สามารถคำนวณอัตราการใช้ออกซิเจนของไมโทคอนเดรีย ได้ดังนี้

$$\text{อัตราการใช้ออกซิเจนใน state 3} = \frac{R \times S}{P} \quad \text{n atoms O/min}$$

โดยที่  $R =$  ความสูงของเส้น R ในรูป

$P =$  ความสูงของเส้น P ในรูป

$S =$  จำนวน นนอ. ของออกซิเจนที่ละลายอิมตัวอยู่ใน reaction mixture ก่อนที่จะถูกไมโทคอนเดรียใช้ไปในการทำปฏิกิริยา

ถ้าทราบปริมาณโปรตีนของไมโทคอนเดรียแล้วนำมาหารอัตราการใช้ออกซิเจนที่คำนวณได้ตามวิธีข้างบน จะทำให้ทราบอัตราการใช้ออกซิเจนของไมโทคอนเดรีย มีหน่วยเป็น n atoms O/min/mg protein

นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณอัตราการใช้ออกซิเจนของไมโทคอนเดรียในระยะต่าง ๆ ออกมาในหน่วยของจำนวน n atoms O/ml/min ได้ ดังตัวอย่างจาก oxygraph tracing ในรูปที่ 21 เช่นกัน

$$\text{อัตราการใช้ออกซิเจนใน state 3} = \frac{R \times A}{P} \quad n \text{ atoms/ml/min}$$

โดยที่ R = ความสูงของเส้น R ในรูป

P = ความสูงของเส้น P ในรูป

A = จำนวน n atoms ของออกซิเจนที่ละลายในตัว อยู่ในน้ำ 1 ml.


ค่า A นี้ หาได้ตามวิธีที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 5.2 ในการวิจัยนี้ควบคุมอุณหภูมิคงที่ที่ 37 °C ซึ่งค่า A ในที่นี้ จึงเท่ากับ 444.9 n atoms O/ml

การคำนวณอัตราการใช้ออกซิเจนของไมโทคอนเดรียในระยะอื่น ๆ ของ oxygraph tracing ก็ สามารถคำนวณได้ในทำนองเดียวกัน

## 7. การวัด ATPase activity ของไมโทคอนเดรีย

เนื่องจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ATP จะเกิดผลิตภัณฑ์คือ ADP, Pi และ H<sup>+</sup> ดังปฏิกิริยาต่อไปนี้

ATP synthase (F<sub>0</sub>F<sub>1</sub> ATPase)



ดังนั้นในการศึกษา ATPase activity ของไมโทคอนเดรีย สามารถทำได้ 2 วิธีคือ

7.1 โดยการวัดจำนวน H<sup>+</sup> ที่เพิ่มขึ้นใน medium โดยใช้ pH meter (Bertina and Slater, 1975)

7.2 โดยการวัดปริมาณของ Pi ที่เกิดจากการสลายตัวของ ATP (Weinbach, 1956)

ในการวิจัยนี้จะเลือกใช้วิธีวัดปริมาณ Pi ที่เกิดจากการสลายของ ATP ในการวัด ATPase activity ของไมโทคอนเดรีย โดยมีขั้นตอนและหลักการที่สำคัญดังนี้คือ

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการ incubate ไมโทคอนเดรียให้ทำปฏิกิริยากับสารต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษา ใน reaction mixture ที่เหมาะสม เมื่อครบเวลาที่กำหนดไว้ ทำการหยุดปฏิกิริยาทันทีโดยการดูด reaction mixture ใส่ลงใน centrifuge tube ที่มี 20% นน./ปริมาตรของ trichloroacetic acid จำนวน 1 ml. อยู่ก่อนแล้วขยำให้เข้ากัน และนำไปแช่ในน้ำแข็งทันที

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณ Pi ที่เกิดขึ้น จากที่ได้ในขั้นตอนที่ 1 ในการวิจัยนี้ ใช้วิธีของ Fiske and Subbarow (1925) ซึ่งเป็นวิธีวัดความเข้มข้นของสีที่เกิดขึ้นของสารประกอบเชิงซ้อนจากปฏิกิริยารีดักชันของ phosphomolybdate complex กับ Fiske Subbarow reducing agent (ประกอบด้วย 15% sodium bisulfite 97.5 ml. 20% sodium sulfite 2.5 ml. และ 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid 0.25 กรัม) เมื่อปฏิกิริยาดำเนินไปครบตามเวลาที่กำหนดแล้วนำสารละลายซึ่งเกิดเป็นสีน้ำเงินไปวัดค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ที่ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง spectrophotometer (Ultrospec II) โดยใช้ น้ำกลั่น ที่มีปริมาตรเท่า sample เป็น blank แล้วนำค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปเทียบหาปริมาณ Pi จากกราฟมาตรฐานของ Pi ซึ่งมีช่วงความเข้มข้นต่าง ๆ ครอบคลุมค่าของ sample

### วิธีการหา ATPase activity ของไมโทคอนเดรีย มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1. เติม incubation medium ปริมาตร 2.63 ml. ลงในภาชนะทรงสูงเล็ก ๆ ที่ส่วนล่างแช่อยู่ใน water bath ซึ่งจะปรับอุณหภูมิของการทดลองให้คงที่ที่ 37 °C ส่วนล่างของภาชนะทรงสูงจะมี magnetic stirrer คอยหมุนกวนส่วนประกอบของปฏิกิริยาให้เข้ากันอยู่ตลอดเวลา
2. เติม mitochondrial suspension 200  $\mu$ l.
3. เติมตัวยาที่ต้องการทดสอบแล้วรอเวลา 1 นาที ( ถ้าเป็นการทดลองที่ใช้เป็น control อาจเติม solvent ที่ใช้ละลายตัวยาในปริมาตรที่เท่ากัน )
4. เติม 0.1 M ATP 150  $\mu$ l. เมื่อครบกำหนด 10 นาทีแล้ว
5. ถูด reaction mixture มาเป็น sample ปริมาตร 1 ml. แล้วใส่ลงใน centrifuge tube ที่มี 20% นน./ปริมาตรของ trichloroacetic acid 1 ml. อยู่ก่อน แล้วเขย่าให้เข้ากันแล้วนำหลอดไปแช่ในน้ำแข็งทันที
6. นำไป centrifuge ที่ 4,000 rpm. นาน 10 นาที เพื่อตกตะกอนโปรตีน
7. ถูดส่วน supernatant มา 1 ml. ( ถ้าเป็น blank ใช้ น้ำกลั่น 1 ml. แทน ถ้าจะทำ standard curve ของ Pi ใช้ 1 ml. ของ  $K_2HPO_4$  ที่ความเข้มข้น 0.1, 0.25, 0.50, 1.0, 1.5, 2.0 และ 3.0 mM แทน ) แล้วใส่ลงในหลอดทดลองที่มี 0.2 M  $H_2SO_4$ , 5 ml. อยู่ก่อนแล้ว เขย่าให้เข้ากัน
8. เติม 2.5% นน./ปริมาตร ammonium molybdate 0.8 ml.
9. เติม Fiske Subbarow reducing agent 0.4 ml. เขย่าให้เข้ากันดี แล้วตั้งไว้ให้เกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิห้องนาน 10 นาที



10. นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้จาก sample คำนวณหาปริมาณ Pi จาก standard curve ของ Pi แล้วคูณด้วย dilution factor (ในที่นี้คือ  $3 \times 2 = 6$ ) จะได้เป็นค่าปริมาณ Pi ที่เกิดขึ้นตามต้องการ

(หมายเหตุ : ในการเตรียม Fiske Subbarow reducing agent จะมีบางส่วนของ 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid ละลายไม่หมด ให้กรองออก โดยใช้กระดาษกรองและเก็บสารละลาย Fiske Subbarow reducing agent ในขวดสีชา เก็บไว้ใช้ไม่เกิน 1 เดือน)

### 8. การหาปริมาณโปรตีนของไมโทคอนเดรีย

ความเข้มข้นหรือปริมาณไมโทคอนเดรียที่อยู่ใน mitochondrial suspension ที่เตรียมได้จากตับหนูขาว สำหรับใช้ในการทดลองในแต่ละครั้งจะมีปริมาณไม่เท่ากัน ซึ่งจะมีผลต่อการเปรียบเทียบอัตราการใช้ออกซิเจนของไมโทคอนเดรียในระยะต่าง ๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาความเข้มข้นของไมโทคอนเดรียที่ใช้ในการทดลองแต่ละครั้ง เพื่อนำมาเป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบผลที่ได้

การหาปริมาณโปรตีนของไมโทคอนเดรียในการวิจัยนี้ ใช้วิธีของ Lowry และคณะ (1951) ซึ่งดัดแปลงเพิ่มเติมโดย Miller(1959) เป็นการหาปริมาณโปรตีนโดยการเกิดสี เมื่อโปรตีนทำปฏิกิริยากับ copper sulfate ในสารละลายต่างจะเกิดเป็น co-ordinated complex ของ copper กับอะตอมของไนโตรเจนใน peptide chain เกิดเป็นสีน้ำเงิน นำสารละลายสีน้ำเงินที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง spectrophotometer (Ultrospec II) โดยใช้ น้ำกลั่นที่มีปริมาตรเท่ากับ sample เป็น blank นำค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปเทียบหาปริมาณโปรตีนจาก standard curve ซึ่งใช้ bovine serum albumin ในช่วงความเข้มข้นที่ครอบคลุมค่าของ sample เป็นตัวมาตรฐาน

วิธีการหาปริมาณโปรตีนของไมโทคอนเดรีย มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

1. เจือจาง mitochondrial suspension 10  $\mu$ l. ด้วยน้ำกลั่น 3 ml. (1:300) จะได้สารละลาย A
2. ถูดยาละลาย A ปริมาตร 1 ml. ใส่ในหลอดทดลอง เติมน้ำ alkalin copper reagent 1 ml. (กรณีเป็น blank จะใช้น้ำ 1 ml. ส่วนกรณีที่ทำ standard curve จะใช้ 1 ml. ของ bovine serum albumin ที่มีความเข้มข้น 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30 mg/ml. แทนสารละลาย A) เขย่าให้เข้ากัน ปล่อยให้ทำปฏิกิริยา 10 นาที

3. เติม Folin-Phenol reagent (dilution 1:10) 3 ml. เขย่าให้เข้ากัน
4. นำไปแช่ใน water bath ที่มีอุณหภูมิ 50 °C เป็นเวลานาน 10 นาที
5. ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
6. นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร
7. นำค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ไปเทียบหาปริมาณโปรตีนจาก standard curve แล้วคูณด้วย dilution factor (ในที่นี้คือ  $3 \times 100$ ) จะได้ค่าความเข้มข้นและปริมาณโปรตีนของไมโทคอนเดรีย หน่วยเป็น mg/ml.

#### การเตรียมสารละลายที่ใช้

- Alkaline copper reagent เป็นสารละลายที่ประกอบด้วย 1 ส่วนของ 0.5%  $\text{CuSO}_4$  ที่ละลายอยู่ใน 1% (w/v) ของ potassium tartrate และ 10 ส่วนของ 10%  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  ที่ละลายอยู่ใน 0.5 M NaOH
- Folin-Phenol reagent (1:10) เตรียมได้จากการเจือจาง concentrated Folin-Ciocalteu's Phenol reagent ด้วยน้ำกลั่นในอัตราส่วน 1:10 (v/v) และเตรียมใช้ทันที

### 9. การเตรียมสารละลายสำหรับการทดลองและแหล่งที่มาของสารเคมี

ในการเตรียมสารเคมี และตัวยาต่าง ๆ จะใช้ตัวทำละลายเป็นน้ำกลั่น 3 ครั้ง ส่วนสารเคมีที่ละลายได้น้อยหรือไม่ละลายในน้ำ จะใช้ absolute ethanol หรือ dimethylsulfoxide (DMSO) เป็นตัวทำละลายแทน และในกรณีที่ต้องปรับ pH ของสารละลายให้ได้ตามต้องการจะใช้สารละลายของ KOH และ HCl ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นหลัก

#### 9.1 การเตรียมสารละลายที่ใช้ในการทดลอง

ความเข้มข้นและขนาดที่ใช้บ่อย ๆ ของสารเคมีที่ละลายได้ในน้ำกลั่น (ultrapure water) ได้แก่

1 M glutamate + 1 M malate (pH 7.2) ขนาด 10  $\mu\text{l}$ ., 1 M succinate (pH 7.2) ขนาด 10  $\mu\text{l}$ ., 0.2 M NADH ใน 1%  $\text{NaHCO}_3$  ขนาด 10  $\mu\text{l}$ ., 0.3 M ADP + 0.6 M Pi ขนาด 2  $\mu\text{l}$ ., 0.05 M DNP ขนาด 2-6  $\mu\text{l}$ ., 0.1 M ATP (pH 7.2) ขนาด 150  $\mu\text{l}$ ., 0.1 M tyramine ขนาด 2  $\mu\text{l}$ ., 0.1 M pargyline ขนาด 1  $\mu\text{l}$ ., 1 M DTT ขนาด 2-3  $\mu\text{l}$ ., atractyloside 10 mg/ml ขนาด 10  $\mu\text{l}$ .,

bovine serum albumin 250 mg/ml. ขนาด 20-120  $\mu$ l., 0.001 และ 0.25 M sucrose, 1 mM EGTA (pH 7.2), 1 M HEPES buffer, 1 M  $MgCl_2$ , 2.3 M KCl, 0.025 M และ 0.05 M potassium phosphate ( $KH_2PO_4$ ), 0.2 M  $H_2SO_4$ , ขนาด 5 ml., 0.4 M CaCl<sub>2</sub>, 10  $\mu$ l.

ความเข้มข้นและขนาดที่ใช้บ่อย ๆ ของสารเคมีที่ละลายใน absolute ethanol ได้แก่ 5 mg/ml. oligomycin ขนาด 2  $\mu$ l. .

6-deoxyclitoriacetal ที่สกัดจากรากหนอนตายหยากละลายใน DMSO ขนาด 0.1 mg/ml.

## 9.2 แหล่งที่มาของสารเคมีที่ใช้ในการวิจัย

สาร 6-deoxyclitoriacetal ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก รศ. ดร. นงศิริ เรืองรังษี ภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารเคมีจากบริษัท Sigma chemical คือ

ADP, ATP, ammonium molybdate, bovine serum albumin (BSA), copper sulfate ( $CuSO_4$ ), DMSO, DNP, DTT, EGTA, Folin & Ciocalteu's phenol reagent, L - glutamic acid, atractyloside, malic acid, oligomycin, potassium dihydrogen phosphate, dipotassium hydrogen phosphate, potassium tartrate, rotenone, sodium hydroxide, sodium sulfite, sodium bisulfite, succinic acid, sucrose, magnesium chloride, potassium chloride, HEPES buffer, sucrose, tyramine, pargyline, 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid

สารเคมีจากบริษัท E. Merck, Darmstadt : sodium carbonate, sulfuric acid, hydrochloric acid, potassium hydroxide, absolute ethanol

## 10. การแสดงผลการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

### 10.1 Oxygraph tracing

เป็น oxygraph tracing ที่ได้จากการทดลอง แสดงอัตราการใช้ออกซิเจนในระยะต่าง ๆ ด้วยตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บ ซึ่งกำกับแต่ละระยะของ oxygraph tracing มีหน่วยเป็น  $n \text{ atoms O/ml/min}$

### 10.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การวิจัยนี้ใช้สถิติชนิด two-tailed unpaired student's t-test ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นกลุ่มควบคุม และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นกลุ่มทดลอง

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย