

## บทที่ 5

### สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการปรึกษาทางสุขภาพของผู้มารับบริการสุขภาพ โรงพยาบาลของสภากาชาดไทย ในคลินิกโรคปอด คลินิกโรคหัวใจ และคลินิกโรคเบาหวาน ในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่ การปรับตัวในชีวิตประจำวัน และการวางแผนการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยโรคปอด ผู้ป่วยโรคหัวใจ และผู้ป่วยโรคเบาหวาน พร้อมทั้งเปรียบเทียบความต้องการการปรึกษาทางสุขภาพ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการปรับตัวในชีวิตประจำวัน และด้านการวางแผนการดำเนินชีวิต จำแนกตามเพศ อายุ ส康ภาพสมรส และระยะเวลาที่มารับบริการ

#### สรุปผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการปรึกษาทางสุขภาพของผู้ป่วยที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลของสภากาชาดไทย ตัวอย่างประชากรเป็นผู้ป่วยโรคปอด ผู้ป่วยโรคหัวใจ และผู้ป่วยโรคเบาหวาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 634 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี 3 ชุด ๆ ละ 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์สอบถามความรู้เรื่องโรค ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์สอบถามความต้องการการปรึกษาทางสุขภาพเกี่ยวกับการปรับตัวในชีวิตประจำวันและการวางแผนการดำเนินชีวิต

ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่คลินิกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสภากาชาดไทย 3 คลินิก ได้แก่ คลินิกโรคปอด คลินิกโรคหัวใจ และคลินิกโรคเบาหวาน จำนวน 634 คน ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2534 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 3 ตอน ซึ่งได้ตรวจสอบหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 10 ท่าน และได้มีการทดลองนำแบบสัมภาษณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างคลินิกละ 20 คน จำนวน 60 คน ได้ค่าความเที่ยงของแบบสัมภาษณ์ 0.96 และนำแบบสัมภาษณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างประชากรตามที่กำหนดไว้ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาหาอัตราส่วนร้อยละ มัชณิเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการการปรึกษาทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอด โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการปรับตัวประจำวัน และด้านการวางแผนการดำเนินชีวิต จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ประเพท และระยะเวลา การเจ็บป่วยของผู้มารับบริการโดยล้วนรวม รายด้าน และรายข้อ โดยการทดสอบค่าที (*t-test*) และค่าเอฟ (*F-test*) ได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตาราง และการบรรยาย

### ผลการวิจัย

- ผู้ป่วยโรคปอด ผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคในระดับปานกลาง ส่วนผู้ป่วยโรคหัวใจมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคในระดับน้อย
- พบความแตกต่างการทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนในเรื่องต่อไปนี้

#### 2.1 ผู้ป่วยโรคปอด

2.1.1 เมื่อจำแนกตามอายุพบความแตกต่างของคะแนน 1) การปรับตัวในชีวิตประจำวันด้านลรริวิทยา ด้านอัตโนมัติ 2) การวางแผนในชีวิตประจำวันทุกด้าน

2.1.2 จำแนกตามสถานภาพสมรส พบความแตกต่างของคะแนน 1) การปรับตัวในชีวิตประจำวันด้านลรริวิทยา ด้านอัตโนมัติ ด้านบทบาท 2) การวางแผนการดำเนินชีวิตด้านอาชีพการทำงาน

2.1.3 จำแนกตามระยะเวลาการรับบริการพบความแตกต่างของคะแนน  
1) การปรับตัวในชีวิตประจำวันด้านลรริวิทยา ด้านอัตโนมัติ ด้านความล้มเหลวผึ้งพา

#### 2.2 ผู้ป่วยโรคหัวใจ

2.2.1 จำแนกตามอายุพบความแตกต่างของคะแนน 1) การปรับตัวในชีวิตประจำวันด้านอัตโนมัติ ด้านบทบาท ด้านความล้มเหลวผึ้งพา 2) การวางแผนการดำเนินชีวิตด้านความล้มเหลวในครอบครัวและสังคม

2.2.2 จำแนกตามสถานภาพสมรสพบความแตกต่างของคะแนน 1) การปรับตัวในชีวิตประจำวันด้านอัตโนมัติ ด้านบทบาท 2) การวางแผนการดำเนินชีวิตด้านความล้มเหลวในครอบครัว และสังคม

2.2.3 จำแนกตามระยะเวลาการมารับบริการพบความแตกต่างของ  
คุณภาพ 1) การปรับตัวในชีวิตประจำวันด้านสุริวิทยา 2) การวางแผนการดำเนินชีวิตด้านการ  
อาชีพ

### 2.3 ผู้ป่วยเบาหวาน

2.3.1 จำแนกตามอายุพบความแตกต่างของคุณภาพ 1) ความรู้เรื่องโรค  
2) การปรับตัวในชีวิตประจำวันด้านสุริวิทยา ด้านบทบาท

2.3.2 จำแนกตามเพศพบความแตกต่างของคุณภาพ 1) การปรับตัวใน  
ชีวิตประจำวันด้านสุริวิทยา ด้านอัตโนมัติ

2.3.3 จำแนกตามลักษณะภูมิภาคพบความแตกต่างของคุณภาพ 1) การ  
ปรับตัวในชีวิตประจำวันด้านบทบาท

2.3.4 จำแนกตามระยะเวลาที่มารับบริการ พบความแตกต่างของคุณภาพ  
1) การปรับตัวในชีวิตประจำวันด้านอัตโนมัติ

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ ขอเสนอการอภิปรายผลการวิจัยดังนี้

### 1. สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างประชากร

#### 1.1 เพศ

ลักษณะตัวอย่างประชากรในการวิจัย พบว่าผู้ป่วยเรื้อรังทั้ง ๓ โรค รวมจำนวน 634 คน นั้น เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58.7 และ 41.3 ตามลำดับ ผลการวิจัย พบว่าผู้ป่วยโรคปอด และโรคหัวใจที่มารับบริการจำแนกตาม เพศของผู้ป่วยไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการปรึกษาเกี่ยวกับ การปรับตัวในชีวิตประจำวัน ด้านสุขภาพ ด้านอัตโนมัติ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .05 โดยพบว่าผู้ป่วยหญิงมีการปรึกษาด้านสุขภาพมากกว่าผู้ป่วยชาย และผู้ป่วยชายมีความต้องการ การปรึกษาด้านอัตโนมัติในทั้งนี้มากกว่าผู้ป่วยหญิง

#### 1.2 อายุ

พบว่าผู้ป่วยทั้ง ๓ โรค ในช่วงอายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.5 รองลงมาคือช่วงอายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 28.4

ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการบริการทาง สุขภาพของผู้ป่วยโรคปอด จำแนกตามช่วงอายุที่ต่างกัน ที่มารับบริการมีความต้องการการปรึกษา ทางสุขภาพเกี่ยวกับการปรับตัวในชีวิตประจำวันด้านสุขภาพ ด้านอัตโนมัติในทั้งนี้ และเกี่ยวกับการ วางแผนการดำเนินชีวิต ด้านอาชีพการทำงาน ตลอดจนด้านความล้มเหลว<sup>r</sup>ในครอบครัวและลังคอม พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการปรึกษา ทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคหัวใจ เกี่ยวกับการปรับตัวในชีวิตประจำวัน ด้านอัตโนมัติในทั้งนี้ ด้านบทบาท ด้านความล้มเหลว<sup>r</sup>พึ่งพา เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินชีวิต ด้านความล้มเหลว<sup>r</sup>ในครอบครัวและลังคอม ที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน โดยการทดสอบค่า F พบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการปรึกษาทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ของผู้ป่วยช่วงอายุ มีความต้องการการปรึกษาทางสุขภาพเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ การปรับตัว ในชีวิตประจำวัน ด้านสุขภาพ และด้านบทบาท พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ .05

### 1.3 สถานภาพสมรส

พบว่าหัวอย่างประชากรส่วนใหญ่มีสถานภาพคู่ คิดเป็นร้อยละ 64.8 สถานภาพ  
หย่า มีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.4

ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการปรึกษาทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอดจำแนกตามสถานภาพสมรสพบว่ามีความต้องการการปรึกษาทางสุขภาพ  
เกี่ยวกับการปรับตัวในชีวิตประจำวัน ด้านลักษณะ ด้านอัตโนมัติ ด้านบทบาทและเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินชีวิต ด้านอาชีพการทำงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .05

ในผู้ป่วยโรคหัวใจเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการปรึกษาทางสุขภาพ จำแนกตามสถานภาพสมรส พบว่ามีความต้องการการปรึกษาทางสุขภาพเกี่ยวกับการปรับตัวในชีวิตประจำวัน ด้านอัตโนมัติ ด้านบทบาท และเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินชีวิต ด้านความล้มเหลวในครอบครัวและลังคอม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .05

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการปรึกษาทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำแนกตามสถานภาพสมรสพบว่าผู้มารับบริการมีความต้องการการปรึกษาทางสุขภาพ ในชีวิตประจำวัน ด้านบทบาท แตกต่างกันโดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

### 1.4 ระดับการศึกษา

พบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ำ คือ ระดับประถมศึกษา เป็นจำนวนสูงถึงร้อยละ 40.2 ไม่ได้เรียนคิดเป็นร้อยละ 12.1 ส่วนผู้ป่วยที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีเพียงร้อยละ 10.3

ผลการวิจัยปรากฏว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการปรึกษาของผู้ป่วยโรคปอด โรคหัวใจ และโรคเบาหวานที่มารับบริการ จำแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยมีความต้องการการปรึกษาทางสุขภาพไม่แตกต่างกัน

### 1.5 ระยะเวลาที่มารับบริการ

พบว่าระยะเวลาที่มารับบริการ 1-3 ปี มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.6 รองลงมา คือ มากกว่า 5 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 32.5 ระยะเวลาที่มารับบริการมีจำนวนน้อยที่สุด คือ 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.9

ผลการวิจัยแสดงว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการปรึกษาทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอด จำแนกตามระยะเวลาที่มารับบริการพบว่ามีความต้องการการปรึกษาทางสุขภาพ เกี่ยวกับการปรับตัวในชีวิตประจำวัน ด้านสุริวิทยา ด้านอัตโนมัติ ด้านความล้มเหลว ซึ่งพาระหว่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการการปรึกษาทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคหัวใจจำแนกตามระยะเวลาที่มารับบริการพบว่า มีความต้องการการปรึกษาทางสุขภาพเกี่ยวกับการปรับตัวในชีวิตประจำวันด้านสุริวิทยา และ เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินชีวิต ด้านอาชีพ การงาน มีความแตกต่างกันมีนัยสำคัญที่ .05 ส่วนผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องการการปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวในชีวิตประจำวัน ด้านอัตโนมัติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

จากข้อค้นพบ ผู้ป่วยโรคปอดที่มารับบริการทั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ โรงพยาบาลสมเด็จ ฯ ศรีราช มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคที่ตนเป็นอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 2 แห่ง ผู้ป่วยโรคหัวใจมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคที่ตนเป็นอยู่ อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 2 แห่ง ส่วนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคที่เป็นอยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ย 74.70 น้อยกว่าผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาล สมเด็จ ฯ ศรีราช ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ 80.50 เมื่อพิจารณาในเรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคของผู้รับบริการ จะเห็นว่า ผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความต้องการปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคมากกว่าผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จ ฯ ศรีราช โดยเฉพาะความรู้ในเรื่องโรคหัวใจต้องการมากที่สุด รองลงมาคือโรคปอด และ โรคเบาหวาน สำหรับโรคเบาหวานนั้น พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จ ฯ ศรีราช มีความรู้ความเข้าใจดีมาก ตั้งนี้น่าจะมีความต้องการการปรึกษาน้อยกว่าผู้รับบริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สภาพบัญชาของผู้รับบริการที่ต้องการการปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวในด้านต่าง ๆ พบว่า สภาพบัญชาที่ผู้รับบริการประسلับและต้องการการปรึกษามากที่สุด ก็คือ บัญชาเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินชีวิต ด้านความล้มเหลว ในครอบครัวและสังคมของผู้ป่วยโรคหัวใจ รองลงมาก็คือ บัญชาเกี่ยวกับการปรับตัวในชีวิตประจำวันด้านสุริวิทยาของผู้ป่วยโรคเบาหวาน บัญชา

เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินชีวิตด้านความล้มเหลวในครอบครัวและสังคมของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปัญหาเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินชีวิตด้านความล้มเหลวในครอบครัวและสังคม และปัญหาด้านอาชีพ การงานของผู้ป่วยโรคปอด นักหารองลงมาคือปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวในชีวิตประจำวันด้านสุริวิทยาของผู้ป่วยโรคปอดและโรคหัวใจ ส่วนปัญหาในการปรับตัวในชีวิตประจำวันและปัญหาการวางแผนดำเนินชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง

ดังนี้ nodsrup ได้ว่าปัญหาที่เร่งด่วนและจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับ การปรึกษาตามลำดับ ดังนี้

- 1) ปัญหาการวางแผนการดำเนินชีวิต ด้านความล้มเหลวในครอบครัว และสังคมของผู้ป่วยโรคหัวใจ
- 2) ปัญหาการปรับตัวในชีวิตประจำวันด้านสุริวิทยาของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
- 3) ปัญหาการวางแผนการดำเนินชีวิตด้านความล้มเหลวในครอบครัว และสังคมของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ป่วยโรคปอด
- 4) ปัญหาการวางแผนการดำเนินชีวิตด้านอาชีพการงานของผู้ป่วยโรคปอด
- 5) ปัญหาการปรับตัวในชีวิตประจำวันด้านสุริวิทยาของผู้ป่วยโรคปอด และผู้ป่วยโรคหัวใจ

### ข้อเสนอแนะ

#### 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ด้านบริหาร ผู้บริหารควรมีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมบริการ การปรึกษาทางสุขภาพของผู้ป่วยผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสภากาชาดไทย โดยมีการวางแผน ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งในและนอกสถาบันอย่างมีเบ้าหมายส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ ประชาชน

1.2 ด้านบริการ พยาบาลสภากาชาดไทย ควรทราบถึงบทบาทหน้าที่ของ พยาบาลด้านบริการพยาบาลว่า การให้บริการการปรึกษาทางสุขภาพต่อผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาล สภากาชาดไทย จึงจะเป็นการให้บริการพยาบาลได้ครอบคลุมครบถ้วน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ตลอดจนสังคมโดยส่วนรวมด้วย

1.3 ค้านวชาการ เป็นการสนับสนุนส่งเสริมแผนงานวิชาการให้กับสภากาชาดไทย เป็นแนวทางให้ความร่วมมือกันระหว่างสถาบันภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ของพยานาล วิชาชีพสภากาชาดไทย สามารถให้บริการวิชาการในรูปแบบของการให้การฝึกอบรม การวิจัย ความเป็นไปได้ในการให้การปรึกษาทางสุขภาพ การใช้ปัญหาสุขภาพผลลัพธ์สื่อทางไกล เพื่อเผยแพร่ วิชาการทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ สนองความจำเป็นในการแก้ปัญหาสุขภาพและพัฒนากิจการของ สภากาชาดไทยต่อไป

## 2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความต้องการการปรึกษาทางสุขภาพในกรุงเทพ มหานคร และภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

2.2 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยการล่วงเส้นทางให้บริการการปรึกษาทาง สุขภาพของผู้มารับบริการในสถาบันการให้บริการสุขภาพทั้งเขตในเมือง และเขตชนบท

2.3 ควรมีการศึกษาทดลอง เพื่อหารูปแบบกิจกรรมที่ล่วงเส้นทางให้บริการการ ปรึกษาทางสุขภาพกับผู้มารับบริการ ณ สถาบันที่ให้บริการสุขภาพด้วย

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



บรรณาธิการ

# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย