

บทที่ 6

สรุปผลการวิจัยและเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

การศึกษานี้พบว่า การให้ norfloxacin 400 มก. วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 3 วัน ช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยตับแข็งที่มีเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนบนที่รับไว้ในโรงพยาบาลได้ดีกว่าผู้ป่วยในอดีตที่ไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ แต่ความแตกต่างนี้ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ

การให้ norfloxacin 400 มก. วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 3 วัน แก่ผู้ป่วยตับแข็งที่มีเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนบน อาจเพียงพอในการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล การศึกษาในอนาคตอาจมุ่งศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการรักษาเป็นเวลา 3 วัน หรือ 7 วันว่า จะสามารถลดการติดเชื้อแบคทีเรียได้ต่างกันหรือไม่ แต่คงต้องใช้ประชากรที่ศึกษามากกว่านี้

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย