

ความชุกและป้อดจีที่เกี่ยวข้องกับภาวะห้องผูกในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี  
ที่คลินิกเด็กดี โรงพยาบาลอุหาลงกรณ์

นายไพบูลย์ วงศ์สกุลชื่น



## ศูนย์วิทยทรัพยากร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาวิชาคุณารเวชศาสตร์ ภาควิชาคุณารเวชศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2539

ISBN 974 - 636 - 638 - 6

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PREVALENCE AND FACTORS ASSOCIATED WITH CONSTIPATION  
IN CHILDREN UNDER 1 YEAR OLD  
AT WELL BABY CLINIC CHULALONGKORN HOSPITAL

Mister Paiboon Wongsakulchun

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
ด้านเด็กและวัยรุ่น  
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
For the Degree of Master of Science

Department of Pediatrics

Graduate School Chulalongkorn University

Academic Year 1996

ISBN 974 - 636 - 638 - 6


หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะท้องผูกในเด็กอายุน้อยกว่า ๑ ปี  
ที่葵อินิกเด็กดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โดย นายไพบูลย์ วงศ์สกุลชื่น


ภาควิชา ภูมารเวชศาสตร์


อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สังคม งพิพัฒน์วนิชย์

บันทึกวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง  
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัณฑิต

  
.....  
คณบดีบันทึกวิทยาลัย  
( ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุดวงศ์ )

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

  
.....  
ประธานกรรมการ  
( ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรรณ )

  
.....  
อาจารย์ที่ปรึกษา  
( รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สังคม งพิพัฒน์วนิชย์ )

  
.....  
กรรมการ  
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นัน迪 ธนาบันนัน )

๗

## พิมพ์ดันฉบับบทด้วยอวิทยานิพนธ์ภาษาในการอบรมสีเขียวนี้เพียงแผ่นเดียว


ใหญ่สุด วงศ์สกุลชื่น : ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะท้องผูกในเด็กอายุน้อยกว่า ๑ ปี ที่คลินิกเด็กโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (PREVALENCE AND FACTORS ASSOCIATED WITH CONSTIPATION IN CHILDREN UNDER 1 YEAR OLD AT WELL BABY CLINIC CHULALONGKORN HOSPITAL )  
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒนาพิชัย ; ๕๕ หน้า ISBN 974-636-638-6

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะหาความชุกของภาวะท้องผูกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะท้องผูกในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า ๑ ปี รูปแบบของการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงพรรณญาณและข้อมูลในเวลาหนึ่ง (period cross sectional descriptive study) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ด้วยภาษาพื้นเมือง ค่าหรือคู่บุคคลของเด็กที่มีอายุน้อยกว่า ๑ ปีที่มาตรวจที่คลินิกเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๓๙ นำข้อมูลที่ได้นั้นมาวิเคราะห์ทางสถิติ

ผลการศึกษา ได้ด้วยภาษาพื้นเมือง ค่าหรือคู่บุคคลของเด็กจำนวน ๒๘๘ คน เด็กส่วนใหญ่มีอายุต่ำกว่า ๖ เดือน ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่คลอดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คลอดโดยวิธีปิด ครบกำหนด และมีน้ำหนักแรกคลอดอยู่ในเกณฑ์ปักต์ ปีค่าธรรมชาติของเด็กส่วนใหญ่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน เด็กส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๕๖.๒) มีลักษณะอุจจาระอยู่ในเกณฑ์ปักต์ มี ๑๒ คนที่มีลักษณะอุจจาระเข้มมาก มีอาการบ่งบอกว่าปักต์วิลากล้าๆและมีเลือดออกร่วมด้วย ความชุกของภาวะท้องผูกในการศึกษานี้เท่ากับร้อยละ ๔.๒ เด็กส่วนใหญ่ต่ำกว่า ๔ วันและครึ่ง เป็นเด็กที่เคยได้รับนมแม่ตาม พบว่าเด็กที่มีภาวะท้องผูกจะได้รับนมแพนไคเซลล์ต่อวันน้อยกว่าและได้รับปริมาณไคเซลล์ต่อวันมากกว่าเด็กที่ไม่มีภาวะท้องผูก ( $p<0.05$ ) และพบว่าเด็กที่มีภาวะท้องผูกจะรับประทานอาหารเสริมที่อยู่เดลี่น้อยกว่าและได้รับอาหารเสริมเป็นจำนวนครึ่งไก่ตันต่อเดือนกว่าเด็กที่ไม่มีอาการท้องผูก ( $p<0.05$ ) นมดั่งครัวกัน นมทึบเส้นท้องหรือเด็กไก่ อาหารเสริมดั่งนิคกัน ประสาดท้องผูกในครอบครัว ปัจจัยเหล่านี้ไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะท้องผูกในการศึกษานี้ ( $p>0.05$ )

**ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

ภาควิชา ..... อนามัยเวชศาสตร์ .....  
สาขาวิชา ..... อนามัยเวชศาสตร์ .....  
ปีการศึกษา ..... ๒๕๓๙ .....

ลายมือชื่อผู้ติด .....   
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา .....   
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม .....

พิมพ์ดันจับบทด้วยอวิภานิพนธ์ภาษาไทยในกรอบสีเขียวเพียงแผ่นเดียว

# C845091 : MAJOR PEDIATRICS

KEY WORDS : PREVALENCE / FACTORS ASSOCIATED WITH CONSTIPATION / CHILDREN UNDER 1  
YEAR OLD

PAIBPOON WONGSAKULCHUN : PREVALENCE AND FACTORS ASSOCIATED WITH  
CONSTIPATION IN CHILDREN UNDER 1 YEAR OLD AT WELL BABY CLINIC  
CHULALONGKORN HOSPITAL. THESIS ADVISOR : ASSO.PROF.SANGKOM  
CHONGPIPATVANICH,M.D. 54 pp. ISBN 974-636-638-6

The objective of this study is to know prevalence and factors associated with constipation in children under 1 year old .This is a cross sectional descriptive study using questionnaire to collect data by interview the children's parents who come visit well baby clinic Chulalongkorn Hospital.

The results : A total 288 questionnaires are collected.The majority of children are under 6 months of age. Almost of them were born at Chulalongkorn Hospital ,term pregnancy,normal labour and had normal birth weight in average.Family income is about 10,000 Baht by average .56.2 percent of children had normal stool consistency.There are 12 children whose stool are very hard consistency,associated with difficult defecation and bleeding per rectum.By this way,prevalence of constipation is 4.2 percent.Majority of children pass stool once a day.We found that the constipated children have received formula less frequent and larger amount than non constipated children ( $p<0.05$ ).They also have received supplementary foods more frequent with start at less age than non constipated children.There are no significant different in formula brand,humanized or follow on formula ,kinds of supplement food and family history of constipation among constipated and non constipated group.

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา อุตสาหกรรมศาสตร์

ลายมือชื่อนิสิต

สาขาวิชา อุตสาหกรรมศาสตร์

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2538

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

กิตติกรรมประภาค



วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จอุล่วงไปได้ ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีเยี่ยมของรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สังคม จงพิพัฒน์พิชัย อาหารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็น ต่างๆ ในการทำวิจัยด้วยความตลอด ขอขอบคุณคุณปักนา ศิริมงคล พยาบาลประจำหน่วยโภชนาการ ภาควิชาภูมิเรเวชศาสตร์ คุณสันทนา บุญไช และคุณໄสกา ถินสอน ครูประจำโครงการสอนเด็ก เจ็บป่วยเรื้อรัง ภาควิชาภูมิเรเวชศาสตร์ ที่ได้ช่วยเหลือประสานงานในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และพยาบาลทุกท่านที่แผนกผู้ป่วยนอก ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเก็บ ข้อมูล

ท้ายนี้ ขอรับขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ซึ่งเป็นกำลังใจให้มามาโดยตลอด

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญ

หน้า	
๔	บทคัดย่อภาษาไทย.....
๙	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....
๙	กิตติกรรมประกาศ.....
๙	สารบัญ.....
๑๖	สารบัญตาราง.....
๒๕	บทที่
๑	1. บทนำ.....
๑	1.1 ความสำคัญและที่มาของการวิจัย.....
๒	1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....
๓	1.3 สมมติฐานของการวิจัย.....
๓	1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....
๔	2. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง.....
๔	2.1 ความซูก.....
๔	2.2 นิยาม.....
๕	2.3 ลักษณะการเคลื่อนไหวปกติของลำไส้.....
๖	2.4 การศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะท้องผูก.....
๘	3. วิธีการวิจัย.....
๘	3.1 นิยาม.....
๘	3.2 รูปแบบของการวิจัย.....
๘	3.3 ระเบียบวิธีการวิจัย.....
๙	3.4 การคำนวณขนาดตัวอย่าง.....
๙	3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล.....
๑๐	3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล.....
๑๑	3.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย.....
๑๒	4. ข้อมูลทั่วไป.....
๑๘	5. ผลการศึกษา.....
๑๘	5.1 ลักษณะของการขับถ่าย.....
๒๑	5.2 ลักษณะของอาหารที่เด็กได้รับ.....

5.3 ประวัติท้องผูกในครอบครัว.....	29
6. อภิปรายผลการศึกษา.....	30
6.1 ข้อมูลทั่วไป.....	30
6.2 ถ้ากษณะของการขับถ่าย.....	31
6.3 ถ้ากษณะของการได้รับน้ำ.....	32
6.4 ถ้ากษณะของการได้รับอาหารเสริม.....	34
6.5 ประวัติท้องผูกในครอบครัว.....	34
7. สรุปและข้อเสนอแนะ.....	35
รายการอ้างอิง.....	36
ภาคผนวก.....	38
ประวัติผู้เขียน.....	43

# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.....	11
แสดงจำนวนเด็กแยกตามอายุ	
ตารางที่ 2.....	12
แสดงจำนวนเด็กแยกตามสถานที่คลอด	
ตารางที่ 3.....	12
แสดงจำนวนเด็กแยกตามวิธีการคลอด	
ตารางที่ 4.....	13
แสดงจำนวนเด็กแยกตามอายุครรภ์ขณะคลอด	
ตารางที่ 5.....	13
แสดงจำนวนเด็กแยกตามน้ำหนักแรกคลอด	
ตารางที่ 6.....	14
แสดงจำนวนเด็กแยกตามน้ำหนักปัจจุบัน	
ตารางที่ 7.....	14
แสดงจำนวนเด็กแยกตามส่วนสูง	
ตารางที่ 8.....	15
แสดงจำนวนเด็กแยกตามอายุของบิดามารดา	
ตารางที่ 9.....	15
แสดงจำนวนเด็กแยกตามอาชีพของบิดามารดา	
ตารางที่ 10.....	16
แสดงจำนวนเด็กแยกตามรายได้รวมต่อเดือนของครอบครัว	
ตารางที่ 11.....	17
แสดงจำนวนเด็กแยกตามลักษณะของอุจจาระ	
ตารางที่ 12.....	18
แสดงอาการที่พบร่วมกับการถ่ายอุจจาระแยกตามกลุ่มเด็ก	
ตารางที่ 13.....	18
แสดงอาการอื่น ๆ ที่พบในเด็กทั้ง 2 กลุ่ม	



ตารางที่ 28.....	28
แสดงจำนวนเด็กแยกตามชนิดของอาหารเสริมที่ได้รับในช่วง 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา	
ตารางที่ 29.....	28
แสดงจำนวนเด็กที่ได้รับและไม่ได้รับวิตามินในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา	
ตารางที่ 30.....	29
แสดงจำนวนเด็กแยกตามประวัติท้องผูกในครองครัว	
ตารางที่ 31.....	29
แสดงจำนวนเด็กแยกตามความสัมพันธ์ของญาติที่มีประวัติท้องผูกกับเด็ก	

  
**ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**