



### ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิจัยเรื่อง ความรู้ ทัคณคติ และการปฏิบัติตนเองเกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้บริหารสถานศึกษา และครุอนามัย โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัคณคติ และการปฏิบัติตนเองเกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้บริหารสถานศึกษาและครุอนามัยโรงเรียน และเพื่อเปรียบเทียบ ความรู้ ทัคณคติ และการปฏิบัติตนเองเกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้บริหารสถานศึกษา และครุอนามัยโรงเรียน ผู้วิจัยได้ทำการสุ่มตัวอย่างประชากรแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 800 คน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 400 คน ครุอนามัยโรงเรียน 400 คน ซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 8 ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามของผู้บริหารศึกษา 392 ฉบับ ของครุอนามัยโรงเรียน 392 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.00

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำหรับ SPSS<sub>x</sub> ของสถาบันคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยนำเสนอ โดยแยกออกเป็น 4 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับครุอนามัยโรงเรียน

ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ตอนที่ 3 ทัคณคติเกี่ยวกับโรคเอดส์

ตอนที่ 4 การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหาร และครุโภนาเมียโรงเรียนประถมศึกษา  
ผู้วิจัยนำข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารมาแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละของข้อมูล  
เป็นรายชื่อ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3

ตารางที่ 2 จำนวนและค่าร้อยละของผู้บริหาร และครุโภนาเมียโรงเรียน  
จำแนกตามเพศ อายุ สтанวนภาพของครอบครัว ระดับการศึกษา

รายการ	ผู้บริหาร ( N=392 )		ครุโภนาเมีย ( N=392 )	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. เพศ				
ชาย	360	91.83	54	13.80
หญิง	32	8.17	338	86.20
2. อายุ				
21-25 ปี	0	0	3	0.80
26-30 ปี	6	1.50	17	4.30
31-35 ปี	23	5.90	115	29.30
36-40 ปี	69	17.90	132	33.70
41-45 ปี	110	28.10	80	20.40
46-50 ปี	64	16.30	26	6.60
51-55 ปี	91	23.20	13	3.30
56-60 ปี	29	7.40	6	1.50

## ตารางที่ 2 ต่อ

รายการ	ผู้บริหาร		ครุ_na_mย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>3. สถานภาพของครอบครัว</b>				
โสด	11	2.80	33	8.40
สมรส	366	93.40	312	79.60
หย่า	7	1.80	33	8.40
แยกกันอยู่	1	0.30	3	0.80
หม้าย	7	1.80	11	2.80
<b>4. ระดับการศึกษา</b>				
ต่ำกว่าปริญญาตรี	37	9.40	81	20.70
ปริญญาตรี	347	88.50	310	79.00
สูงกว่าปริญญาตรี	8	2.10	1	0.30

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 91.83 และครุ\_na\_mย์โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 86.20 ผู้บริหารส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.10 ครุ\_na\_mย์โรงเรียนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.70

สถานภาพสมรสของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่สมรสแล้ว ร้อยละ 93.40 รองลงมาเป็นโสด ร้อยละ 2.80 และครุ\_na\_mย์โรงเรียนส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 79.60

เมื่อพิจารณา rate ดับการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน พบว่าผู้บริหารจำนวนมากมี  
รุ่นพิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 88.50 รองลงมาคือรุ่นพิการต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ  
9.40 และครุอนามัยโรงเรียน ส่วนใหญ่มีรุ่นพิการศึกษาระดับปริญญาตรี เช่นกัน คือ  
ร้อยละ 79.00 และรุ่นพิกรองลงมาคือรุ่นพิการต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20.70

ตารางที่ 3 จำนวนและค่าร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา และครุนาમัยโรงเรียน ที่ได้รับข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ การได้รับการอบรมเรื่องโรคเอดส์ การที่นักเรียนมาเรียนมาเรียนมาปรึกษาหารือ ชักถ้าม ในเรื่องโรคเอดส์ การล้มเหลวปัจจุบัน โรคเอดส์ การได้รับการตรวจเชื้อเอดส์ และผลการตรวจเชื้อเอดส์

รายการ	ผู้บริหาร		ครุนาມัย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
(N=392)			(N=392)	
<b>1. แหล่งการได้รับข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์</b>				
โทรทัศน์	379	96.70	381	97.20
วิทยุ	330	84.20	322	82.10
หนังสือพิมพ์	361	92.10	360	91.80
เพื่อนครุ	222	56.60	242	61.70
ญาติ พี่ น้อง สมาชิกในครอบครัว	149	38.00	155	39.50
นิตยสารทางการแพทย์	251	64.00	262	66.80
ใบปลิว แผ่นพับ	300	76.50	253	64.50
เจ้าหน้าที่อนามัย แพทย์ พยาบาล	318	81.10	325	82.90
แหล่งอื่น ๆ	31	7.90	38	9.70
<b>2. การได้รับการอบรมเรื่องโรคเอดส์</b>				
เคย	154	39.28	130	33.20
ไม่เคย	238	60.71	262	66.80

ตารางที่ 3 ต่อ

รายการ	ผู้บริหาร		ครุอ่านมัย			
	(N = 392)	(N=392)	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>3. การสอนหรือให้ความรู้นักเรียน ในเรื่องโรคเอดส์</b>						
เคย	336	85.71	342	87.20		
ไม่เคย	56	14.29	50	12.80		
<b>4. นักเรียนเคยมาปรึกษาหารือ ชักถาม ในเรื่องโรคเอดส์</b>						
เคย	124	31.64	162	41.30		
ไม่เคย	268	68.36	230	58.70		
<b>5. การล้มผัลกับผู้ป่วยโรคเอดส์</b>						
เคย	3	0.80	4	1.0		
ไม่เคย	389	99.20	388	99.00		
<b>6. เคยได้รับการตรวจเชื้อเอดส์</b>						
เคย	35	8.90	37	9.40		
ไม่เคย	357	91.10	355	90.60		

ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายการ	ผู้บริหาร		ครุอนามัย	
	(N=392)		(N=392)	
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อย%				
เลือดบาง	0	0	0	0
เลือดลบ	17	4.30	30	7.60
อื่น ๆ	14	3.60	7	1.80

7. ผลการตรวจเชื้อเออดล์

เลือดบาง	0	0	0	0
เลือดลบ	17	4.30	30	7.60
อื่น ๆ	14	3.60	7	1.80

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ ได้รับข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับ โรคเออดล์จาก โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 96.70 รองลงมา คือ หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 92.10 เช่นเดียวกับครุอนามัยโรงเรียน ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับโรคเออดล์ จากโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 97.20 และรองลงมา คือ หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 91.80

เมื่อพิจารณาด้านการได้รับการอบรม เรื่องโรคเออดล์ พบว่า ผู้บริหารจำนวนมาก ไม่เคยได้รับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 60.71 ไม่เคยล้มเหลวกับผู้ป่วยโรคเออดล์ คิดเป็นร้อยละ 99.20 การได้รับการตรวจหาเชื้อเออดล์ ผู้บริหารร้อยละ 8.90 เคยตรวจหาเชื้อ เอดล์ซึ่งผลการตรวจ พบว่า เป็นเลือดลบ ร้อยละ 4.30 ครุอนามัยโรงเรียนส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 66.80 ไม่เคยได้รับการอบรมเรื่องโรคเออดล์ และไม่เคยล้มเหลวกับผู้ป่วย โรคเออดล์ คิดเป็นร้อยละ 99.00 ไม่เคยได้รับการตรวจหาเชื้อเออดล์ คิดเป็นร้อยละ 90.60 และพบว่า ครุอนามัยโรงเรียน ร้อยละ 9.40 เคยตรวจหาเชื้อเออดล์ ซึ่งผลการตรวจ ร้อยละ 7.60 เป็นเลือดลบ



ตอนที่ 2 ความรู้ และการเปรียบเทียบความรู้ของผู้บริหาร และครุอนามัยโรงเรียน  
ประถมศึกษา เกี่ยวกับโรคเอดส์

ผู้วิจัยได้ตรวจให้คะแนนความรู้ เกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้บริหาร และครุอนามัย โรงเรียน และนำมาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) ค่าล่วงเบียงเบน มาตรฐาน ( $SD$ ) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนน โดยการทดสอบค่า "ที" (T-Test) ดังปรากฏผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4 ถึง ตารางที่ 12

ตารางที่ 4 จำนวน และค่าร้อยละของระดับคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ของผู้บริหาร

เกณฑ์ระดับความรู้	ผู้บริหาร		ครุอนามัย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ความรู้สูงมาก	80-100	20-25	82	20.90
ความรู้สูง	70-79	17-19	221	56.40
ความรู้ปานกลาง	60-69	15-16	88	22.40
ความรู้ต่ำ	40-59	10-14	1	0.30
ความรู้ต่ำมาก	0-39	0-9	0	0
รวม		392	100	392
				100

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.40 มีความรู้ เกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับสูง รองลงมา ร้อยละ 22.40 มีความรู้ระดับปานกลาง และ มีความรู้อยู่ในระดับสูงมาก คิดเป็นร้อยละ 20.90

เมื่อพิจารณาความรู้เกี่ยวกับโรคเอเดล์ของครูอนามัยโรงเรียน พบว่า  
ร้อยละ 47.40 มีความรู้สูงในระดับสูง รองลงมา ร้อยละ 33.40 มีความรู้สูงมาก และ  
ร้อยละ 18.10 มีความรู้ระดับปานกลาง

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในด้านความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้บริหารโรงเรียน

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	ผู้บริหาร (N=392)		ระดับ ความรู้
		Χ	SD	
1.	โรคเอดส์หมายถึง โรคที่เกิดจากกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายเลื่อมหรือบกพร่อง	0.81	0.38	สูงมาก
2.	โรคเอดส์เกิดจากเชื้อไวรัส HIV	0.76	0.42	สูง
3.	เชื้อโรคเอดส์เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะไปทำลายเซลล์เม็ดโลหิตขาว	0.64	0.47	ปานกลาง
4.	การแพร่รับจากของโรคเอดส์ พนในทวีป แอนฟริกาเป็นแห่งแรก	0.75	0.43	สูง
5.	อาการของผู้ป่วยโรคเอดส์ในระยะสุดท้าย คืออาการ ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ และระบบลมไอง	0.37	0.48	ต่ำมาก
6.	ปัจจุบันพบว่ากลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคเอดส์มากที่สุด คือกลุ่มที่สำล่อนทางเพศ	0.88	0.32	สูงมาก
7.	พฤติกรรมที่ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ คือการลัมผัลเมียกับผู้เป็นโรคเอดส์	0.89	0.30	สูงมาก
8.	โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรงเพรา เป็นแล้วต้องตายทุกราย ยังไม่มียารักษา	0.94	0.22	สูงมาก
9.	ระยะปฐมภูมิอาการของโรคเอดส์ ใช้เวลาไม่นาน อาจปะก្សาอาการเรื้อรังซ้ำ	0.69	0.46	ปานกลาง

## ตารางที่ 5(ต่อ)

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	ผู้บริหาร (N=392)		ระดับ ความรู้
		$\bar{X}$	SD	
10.	อาการที่ไปป้องผู้มีอาการล้มพ้นกับเอดส์ ที่ลังเกตได้คือ อาการ มีไข้เรื้อรัง น้ำหนักลด ห้องเลียเรื้อรัง	0.21	0.41	ต่ำมาก
11.	พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์คือ <sup>*</sup> การลักผัวหนัง	0.80	0.39	สูงมาก
12.	บุคคลที่เป็นผู้เสี่ยงต่อโรคเอดส์มากที่สุดคือ <sup>*</sup> ชายที่มีเพศล้มพ้นกับเพศเดียวกัน	0.61	0.48	ปานกลาง
13.	โรคเอดส์มักจะติดต่อทางเพศล้มพ้นมากที่สุด	0.77	0.41	สูง
14.	ผู้เป็นโรคเอดส์เกิดจากการติดยาเสพติด เอโรอินชนิดนิด	0.99	0.08	สูงมาก
15.	กลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มสิสเกต	0.71	0.45	สูง
16.	โรคเอดส์เป็นแล้วต้องตายทุกราย เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องที่สุด	0.87	0.32	สูงมาก
17.	ความสามารถตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ได้ ด้วยวิธีตรวจเลือด	0.99	0.07	สูงมาก
18.	ถ้าท่านติดเชื้อเอดส์ ท่านจะปฏิบัติตน อย่างไร	0.81	0.39	สูงมาก
19.	สถานพยาบาลที่รับตรวจเชื้อเอดส์ ได้แก่ โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาล ศูนย์ทุกแห่ง ศูนย์กำกับโรคเขตทุกเขต	0.98	0.11	สูงมาก

## ตารางที่ 5 (ต่อ)

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	ผู้บริหาร (N=392)		ระดับความรู้
		$\bar{X}$	SD	
20.	วิธีป้องกันโรคเอดส์ได้ดีที่สุด คือ ไม่ลามสู่ทางเพศ	0.97	0.14	สูงมาก
21.	คลินิกนิรนาม คือ คลินิกรับปรึกษา และตรวจเชื้อเอดส์โดยไม่ต้องแจ้ง <sup>ชื่อผู้รับบริการ</sup>	0.80	0.40	สูงมาก
22.	ปัจจุบันสถิติผู้ติดเชื้อเอดส์มากที่สุด ในประเทศไทย คือกลุ่มผู้ติดยาเสพติด	0.09	0.30	ต่ำมาก
23.	การพูดคุยหรือล้มผัลกับผู้ป่วยโรคเอดส์ จะทำให้ไม่ติดเชื้อเอดส์	0.64	0.48	ปานกลาง
24.	ในการตรวจหาเชื้อเอดส์เมื่อตรวจพบว่า <sup>เลือดเป็นบวก</sup> แสดงว่ามีเชื้อเอดส์แล้ว สามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้	0.27	0.44	ต่ำมาก
25.	ท่านจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคเอดส์ได้ โดยการใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์	0.88	0.31	สูงมาก
รวม		18.25	2.67	สูง

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 18.25 (จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน)

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารมีความรู้อยู่ในระดับต่ำมาก จำนวน 3 ข้อ ดังนี้

1. อาการทั่วไปของผู้ที่มีอาการล้มพั่นซึ่งกับเอดส์ที่ลังเกตได้ คืออาการ มีไข้เรื้อรัง น้ำหนักลด ห้องเลือดเรื้อรัง
2. ปัจจุบันสถิติของผู้ติดเชื้อเอดส์มากที่สุดในประเทศไทย คือกลุ่ม ผู้ติดยาเสพติด
3. ในการตรวจหาเชื้อเอดส์ เมื่อพบว่า เลือดเป็นbaugh แสดงว่า มีเชื้อ เอดส์และสามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในด้านความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของครูอนามัยโรงเรียน

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	ครูอนามัย (N=392)		ระดับ ความรู้
		$\bar{X}$	SD	
1.	โรคเอดส์หมายถึงกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายเสื่อมหรือบกพร่อง	0.83	0.37	สูงมาก
2.	โรคเอดส์เกิดจากเชื้อไวรัส HIV	0.82	0.38	สูงมาก
3.	เชื้อโรคเอดส์เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะไปทำลายเซลล์เม็ดโลหิตขาว	0.64	0.47	ปานกลาง
4.	การแพร่รับน้ำดูดของโรคเอดส์ พบในทวีปแอฟริกา เป็นแห่งแรก	0.76	0.42	สูง
5.	อาการของผู้ป่วยโรคเอดส์ในระยะสุดท้ายคืออาการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจและระบบลมไอง	0.47	0.50	ต่ำ
6.	ปัจจุบันพบว่ากลุ่มที่เลี้ยงต่อโรคเอดส์มากที่สุดคือกลุ่มบุคคลที่สำเนียงงานเพศ	0.85	0.34	สูงมาก
7.	พฤติกรรมที่ไม่เลี้ยงต่อการติดเชื้อเอดส์คือ การล้มพลังกับผู้เป็นโรคเอดส์	0.90	0.29	สูงมาก
8.	โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรงเพราะเป็นแล้วต้องตายทุกรายไม่มีการรักษา	0.94	0.23	สูงมาก

## ตารางที่ 6(ต่อ)

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	ครุฑานามัย(N=392)		ระดับ ความรู้
		$\bar{X}$	SD	
9.	ระยะป্রากฎอาการของโรคเอดส์ ใช้เวลา ไม่แน่นอน อาจปรากฏอาการเรื้อรังหรือช้าก็ได้	0.70	0.45	สูง
10.	อาการทั่วไปของผู้มีอาการล้มเหลวที่เกิด ที่ลังเกตได้คือ มีไข้เรื้อรัง น้ำหนักลด ห้องเสียเรื้อรัง	0.22	0.41	ต่ำมาก
11.	พฤติกรรมที่เลี้ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ คือการลักผัวหนัง	0.79	0.40	สูง
12.	บุคคลที่เป็นผู้เลี้ยงต่อโรคเอดส์มากที่สุด คือชายที่มีเพศล้มเหลวที่กับเพศเดียวกัน	0.65	0.47	ปานกลาง
13.	โรคเอดส์มักจะติดต่อทางเพศล้มเหลวมากที่สุด	0.82	0.38	สูงมาก
14.	ผู้เป็นโรคเอดส์เกิดจากการติดยาเสพติด เอโรบินชนิดฉีด	0.98	0.12	สูงมาก
15.	กลุ่มที่เป็นกลุ่มเลี้ยงต่อโรคเอดส์มากที่สุด คือกลุ่มโลเกต	0.77	0.41	สูง
16.	โรคเอดส์เป็นแล้วต้องตายทุกรายเป็น คำกล่าวที่ถูกต้องที่สุด	0.89	0.31	สูงมาก
17.	ความสามารถตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ได้ ด้วยวิธีตรวจเลือด	0.98	0.10	สูงมาก
18.	ถ้าท่านติดเชื้อเอดส์ ท่านจะปฏิบัติคนอย่างไร	0.88	0.31	สูงมาก

## ตารางที่ 6(ต่อ)

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	ครุฑานามัย (N=392)		ระดับ ความรู้
		$\bar{X}$	SD	
19.	สถานพยาบาลที่รับตรวจเชื้อเอดส์มีที่ โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลศูนย์ ทุกแห่ง และศูนย์การเอดส์ขนาดใหญ่	0.96	0.17	สูงมาก
20.	วิธีป้องกันโรคเอดส์ได้ดีที่สุด คือ ไม่สำลักอนทางเพศ	0.97	0.14	สูงมาก
21.	คลินิกนิรนาม คือ คลินิกรับบริการ และตรวจเชื้อเอดส์ โดยไม่ต้อง <sup>*</sup> แจ้งชื่อผู้รับบริการ	0.84	0.35	สูงมาก
22.	ปัจจุบันสถิติผู้ติดเชื้อเอดส์มากที่สุด ในประเทศไทย คือกลุ่มผู้ติดยาเสพติด	0.09	0.28	ต่ำมาก
23.	การพัฒนาหรือล้มเหลวแก้ปัญหาโรคเอดส์ จะทำให้ไม่ติดเชื้อเอดส์	0.75	0.43	สูง
24.	ในการตรวจหาเชื้อเอดส์เมื่อตรวจพบว่า <sup>*</sup> เลือดเป็นน้ำเงิน แสดงว่าติดเชื้อเอดส์และ สามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้	0.41	0.49	ต่ำ
25.	ท่านจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคเอดส์ได้ ด้วยการใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมาเพศสัมพันธ์	0.86	0.34	สูงมาก
รวม		18.90	2.81	สูง

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า ครูอนามัยโรงเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดล์อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 18.90 (จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูอนามัยโรงเรียน มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดล์อยู่ในระดับต่ำมาก จำนวน 2 ข้อ คือ

1. อาการทั่วไปของผู้ที่มีอาการล้มพังทั้งหมดที่ลังเกตได้ คือ มีไข้เรื้อรัง น้ำหนักลด ห้องเสียรือรัง
2. ปัจจุบันสถิติผู้ติดเชื้อเอดล์ มากที่สุดในประเทศไทย คือกลุ่มผู้ติดยาเสพติด

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความรู้ เกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้บริหาร และ ครุอานามัยโรงเรียน

ลำดับ ที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	ผู้บริหาร (N=392)		ครุอานามัย (N=392)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
1.	โรคเอดส์หมายถึง กลุ่มอาการของโรค ที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกาย เลื่อมหรือบกพร่อง	0.81	0.03	0.83	0.37	-0.47
2.	โรคเอดส์เกิดจากเชื้อไวรัส HIV	0.76	0.42	0.82	0.38	-2.20*
3.	เชื้อโรคเอดส์เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะไปทำลายเซลล์เม็ดโลหิตขาว	0.64	0.47	0.64	0.47	0.00
4.	การแพร่รำบัดของ โรคเอดส์ พนในทวีปแอฟริกา เป็นแห่งแรก	0.75	0.43	0.76	0.42	-0.25
5.	อาการของผู้ป่วยโรคเอดส์ ในระยะสุดท้าย คืออาการติดเชื้อระบบ ทางเดินหายใจและระบบสมอง	0.37	0.48	0.47	0.50	-2.98*
6.	ปัจจุบันพบว่ากลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคเอดส์ มากที่สุดคือบุคคลที่สำลักทางเพศ	0.88	0.32	0.85	0.34	0.85
7.	พฤติกรรมที่ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ การลัมผัลเมือกับผู้เป็นโรคเอดส์	0.89	0.30	0.90	0.29	0.36
8.	โรคเอดส์ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เพราเป็นแล้วไม่มีทางรักษาให้หายได้	0.94	0.22	0.94	0.23	0.47

## ตารางที่ 7(ต่อ)

ลำดับ ที่	ความรู้สึกยังกับโรคเอเดล์	ผู้บริหาร (N=392)		ครอบครัว (N=392)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
9.	ระยะ pragmatics ของการของโรคเอเดล์ ใช้เวลาไม่นาน อาจจะ pragmatics อาการ เรื้อรัง ช้าๆ ได้	0.69	0.46	0.70	0.45	-0.47
10.	อาการทั่วไปของผู้มีอาการล้มเหลว กับ เอเดล์ที่ลังเกตได้ คือ อาการ มีไข้เรื้อรัง น้ำหนักลด ห้องเสียเรื้อรัง	0.21	0.41	0.22	0.41	-0.34
11.	พฤติกรรมที่เลี้ยงต่อการติดเชื้อ โรคเอเดล์ คือการลักษณะนั้น	0.80	0.39	0.79	0.40	0.36
12.	บุคคลที่เป็นผู้เลี้ยงต่อโรคเอเดล์มากที่สุด คือชายที่มีเพศล้มเหลว กับเพศเดียวกัน	0.61	0.48	0.65	0.47	-1.11
13.	โรคเอเดล์มากจะติดต่อทางเพศล้มเหลว มากที่สุด	0.77	0.41	0.82	0.38	-1.78
14.	ผู้เป็นโรคเอเดล์เกิดจากการ ติดยาเสพติดเօโรอิน	0.99	0.08	0.98	0.12	1.01
15.	กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เลี้ยงต่อโรคเอเดล์ มากที่สุด คือกลุ่มโลเกต	0.71	0.45	0.77	0.41	-1.72
16.	โรคเอเดล์เป็นแล้วต้องพยายาม เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องที่สุด	0.87	0.32	0.89	0.31	-0.67

## ตารางที่ 7(ต่อ)

ลำดับ ที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	ผู้บริหาร (N=392)		ครอนามัย (N=392)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
17.	ความสามารถตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ ได้ด้วยวิธีตรวจเลือด	0.99	0.07	0.98	0.10	0.82
18.	ถ้าท่านติดเชื้อเอดส์ ท่านจะปฏิบัติน อย่างไร	0.81	0.39	0.88	0.31	-3.01*
19.	สถานพยาบาลที่รับตรวจเชื้อเอดส์ ได้แก่โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลศุนย์ ทุกแห่ง และ ศูนย์การโรคเขต	0.98	0.11	0.96	0.17	1.72
20.	วิธีป้องกันโรคเอดส์ได้ดีที่สุด คือ ไม่สำลักหักพะ	0.97	0.14	0.97	0.14	0.00
21.	คลินิกนิรนาม คือ คลินิกรับปรึกษา <sup>และตรวจเชื้อเอดส์โดยไม่ต้อง</sup> ระบุชื่อผู้รับบริการ	0.80	0.40	0.84	0.35	-1.79
22.	ปัจจุบันสถิติผู้ติดเชื้อเอดส์มากที่สุด ในประเทศไทย คือกลุ่มผู้ติดยาเสพติด	0.09	0.30	0.09	0.28	0.36
23.	การผดุงคุยหรือล้มผัลกับผู้ป่วย โรคเอดส์จะทำให้ไม่ติดเชื้อเอดส์	0.64	0.48	0.75	0.43	-3.36*

## ตารางที่ 7(ต่อ)

ลำดับ ที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	ผู้บริหาร (N=392)		ครุอนามัย (N=392)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
24.	ในการตรวจหาเชื้อเอดส์เมื่อตรวจพบว่าเลือดเป็นbaugh และงว่ามีเชื้อเอดส์และสามารถแพร่กระจายสู่อื่นได้	0.27	0.44	0.41	0.49	-3.94*
25.	ท่านจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ได้โดยการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์	0.88	0.31	0.86	0.34	0.86
รวม		18.25	2.6	18.90	2.81	-3.31*

\* p<.05 (.05t  $\alpha = \pm 1.96$ )

จากตารางที่ 7 เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยล้วนรวม ระหว่างผู้บริหาร และครุอนามัยโรงเรียน พบว่า ผู้บริหาร และครุอนามัยโรงเรียนมี ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครุอนามัย มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ตึกว่าผู้บริหาร และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหาร และครุอนามัยโรงเรียน มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 จำนวน 5 ข้อ คือ

1. โรคเอดส์เกิดจากเชื้อไวรัส HIV
2. อาการของผู้ป่วยโรคเอดส์ในระยะลุต้าม คืออาการติดเชื้อทางระบบหายใจและระบบสมอง
3. ถ้าท่านติดเชื้อเอดส์ท่านจะปฏิบัตินอย่างไร
4. การพูดคุยหรือล้มผ้าสักบผู้ป่วยโรคเอดส์จะทำให้ไม่ติดเชื้อเอดส์
5. ในการตรวจหาเชื้อเอดส์เมื่อตรวจพบว่าเลือดเป็นบวกแสดงว่า มีเชื้อเอดส์และสามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความรู้ ด้านความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับโรคเอดส์ระหว่างของผู้บริหาร  
และครุอนามัยโรงเรียน

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ด้านความรู้ทั่วไป	ผู้บริหาร		ครุอนามัย		$t$	
		(N=392)		(N=392)			
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD		
1.	โรคเอดส์หมายถึงกลุ่มอาการที่ เกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายเสื่อม หรือทนพ้อง	0.81	0.30	0.83	0.37	-0.47	
2.	การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ พบในกวีปและฟริกาเป็นแห่งแรก	0.75	0.43	0.76	0.42	-0.25	
3.	คลินิกนิรนาม คือ คลินิกรับปรึกษา และตรวจเชื้อโรคเอดส์โดยไม่ต้อง <sup>*</sup> แจ้งชื่อผู้รับบริการ	0.80	0.40	0.84	0.35	-1.79	
4.	ปัจจุบันสถิติผู้ติดเชื้อเอดส์มากที่สุด ในประเทศไทย คือ กลุ่มผู้ ติดยาเสพติด	0.09	0.30	0.09	0.28	0.36	
รวม		0.61	0.20	0.63	0.19	-1.09	

\*  $p < .05$  ( $.05t \approx \pm 1.96$ )

จากตารางที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบความรู้สึกว่ากับโรคเอดส์ด้านความรู้ทั่วไป โดยส่วนรวมระหว่างผู้บริหาร และครุอนามัยโรงเรียน พบว่า ผู้บริหาร และครุอนามัย โรงเรียนมีความรู้สึกว่ากับโรคเอดส์ ด้านความรู้ทั่วไปไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารและครุอนามัย โรงเรียนมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคเอดส์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นกัน

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบความรู้ เกี่ยวกับโรคเอดส์ระหว่างผู้บริหาร และ ครุอนามัยโรงเรียน  
ในด้านสาเหตุของโรค

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ด้านสาเหตุของโรค	ผู้บริหาร (N=392)		ครุอนามัย (N=392)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
1.	โรคเอดส์เกิดจากเชื้อไวรัส HIV	0.76	0.42	0.82	0.38	-2.20*
2.	ผู้เป็นโรคเอดส์เกิดจากการ ติดยาเสพติดเช่นโรตีน	0.99	0.08	0.98	0.12	1.01
3.	การพูดคุยหรือล้มผัลกับผู้ป่วย โรคเอดส์จะทำให้ไม่ติดเชื้อเอดส์	0.64	0.22	0.75	0.43	-3.36*
รวม		0.79	0.22	0.85	0.20	-3.56*

\* p<.05 (.05 t  $\pm$  1.96)

จากตารางที่ 9 เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ด้านสาเหตุของโรค โดยส่วนรวมระหว่างผู้บริหารและครุอนามัยโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารและครุอนามัยโรงเรียน มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ด้านสาเหตุของโรค แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยครุอนามัยโรงเรียน มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในด้านสาเหตุของ โรคติดกว่าผู้บริหาร และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารและครุอนามัยโรงเรียน มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ด้านสาเหตุของโรค แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 จำนวน 2 ข้อ โดยครุอนามัยโรงเรียนมีความรู้ดีกว่าผู้บริหาร ได้แก่ ข้อ

1. โรคเอดส์เกิดจากเชื้อไวรัส HIV
2. การพูดคุยหรือล้มผัลกับผู้ป่วยโรคเอดส์จะไม่ทำให้ติดเชื้อเอดส์

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบความรู้ เกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้บริหาร และ ครุอนามัยโรงเรียน  
ในด้านการติดต่อของโรค

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ด้านการติดต่อของโรค	ผู้บริหาร (N=392)		ครุอนามัย (N=392)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
1.	เชื้อโรคเอดส์ เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะไปทำลายเซลล์เม็ดโลหิตขาว	0.64	0.47	0.64	0.47	0.00
2.	ปัจจุบันพบว่ากลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคเอดส์ มากที่สุด กลุ่มที่ลำส่อนทางเพศ	0.88	0.32	0.84	0.34	0.85
3.	โรคเอดส์ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เพราะเป็นแล้วต้องตายทุกราย ยังไม่มียารักษา	0.94	0.22	0.94	0.23	0.47
4.	พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ โรคเอดส์คือการลักพาตัวหนัง	0.80	0.39	0.79	0.40	0.36
5.	บุคคลที่เป็นผู้เสี่ยงต่อโรคเอดส์ มากที่สุดคือชายที่มีเพศสัมพันธ์กับ เพศเดียวgan	0.61	0.48	0.65	0.47	-1.11
6.	โรคเอดส์มักจะติดต่อทาง เพศสัมพันธ์มากที่สุด	0.77	0.41	0.82	0.38	-1.78
7.	กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อ โรคเอดส์มากที่สุด คือ กลุ่มโอลิเวนซี	0.71	0.45	0.77	0.41	-1.72



ตารางที่ 10 (ต่อ)

ลำดับที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ด้านการติดต่อของโรค	ผู้บริหาร (N=392)		ครูอนามัย (N=392)		$t$
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
8.	โรคเอดส์เป็นแล้วต้องตายทุกราย เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องที่สุด	0.87	0.32	0.89	0.31	-0.67
	รวม	0.78	0.18	0.79	0.17	-1.18

\*  $p < .05$  (.05  $t \infty = \pm 1.96$ )

จากตารางที่ 10 เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในด้านการติดต่อของโรค โดยล้วนรวมระหว่างผู้บริหารและครูอนามัยโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารและครูอนามัยโรงเรียน มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ด้านการติดต่อของโรคไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารและครูอนามัยโรงเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ด้านการติดต่อของโรค ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบความรู้ เกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้บริหาร และ ครุอนามัยโรงเรียน  
ในด้านอาการของโรค

ลำดับที่	ด้านอาการของโรค	ผู้บริหาร		ครุอนามัย		t	
		(N=392)		(N=392)			
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD		
1.	อาการของผู้ป่วยโรคเอดส์ ในระยะสุดท้าย คืออาการ ติดเชื้อของระบบทางเดิน หายใจและระบบสมอง	0.37	0.48	0.47	0.50	-2.98*	
2.	ระยะปฐมภูมิอาการของโรคเอดส์ ใช้เวลาไม่นาน อาจเรื้อรังหรือข้ากได้	0.67	0.46	0.70	0.45	-0.47	
3.	อาการทั่วไปของผู้มีอาการล้มพ้นชั่ว กับเอดส์ที่ลังเกตได้ดี ไม่ใช้เรือรัง น้ำหนักลด ห้องเลียเรือรัง	0.21	0.41	0.22	0.41	-0.34	
4.	ในการตรวจหาเชื้อเอดส์เมื่อตรวจ พบว่าเลือดเป็นบวก แสดงว่ามี เชื้อเอดส์และสามารถแพร่กระจาย สู่ผู้อื่นได้	0.27	0.44	0.41	0.49	-3.94*	
	รวม	0.38	0.21	0.45	0.23	-4.10*	

\*p<.05 (.05t  $\alpha = \pm 1.96$ )

จากตารางที่ 11 เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ในด้านอาการของโรค โดยส่วนรวมระหว่างผู้บริหารและครุอนามัยโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารและครุอนามัยโรงเรียน มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ด้านอาการของโรค แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครุอนามัยโรงเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ด้านอาการของโรค ดีกว่าผู้บริหาร แต่เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารและครุอนามัยโรงเรียน มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ด้านอาการของโรค แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ข้อ โดย ครุอนามัยโรงเรียนมีความรู้ดีกว่า ผู้บริหาร คือ

1. อาการผู้ป่วยโรคเอดส์ในระยะลุต้ามีคือ อาการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจและระบบสมอง
4. ในการตรวจหาเชื้อเอดส์ เมื่อพบว่า เลือดเป็นbaugh และว่า มีเชื้อเอดส์ และสามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้

ตารางที่ 12 เปรียบเทียบความรู้ เกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้บริหาร และ ครุอานมัยโรงเรียน  
ในด้านการป้องกันและรักษาโรค

ลำดับ ที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ด้านการป้องกันและรักษาโรค	ผู้บริหาร (N=392)		ครุอานมัย (N=392)		$t$
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
1.	พฤติกรรมที่ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอดส์คือ การลัมฟ์ลักษณะกับผู้เป็น โรคเอดส์	0.89	0.30	0.90	0.29	0.36
2.	ความสามารถตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ ได้ด้วยวิธีตรวจเลือด	0.99	0.07	0.98	0.10	0.82
3.	ถ้าท่านติดเชื้อเอดส์ ท่านจะปฏิบัติ ตนเองอย่างไร	0.81	0.39	0.88	0.31	-3.01*
4.	สถานพยาบาลที่รับตรวจเชื้อเอดส์ มีที่โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาล ศูนย์ และศูนย์ภารmicone คือ	0.98	0.11	0.96	0.17	1.72
5.	วิธีป้องกันโรคเอดส์ได้ดีที่สุด คือ ไม่สำลังทางเพศ	0.97	0.14	0.97	0.14	0.00
6.	ท่านจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคเอดส์ได้โดยการใช้ถุงยาง อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์	0.88	0.31	0.86	0.34	0.86
รวม		0.92	0.11	0.93	0.11	-0.81

\*  $p < .05$  (.05  $t \approx \pm 1.96$ )

จากตารางที่ 12 เมื่อเปรียบเทียบความรู้สึกเกี่ยวกับโรคเอดส์ ในด้านการป้องกัน และรักษาโรค โดยล้วนรวมระหว่างผู้บริหารและครุอนามัยโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารและครุอนามัยโรงเรียน มีความรู้สึกเกี่ยวกับโรคเอดส์ด้านการป้องกันและรักษาโรค ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารและครุอนามัยโรงเรียน มีความรู้สึกเกี่ยวกับโรคเอดส์ ด้านการป้องกันและรักษาโรค แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ข้อ โดยครุอนามัยมีความรู้สึกกว่าผู้บริหาร ได้แก่

3. ถ้าห้ามเด็กเชื้อเอดส์ทำงานจะปฏิบัติน อย่างไร

ตอนที่ 3 ทัศนคติ และการเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ของผู้บริหาร และครูอนามัยโรงเรียน

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบให้คะแนนทัศนคติ เกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้บริหาร และครูอนามัยโรงเรียน และนำมาหาค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) ค่าล่วงเบนมาตรฐาน (SD) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนน โดยการทดสอบค่า "ที" (T-Test) โดยล้วนรวมและเป็นรายข้อ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 13 ถึง ตารางที่ 20

ตารางที่ 13 จำนวน และค่าร้อยละของระดับคะแนนทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ของผู้บริหาร และครูอนามัยโรงเรียน

เกณฑ์ระดับทัศนคติ	ค่าเฉลี่ย	ผู้บริหาร		ครูอนามัย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ทัศนคติดีมาก	4.50 - 5.00	7	1.80	6	1.50
ทัศนคติดี	3.50 - 4.49	341	87.00	334	85.20
ทัศนคติปานกลาง	2.50 - 3.49	44	11.20	52	13.30
ทัศนคติพอใช้	1.50 - 2.49	0	0	0	0
ทัศนคติต้องแก้ไข	1.00 - 1.49	0	0	0	0
รวม		392	100	392	100

จากตารางที่ 13 แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารล้วนใหญ่ ร้อยละ 87.00 มีทัศนคติ เกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับดี รองลงมา ร้อยละ 11.20 มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อนิยารณาทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของครูอนามัยโรงเรียน พบว่า ครูอนามัยโรงเรียนล้วนใหญ่ มีทัศนคติอยู่ในระดับดี คือ ร้อยละ 85.20 และร้อยละ 13.30 อยู่ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 14 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละค้านกศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้บริหารโรงเรียนเป็นรายข้อ

ผู้บริหาร (N=392)

ลำดับที่ กศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
 N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ

1. โรคเอดส์เป็นโรคที่น่ากลัว											
ที่สุดในปัจจุบัน	327	83.8	45	11.5	13	3.3	5	1.3	0	0	
2. โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่											
ก่อให้เกิดปัญหาลังเล	297	76.2	79	20.3	9	2.3	1	.3	4	1.0	
3. เราไม่ควรใกล้ชิดกับคนที่											
เป็นโรคเอดส์	23	5.8	76	20.3	99	25.2	134	34.1	60	15.3	
4. ผู้ป่วยโรคเอดส์สามารถ											
รักษาให้หายขาดได้											
หากพบในระยะแรก	22	5.6	78	19.0	178	45.4	51	13.0	63	16.1	
5. เราอาจได้รับเชื้อเอดส์											
สักวันหนึ่ง	40	4.2	32	8.2	158	40.3	123	31.5	39	9.9	

ตารางที่ 14 (ต่อ)

ผู้บริหาร(N=392)

ลำดับที่	พัฒนาคติเกี่ยวกับโรคเอดส์	เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง									
		N	ร้อยละ	N	ร้อยละ	N	ร้อยละ	N	ร้อยละ	N	ร้อยละ
6.	ทุกคนควรจะอยู่เป็นโซด เพื่อป้องกันโรคเอดส์	12	3.1	6	1.5	6	1.5	160	40.8	208	53.1
7.	การใช้ถุงยางอนามัยไม่ สามารถป้องกันโรคเอดส์ ได้ 100 %	58	14.8	193	49.2	82	20.9	36	9.2	23	5.9
8.	การป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคเอดส์คือการไม่มี เพศสัมพันธ์กับใครเลย	22	5.6	24	6.1	42	10.7	191	48.7	113	28.8
9.	ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ควร จะได้รับการรักษา พยาบาลในโรงพยาบาล เฉพาะโรค	200	51.0	132	33.7	9	2.3	28	7.1	23	5.9

ตารางที่ 14 (ต่อ)

ผู้บริหาร (N=392)

ลำดับที่ หัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์	เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
	N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ

10. คนเป็นโรคเอดส์ไม่จำเป็น	
ต้องไปตรวจรักษาเพรา	
ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้	9 2.3 16 4.1 37 9.4 165 42.1 165 42.1
11. ผู้ติดยาเสพติดชนิดมีโอกาส	
ติดโรคเอดส์ได้	264 67.3 113 28.8 15 3.8 0 0 0 0
12. การตรวจหาเชื้อโรคเอดส์	
ในประเทศไทย มีความกันสมัย	
ได้มาตรฐานแล้วเชื่อถือได้	61 15.6 172 43.9 146 37.2 13 3.3 0 0
13. ในอนาคตอาจมียาที่สามารถ	
รักษาโรคเอดส์ได้	59 15.1 224 57.1 106 27.0 0 0 3 .8

ตารางที่ 14 (ต่อ)

ผู้บริหาร (N=392)

ลำดับที่ หัศคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
 N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ

14.	ทำเล็บหรือโกนหนวดที่ร้าน เสริมสวยมีโอกาสเสี่ยงต่อ	การเกิดโรคเอดส์	45 11.5 221 56.4 105 26.8 18 4.6 3 .8
15.	ท่านจะติดเชื้อเอดส์ถ้าท่าน	กับผู้ป่วยโรคเอดส์	20 .5 30 7.7 136 34.7 145 37.0 79 20.2
16.	ควรใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมี	เพศสัมพันธ์กับหญิงโสเภณีเท่านั้น	66 16.8 94 24.0 57 14.5 135 34.4 40 10.2
17.	โรคเอดสมักเป็นกับผู้ที่มี	พฤติกรรมรักร่วมเพศเท่านั้น	10 2.6 40 10.2 96 24.5 171 43.6 75 19.1
18.	ท่านไม่กล้าที่จะไปบริจาคโลหิต	เพราะกลัวติดเชื้อโรคเอดส์	12 3.1 65 16.6 97 24.7 156 39.8 62 15.8

ผู้บริหาร (N=392)

ลำดับที่ หัวข้อเกี่ยวกับโรคเอดส์

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ

19.	ผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลย จะไม่เป็นโรคเอดส์	22	5.6	36	8.4	158	40.3	108	27.6	71	18.1
20.	ไม่ควรให้นักเรียนที่เป็น โรคเอดส์เรียนร่วมกับคนปกติ	24	6.1	47	12.0	40	10.2	174	44.4	107	27.3
21.	โรคเอดส์นั้นเป็นโรคที่สามารถ ป้องกันได้	170	43.4	156	39.8	46	11.7	8	2.0	12	3.1
22.	ควรให้มีการบังคับบุคลทุกอาชีพ ให้ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอดส์	107	27.3	172	43.9	20	5.1	80	20.4	13	3.3
23.	ควรออกกฎหมายบังคับห้าม และขยายได้ตรวจเชื้อเอดส์ ก่อนแต่งงาน	164	41.8	168	42.9	16	4.1	35	8.9	9	2.3



ตารางที่ 14(ต่อ)

ผู้ริหาร (N=392)

ลำดับที่ หัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ

24. เมื่อทราบว่าในชุมชนมี

ผู้ติดเชื้อเอดส์ครุศราให้

นักเรียนทุกคนได้ตรวจเลือด 75 19.1 172 43.9 39 9.9 87 22.2 19 4.8

25. โรงเรียนควรให้นักเรียนเป็น

ผู้นำความรู้และเอกสาร

เกี่ยวกับโรคเอดส์ไป

เผยแพร่แก่ผู้ปกครอง 205 52.3 174 44.4 9 2.3 3 .8 0 0

26. ควรจัดให้มีการเรียน

การสอนเรื่องโรคเอดส์

ในระดับประถมศึกษา 168 42.9 207 52.8 8 2.0 9 2.3 0 0

ตารางที่ 14(ต่อ)

---

ผู้บริหาร (N=392)

ลำดับที่ หัตถศักดิ์เกี่ยวกับโรคเอดส์

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ

---

27. นักเรียนที่มีเชื้อเอดส์

สามารถแพร่กระจาย

สู่เพื่อนนักเรียนร่วมชั้นได้ 39 54.2 83 21.2 146 37.2 96 24.5 28 7.1

---

จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่มีหัตถศักดิ์เกี่ยวกับโรคเอดส์ในเรื่องโรคเอดส์เป็นโรคที่  
นำกลัวที่สุดในปัจจุบัน ร้อยละ 83.8 โรคเอดส์เป็นโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาลังคม ร้อยละ 76.2 และผู้ที่ติดยาเสพติด  
ชนิดฉีดมีโอกาสติดโรคเอดส์ได้ คิดเป็นร้อยละ 67.3

ตารางที่ 15 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของครูอนามัยโรงเรียนด้านทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ เป็นรายข้อ

ครูอนามัยโรงเรียน (N= 392)

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์	เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง									
		N	ร้อยละ	N	ร้อยละ	N	ร้อยละ	N	ร้อยละ	N	ร้อยละ
1.	โรคเอดส์เป็นโรคที่น่ากลัวที่สุด ในปัจจุบัน	347	88.5	39	9.9	2	0.5	4	1.0	0	0
2.	โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่ก่อให้ เกิดปัญหาลังเล	288	73.7	93	23.8	5	1.3	5	1.3	0	0
3.	เราไม่ควรใกล้ชิดกับคนที่เป็น โรคเอดส์	33	8.4	83	21.1	114	29.1	123	31.4	39	9.0
4.	ผู้ป่วยโรคเอดส์สามารถรักษา <sup>*</sup> ให้หายขาดได้หากพนในรายยาแรก	29	7.4	55	14.0	162	41.3	52	13.0	94	24.0
5.	เรารอจะได้รับเชื้อเอดส์ลักษณะนี้ ทุกคนควรจะอยู่เป็นโสดเพื่อ	42	10.7	52	13.2	170	43.4	86	21.9	42	10.7
6.	ป้องกันโรคเอดส์	12	3.1	15	3.8	28	7.1	161	41.1	176	44.9

ตารางที่ 15 (ต่อ)

ครุอนามัยโรงเรียน (N=392)

ลำดับที่ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
	N ร้อยละ	N ร้อยละ	N ร้อยละ	N ร้อยละ	N ร้อยละ

7. การใช้ถุงยางอนามัยไม่สามารถ

ป้องกันโรคเอดส์ได้ 100 %                    84 21.4 157 40.2 99 25.3 38 9.7 14 3.6

8. การป้องกันการแพร่ร้ายของ

โรคเอดส์คือการไม่มีเพศสัมพันธ์  
กับใครเลย    87 22.3 175 44.8 43 11.0 49 12.5 38 9.7

9. ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ควรจะได้

รับการรักษาพยาบาลใน  
โรงพยาบาลเฉพาะโรค                            239 61.0 112 28.6 9 2.3 28 7.1 4 1.0

10. คนเป็นโรคเอดส์ไม่จำเป็น

ต้องไปตรวจรักษา เพราะ  
ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้                20 5.1 15 3.8 21 5.4 154 39.3 182 46.4

ตารางที่ 14 (ต่อ)

ผู้บริหาร (N=392)

ลำดับที่	พัฒนาการเด็ก	เห็นด้วยอย่างยิ่ง						ไม่เห็นด้วย						ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง					
		N	ร้อยละ	N	ร้อยละ	N	ร้อยละ	N	ร้อยละ	N	ร้อยละ	N	ร้อยละ	N	ร้อยละ				
10.	คนเป็นโรคเอดส์ไม่จำเป็น																		
	ต้องไปตรวจรักษา เพราะ																		
	ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้	9	2.3	16	4.1	37	9.4	165	42.1	165	42.1								
11.	ผู้ติดยาเสพติดชนิดมีโอกาส																		
	ติดโรคเอดส์ได้	264	67.3	113	28.8	15	3.8	0	0	0	0								
12.	การตรวจหาเชื้อโรคเอดส์																		
	ในประเทศไทย มีความกันล้มย																		
	ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้	61	15.6	172	43.9	146	37.2	13	3.3	0	0								
13.	ในอนาคตอาจมียาที่สามารถ																		
	รักษาโรคเอดส์ได้	59	15.1	224	57.1	106	27.0	0	0	3	0.8								

ตารางที่ 15 (ต่อ)

ครุฑานามัยโรงเรียน (N=392)

ลำดับที่ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
 N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ

15.	ท่านจะติดเชื้อเอดส์ถ้าท่าน										
	ว่ายน้ำอยู่ในสระเดียวกัน										
	ผู้ป่วยโรคเอดส์	72	18.4	131	33.4	151	38.5	31	7.9	7	1.8
16.	ควรใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมี										
	เพศสัมพันธ์กับหญิงโลเกตเท่านั้น	63	16.1	110	28.1	62	15.8	119	30.4	38	9.7
17.	โรคเอดส์มากเป็นกับผู้ที่มีพฤติกรรม										
	รักร่วมเพศเท่านั้น	79	20.2	180	45.9	76	19.4	37	9.4	20	5.1
18.	ท่านไม่กล้าที่จะไปบริจาคโลหิต										
	เพราะกลัวติดเชื้อโรคเอดส์	34	8.7	88	22.4	81	20.7	128	32.7	61	15.6
19.	ผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลย										
	จะไม่เป็นโรคเอดส์	26	6.6	19	4.8	124	31.6	153	39.0	70	17.9

ตารางที่ 15 (ต่อ)

ครุอนามัยโรงเรียน (N=392)

ลำดับที่ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
 N ร้อยละ N' ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ

20.	ไม่ควรให้นักเรียนที่เป็น											
	โรคเอดส์เรียนร่วมกับคนปกติ	12	3.1	39	9.9	32	8.2	184	46.9	125	31.9	
21.	โรคเอดส์นั้นเป็นโรคที่สามารถ											
	ป้องกันได้	195	49.7	131	33.4	35	8.9	1	3.8	16	4.1	
22.	ควรให้มีการบังคับบุคคลทุกอาชีพ											
	ให้ตรวจเลือดเพื่อหา											
	เชื้อโรคเอดส์	128	32.7	172	43.9	27	6.9	58	14.8	7	1.8	
23.	ควรออกกฎหมายบังคับห้ามและ											
	ชายได้ตรวจเชื้อเอดส์ก่อน											
	แต่งงาน	176	44.9	176	44.9	12	3.1	25	6.4	3	.8	
24.	เมื่อทราบว่าในชุมชนมีผู้ติด											
	เชื้อเอดส์ครูควรให้นักเรียน											
	ทุกคนได้ตรวจเลือด	102	26.0	174	44.4	38	9.7	72	18.4	6	1.5	

ตารางที่ 15 (ต่อ)

ครูอนามัยโรงเรียน (N=392)

ลำดับที่ กัณฑติเกี่ยวกับโรคเอดส์

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ

25. โรงเรียนควรให้นักเรียนเป็นผู้นำ

ความรู้และเอกสารเกี่ยวกับโรค  
เอดส์ไปเผยแพร่แก่ผู้ปกครอง

219 55.9 166 42.3 5 1.3 0 0 2 0.5

26. ควรจัดให้มีการเรียนการสอน  
เรื่องโรคเอดส์ในระดับ

ประถมศึกษา

161 41.1 209 53.3 9 2.3 9 2.3 4 1.0

27. นักเรียนที่มีเชื้อเอดส์สามารถแพร่  
กระจายสู่เพื่อนนักเรียนร่วมชั้นได้

33 8.4 109 27.8 146 37.2 74 18.9 30 7.7

จากตารางที่ 15 แสดงให้เห็นว่า ครูอนามัยโรงเรียนส่วนใหญ่มีกัณฑติเกี่ยวกับโรคเอดส์ในเรื่องโรคเอดส์เป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดในปัจจุบัน มีร้อยละ 88.5 รองลงมาคือ ผู้ที่ติดยาเสพติดชนิดดีมีโอกาสติดโรคเอดส์ได้คิดเป็นร้อยละ 75.3 และโรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคม คิดเป็นร้อยละ 73.7

ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของ  
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา

ผู้บริหาร (N=392)

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ระดับ		
		$\bar{X}$	SD	ทัศนคติ
ก่านมีความเชื่อและความรู้สึกเกี่ยวกับโรคเอดส์ อย่างไรบ้าง				
(+)	1. โรคเอดส์เป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดในปัจจุบัน	4.77	0.56	ดีมาก
(+)	2. โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่ก่อให้เกิดภัยหาลังคม	4.70	0.62	ดีมาก
(-)	3. เราไม่ควรใกล้ชิดกับคนเป็นโรคเอดส์	3.33	1.12	ปานกลาง
(-)	4. ผู้ป่วยโรคเอดส์สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากพบในระยะแรก	3.14	1.08	ปานกลาง
(-)	5. เราอาจได้รับเชื้อเอดส์ลักษณะนี้	3.23	1.06	ปานกลาง
(-)	6. ทุกคนควรจะอยู่เป็นโสดเพื่อป้องกันโรคเอดส์	4.39	0.85	ดี
(+)	7. การใช้ถุงยางอนามัยไม่สามารถป้องกัน โรคเอดส์ได้ 100 %	3.57	1.03	ดี
(-)	8. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ คือ การไม่มีเพศสัมพันธ์กับใครเลย	3.89	1.06	ดี
(+)	9. ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ควรจะได้รับ การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเฉพาะโรค	4.16	1.15	ดี
(-)	10. คนเป็นโรคเอดส์ไม่จำเป็นต้องไปตรวจรักษา เพราะไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้	4.17	0.92	ดี
(+)	11. ผู้ติดยาเสพติดชนิดนี้มีโอกาสติดโรคเอดส์ได้	4.63	0.55	ดีมาก
(+)	12. การตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ในประเทศไทย มีความทันสมัยได้มาตรฐานและเชื่อถือได้	3.71	0.76	ดี

## ตารางที่ 16(ต่อ)

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ผู้บริหาร (N=392)		ระดับ ทัศนคติ
		$\bar{X}$	SD	
(+)	13. ในอนาคตอาจมียาที่สามารถรักษาโรคเอดส์ได้	3.85	0.68	ดี
(+)	14. ทำเล็บหรือโภนหนวดที่ร้านเสริมสวยมีโอกาส เลี้ยงต่อการเกิดโรคเอดส์	3.73	0.75	ดี
(-)	15. ท่านจะติดเชื้อเอดส์ เมื่อท่านว่ายน้ำอยู่ใน สระเดียวกับผู้ป่วยโรคเอดส์	3.68	0.89	ดี
(-)	16. ควรใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ กับหญิงโลเกตเท่านั้น	2.97	1.29	ปานกลาง
(-)	17. โรคเอดส์มักเป็นกับผู้ที่มีพฤติกรรม รักร่วมเพศเท่านั้น	3.66	0.98	ดี
(-)	18. ท่านไม่กล้าที่จะไปบริจาคโลหิต เพราะกลัวติดเชื้อโรคเอดส์	3.48	1.04	ปานกลาง
(-)	19. ผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยจะ ไม่เป็นโรคเอดส์	3.44	1.05	ปานกลาง
(-)	20. ไม่ควรให้นักเรียนที่เป็นโรคเอดส์ เรียนร่วมกับคนปกติ	3.74	1.16	ดี
(+)	21. โรคเอดส์นั้นเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้	4.18	0.93	ดี
(+)	22. ควรให้มีการบังคับบุคลากรอาชีพให้ตรวจ เลือดเพื่อหาเชื้อโรคเอดส์	3.71	1.16	ดี
(+)	23. ควรออกกฎหมายบังคับหญิงและชายได้ตรวจ เชื้อเอดส์ก่อนแต่งงาน	4.13	1.00	ดี

## ตารางที่ 16 (ต่อ)

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ผู้ริหาร (N=392)		ระดับ
		$\bar{X}$	SD	
				ทัศนคติ
(+)	24. เมื่อทราบว่าในชุมชนมีผู้ติดเชื้อเอดส์ ครูควรให้นักเรียนทุกคนได้ตรวจเลือด	3.50	1.17	ดี
(+)	25. โรงเรียนควรให้นักเรียนเป็นผู้นำความรู้ และเอกสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ ไปเผยแพร่แก่ผู้ปกครอง	4.47	0.62	ดี
(+)	26. ควรจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่อง โรคเอดส์ในระดับประถมศึกษา	4.36	0.64	ดี
(+)	27. นักเรียนที่มีเชื้อเอดส์สามารถแพร่กระจาย สู่เพื่อนนักเรียนร่วมชั้นได้	3.02	1.06	ปานกลาง
รวม		3.83	0.29	ดี

- (+) หมายถึง ทัศนคติกางบวก  
(-) หมายถึง ทัศนคติกางลบ

จากตารางที่ 16 แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์โดยส่วน  
รวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับทัศนคติ เท่ากับ 3.83 (จากค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่  
ระหว่าง 4.50 - 5.00 ค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ระหว่าง 1.00 - 1.49)

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับต่ำมาก จำนวน 3 ข้อ คือ ข้อ 1, 2 และ 11 อยู่ในระดับดี จำนวน 17 ข้อ ได้แก่ ข้อ 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 และข้อ 26 อยู่ในระดับปานกลางจำนวน 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3, 4, 5, 16, 18, 19 และ 27 และไม่มีข้อใดที่ผู้บริหารมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ อยู่ในระดับพอใช้และต้องแก้ไข

ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์  
ของครูอนามัยโรงเรียนประถมศึกษา

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ครูอนามัย (N=392)		ระดับ ทัศนคติ
		X	SD	
ก้าวมีความเชื่อและความรู้สึกเกี่ยวกับโรคเอดส์ อย่างไรบ้าง				
(+)	1. โรคเอดส์เป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดในปัจจุบัน	4.85	0.43	ดีมาก
(+)	2. โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่ก่อให้เกิดปัญหาลั่นคอม	4.69	0.56	ดีมาก
(-)	3. เราไม่ควรใกล้ชิดกับคนเป็นโรคเอดส์	3.13	1.11	ปานกลาง
(-)	4. ผู้ป่วยโรคเอดส์สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากพบในระยะแรก	3.32	1.19	ปานกลาง
(-)	5. เราอาจได้รับเชื้อเอดส์ลักษณะนี้	3.08	1.09	ปานกลาง
(-)	6. ทุกคนควรจะอยู่เป็นสิ่งเพื่อป้องกันโรคเอดส์	4.21	0.94	ดี
(+)	7. การใช้ถุงยางอนามัยไม่สามารถป้องกัน โรคเอดส์ได้ 100 %	3.66	1.03	ดี
(-)	8. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ คือ การไม่มีเพศสัมพันธ์กับใครเลย	3.57	1.22	ดี
(+)	9. ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ควรจะได้รับการรักษา พยาบาลในโรงพยาบาลเฉพาะโรค	4.41	0.91	ดี
(-)	10. คนเป็นโรคเอดส์ไม่จำเป็นต้องไปตรวจรักษา เพราะไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้	4.18	1.04	ดี
(+)	11. ผู้ติดยาเสพติดชนิดนี้มีโอกาสติดโรคเอดส์ได้	4.70	0.57	ดีมาก
(+)	12. การตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ในประเทศไทย มีความทันสมัยได้มาตรฐานและเชื่อถือได้	3.63	0.76	ดี

## ตารางที่ 17 (ต่อ)

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ครุฑานมัย (N=392)		ระดับ ทัศนคติ
		$\bar{X}$	SD	
(+)	13. ในอนาคตอาจมียาที่สามารถรักษาโรคเอดส์ได้	3.86	0.69	ดี
(+)	14. ทำเล็บหรือโภนหนวดที่ร้านเสริมสวยมีโอกาส เสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์	4.03	0.75	ดี
(-)	15. ท่านจะติดเชื้อเอดส์ เมื่อท่านว่ายน้ำอยู่ใน สระเดียวกับผู้ป่วยโรคเอดส์	3.58	0.93	ดี
(-)	16. ควรใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ กับหญิงโลเกเนท่านนั้น	2.89	1.26	ปานกลาง
(-)	17. โรคเอดส์มักเป็นกับผู้ที่มีพฤติกรรม รักร่วมเพศท่านนั้น	3.66	1.06	ดี
(-)	18. ท่านไม่กล้าที่จะไปบริจาคโลหิต เพราะ กลัวติดเชื้อโรคเอดส์	3.23	1.21	ปานกลาง
(-)	19. ผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยจะไม่เป็นโรคเอดส์	3.56	1.04	ดี
(-)	20. ไม่ควรให้นักเรียนที่เป็นโรคเอดส์เรียน ร่วมกับคนปกติ	3.94	1.03	ดี
(+)	21. โรคเอดส์นั้นเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้	4.20	1.03	ดี
(+)	22. ควรให้มีการบังคับบุคคลทุกอาชีพให้ตรวจเลือด เพื่อหาเชื้อโรคเอดส์	3.90	1.06	ดี
(+)	23. ควรออกกฎหมายบังคับหญิงและชายได้ตรวจ เชื้อเอดส์ก่อนแต่งงาน	4.26	0.85	ดี
(+)	24. เมื่อทราบว่าในชุมชนมีผู้ติดเชื้อเอดส์ ครุฑาร ให้นักเรียนทุกคนได้ตรวจเลือด	3.75	1.08	ดี

## ตารางที่ 17 (ต่อ)

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ครุอนามัย(N=392)		ระดับ
		$\bar{X}$	SD	
(+) 25.	โรงเรียนควรให้นักเรียนเป็นผู้นำความรู้ และเอกสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ไปเผยแพร่แก่ผู้ปกครอง	4.53	0.58	ตีมาก
(+) 26.	ควรจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องโรคเอดส์ในระดับประถมศึกษา	4.31	0.72	ตี
(+) 27.	นักเรียนที่มีเชื้อเอดส์สามารถแพร่กระจายสู่เพื่อนนักเรียนร่วมชั้นได้	3.10	1.05	ปานกลาง
รวม		3.86	0.30	ตี

(+) หมายถึง ทัศนคติกางบวก

(-) หมายถึง ทัศนคติกางลบ

จากตารางที่ 17 แสดงให้เห็นว่า ครุอนามัยโรงเรียนมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์โดยส่วนรวมอยู่ในระดับตี โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับทัศนคติ เท่ากับ 3.86 (จากค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ระหว่าง 4.50 - 5.00 ค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ระหว่าง 1.00 - 1.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครุอนามัยโรงเรียนมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับตีมาก จำนวน 4 ข้อ คือ ข้อ 1, 2, 11 และ 25 อยู่ในระดับตี จำนวน 17 ข้อ ได้แก่ ข้อ 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 และ ข้อ 26 อยู่ในระดับปานกลางจำนวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3, 4, 5, 16, 18 และ ข้อ 27 และไม่มีข้อใดที่ครุอนามัยโรงเรียนมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับพอใช้และต้องแก้ไข

ตารางที่ 18 เปรียบเทียบกัณฑิเกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้บริหาร และครุอนามัยโรงเรียน

ลำดับ ที่	กัณฑิเกี่ยวกับโรคเอดส์	ผู้บริหาร (N=392)		ครุอนามัย (N=392)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
ก้านมีความเชื่อและความรู้สึกเกี่ยวกับ โรคเอดส์อย่างไรบ้าง						
(+)	1. โรคเอดส์เป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดในปัจจุบัน	4.77	0.56	4.85	0.43	-2.22*
(+)	2. โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่ก่อให้เกิด					
	ปัญหาลังคม	4.70	0.62	4.69	0.56	0.10
(-)	3. เราไม่ควรใกล้ชิดกับคนเป็นโรคเอดส์	3.33	1.12	3.13	1.11	2.48*
(-)	4. ผู้ป่วยโรคเอดส์สามารถรักษาให้หายขาด					
	ได้หากพบในระยะแรก	3.14	1.08	3.32	1.19	-2.25*
(-)	5. เราอาจได้รับเชื้อเอดส์ลักษณะนี้	3.23	1.06	3.08	1.09	1.85
(-)	6. ทุกคนควรจะอยู่เป็นโสดเพื่อป้องกัน					
	โรคเอดส์	4.39	0.85	4.21	0.94	2.73*
(+)	7. การใช้ถุงยางอนามัยไม่สามารถป้องกัน					
	โรคเอดส์ได้ 100 %	3.57	1.03	3.66	1.03	-1.10
(-)	8. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์					
	คือการไม่มีเพศสัมพันธ์กับใครเลย	3.89	1.06	3.57	1.22	3.80*
(+)	9. ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ควรจะได้รับการ					
	รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเฉพาะโรค	4.16	1.15	4.41	0.91	3.30*
(-)	10. คนเป็นโรคเอดส์ไม่จำเป็นต้องไปตรวจ					
	รักษา เพราะไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้	4.17	0.92	4.18	1.04	-0.07

## ตารางที่ 18 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ผู้บริหาร (N=392)		ครุ腕มัย (N=392)		<i>t</i>
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
(+)	11. ผู้ติดยาเสพติดชนิดนี้มีโอกาสติด โรคเอดส์ได้	4.63	0.55	4.70	0.57	-1.64
(+)	12. การตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ใน ประเทศไทย มีความทันสมัยได้ มาตรฐานและเชื่อถือได้	3.71	0.76	3.60	0.76	1.45
(+)	13. อาจมียากรักษาโรคเอดส์ในอนาคต	3.85	0.68	3.86	0.69	-0.26
(+)	14. ทำเล็บหรือโกนหนวดที่ร้านเสริมสวย มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์	3.73	0.75	4.03	0.57	-5.63*
(-)	15. ท่านจะติดเชื้อเอดส์ เมื่อท่านว่ายน้ำ อยู่ในสระเดียวกับผู้ป่วยโรคเอดส์	3.68	0.89	3.58	0.93	1.52
(-)	16. ควรใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ กับหญิงโลเกเนทีน	2.97	1.29	2.89	1.26	0.84
(-)	17. โรคเอดส์มักเป็นกับผู้ที่มีพฤติกรรม รกรรวงเพศเท่านั้น	3.66	0.98	3.66	1.06	0.00
(-)	18. ท่านไม่กล้าที่จะไปบริจาคโลหิต เพราะกลัวติดเชื้อโรคเอดส์	3.48	1.04	3.23	1.21	3.07*
(-)	19. ผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยจะไม่เป็น โรคเอดส์	3.44	1.05	3.56	1.04	-1.66

## ตารางที่ 18 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอเดล์	ผู้บริหาร (N=392)		ครุนามัย (N=392)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
(-) 20.	ไม่ควรให้นักเรียนที่เป็นโรคเอเดล์					
	เรียนร่วมกับคนปกติ	3.74	1.16	3.94	1.03	-2.53*
(+) 21.	โรคเอเดล์นั้นเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้	4.18	0.93	4.20	1.03	-0.36
(+) 22.	ควรให้มีการบังคับบุคลาชีฟให้					
	ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อโรคเอเดล์	3.71	1.16	3.90	1.06	-2.43*
(+) 23.	ควรออกกฎหมายบังคับห้ามและช่วย					
	ได้ตรวจเชื้อเอเดล์ก่อนแต่งงาน	4.13	1.00	4.26	0.85	-2.07*
(+) 24.	เมื่อทราบว่าในชุมชนมีผู้ติดเชื้อเอเดล์					
	ครุควรให้นักเรียนทุกคนได้ตรวจเลือด	3.50	1.17	3.75	1.08	-3.07*
(+) 25.	โรงเรียนควรให้นักเรียนเป็นผู้นำความรู้					
	และเอกสารเกี่ยวกับโรคเอเดล์ไปเผยแพร่					
	พร่ำแก่ผู้ปกครอง	4.47	0.62	4.53	0.58	-1.30
(+) 26.	ควรจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่อง					
	โรคเอเดล์ในระดับประถมศึกษา	4.36	0.64	4.31	0.72	1.05

## ตารางที่ 18 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หัวข้อ	ผู้บริหาร (N=392)		ครุอนามัย (N=392)		$t$
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
(+)	27. นักเรียนที่มีเชื้อเอดส์สามารถแพร่กระจายสู่เพื่อนนักเรียนร่วมชั้นได้	3.02	1.06	3.10	1.05	-1.08
	รวม	3.83	0.29	3.86	0.30	-1.15

\* $p < .05$  (.05  $t \approx \pm 1.96$ )

(+) หมายถึง หัวข้อที่ทางบวก

(-) หมายถึง หัวข้อที่ทางลบ

จากตารางที่ 18 เมื่อเปรียบเทียบหัวข้อที่เกี่ยวกับโรคเอดส์ ระหว่างผู้บริหาร และ ครุอนามัยโรงเรียน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหาร และ ครุอนามัยโรงเรียนมีหัวข้อที่เกี่ยวกับโรคเอดส์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 12 ข้อ โดยผู้บริหารมีหัวข้อติดกว่า ครุอนามัย ได้แก่ ข้อ

- 3. เราไม่ควรใกล้ชิดกับคนเป็นโรคเอดส์
- 6. ทุกคนควรอยู่เป็นloid เพื่อป้องกันโรคเอดส์
- 8. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์คือการไม่มีเพศสัมพันธ์ กับใครเลย
- 18. ท่านไม่กล้าไปบริจาคโลหิต เพราะกลัวติดเชื้อเอดส์

และในรายข้อที่ครุอ่านมั้ยโรงเรียนมีทักษะติดกันว่าผู้บริหาร ได้แก่ ข้อ

1. โรคเอดส์เป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดในปัจจุบัน
4. ผู้ป่วยโรคเอดส์สามารถรักษาให้หายขาดได้หากพบในระยะแรก
9. ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ควรจะได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเฉพาะโรค
14. ทำเล็บหรือโกนหนวดที่ร้านเสริมสวย มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์
20. ไม่ควรให้นักเรียนที่เป็นโรคเอดส์เรียนร่วมกับคนปกติ
22. ควรบังคับให้บุคคลทุกอาชีพให้ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อโรคเอดส์
23. ควรออกกฎหมายบังคับห้ามสูบและชาย ได้ตรวจเชื้อเอดส์ก่อนแต่งงาน
24. เมื่อทราบว่าในชุมชนมีผู้ติดเชื้อเอดส์ ครุครูให้นักเรียนทุกคนได้ตรวจเลือด



ตารางที่ 19 เปรียบเทียบหัตถศึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้บริหาร และครุอนามัยโรงเรียน  
ในด้านหัตถศึกษาทางบวก

ลำดับที่	หัตถศึกษาทางบวกเกี่ยวกับโรคเอดส์	ผู้บริหาร		ครุอนามัย		$t$
		(N=392)	(N=392)	$\bar{X}$	SD	
1.	โรคเอดส์เป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดในปัจจุบัน	4.77	0.56	4.85	0.43	-2.22*
2.	โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่ก่อให้เกิด ปัญหาลังคอม	4.70	0.62	4.62	0.56	0.10
3.	การใช้ถุงยางอนามัยไม่สามารถป้องกัน โรคเอดส์ได้ 100 %	3.57	1.03	3.66	1.03	-1.10
4.	ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ควรจะได้รับการ รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเฉพาะโรค	4.16	1.15	4.41	0.91	3.30*
5.	ผู้ติดยาเสพติดชนิดนิดมีโอกาสติดเชื้อ โรคเอดส์ได้	4.63	0.55	4.70	0.57	-1.64
6.	การตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ในประเทศไทย มีความทันสมัยได้มาตรฐานและเชื่อถือได้	3.71	0.76	3.63	0.76	1.45
7.	ในอนาคตอาจมียาที่สามารถรักษา โรคเอดส์ได้	3.85	0.68	3.68	0.69	-0.26
8.	ทำเล็บหรือโภนหนวดที่ร้านเสริมสวย มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์	3.73	0.75	4.03	0.75	-5.13*
9.	โรคเอดส์นั้นเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้	4.18	0.93	4.20	1.03	-0.31
10.	ควรให้มีการบังคับบุคคลทุกอาชีพให้ ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อโรคเอดส์	3.71	1.16	3.90	1.06	-2.43*

## ตารางที่ 19(ต่อ)

ลำดับที่	ทัศนคติกังวลเกี่ยวกับโรคเอดส์	ผู้บริหาร		ครอนามัย		t
		X	SD	X	SD	
11.	ควรออกกฎหมายบังคับห้ามและขยาย ได้ตรวจสอบเชื้อเอดส์ก่อนแต่งงาน	4.13	1.00	4.26	0.85	-2.07*
12.	เมื่อทราบว่าในชุมชนมีผู้ติดเชื้อเอดส์ ครูควรให้นักเรียนทุกคนได้ตรวจเลือด	3.50	1.17	3.75	1.08	-3.07*
13.	โรงเรียนควรให้นักเรียนเป็นผู้นำความรู้ และเอกสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ไปเผยแพร่ แพร่แก่ผู้ปกครอง	4.47	0.62	4.53	0.58	-1.30
14.	ควรจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่อง โรคเอดส์ในระดับประถมศึกษา	4.36	0.64	4.31	0.72	1.05
15.	นักเรียนที่มีเชื้อเอดส์สามารถแพร่ กระจายสู่เพื่อนนักเรียนร่วมชั้นได้	3.02	1.06	3.10	1.05	-1.08
รวม		4.03	0.32	4.12	0.30	-4.27*

\*p< .05 (.05t  $\approx \pm 1.96$ )

จากตารางที่ 19 เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับโรคเอดส์โดยล้วนรวม  
ระหว่างผู้บริหารและครุอนามัยโรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  
ระดับ .05 โดยครุอนามัยโรงเรียนมีทัศนคติทางบวกดีกว่าผู้บริหาร และเมื่อเปรียบเทียบ  
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารและครุอนามัยโรงเรียน มีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับโรคเอดส์  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 4, 8, 10, 11

และ 12

ตารางที่ 20 เปรียบเทียบหัตถศึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้บริหาร และครุอามัยโรงเรียน  
ในด้านหัตถศึกษาของลับ

ลำดับที่	หัตถศึกษาของลับเกี่ยวกับโรคเอดส์	ผู้บริหาร (N=392)		ครุอามัย (N=392)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
1.	เรามีความใกล้ชิดกับคนเป็นโรคเอดส์	3.33	1.12	3.13	1.11	2.48*
2.	ผู้ป่วยโรคเอดส์สามารถรักษาให้หายขาด ได้หากพบในระยะแรก	3.14	1.08	3.32	1.19	2.25*
3.	เราอาจได้รับเชื้อเอดส์ลักษณะนี้	3.23	1.06	3.08	1.09	1.85
4.	ทุกคนควรจะอยู่เป็นสุขเพื่อป้องกัน โรคเอดส์	4.39	0.85	4.21	0.99	2.73*
5.	การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ คือการไม่มีเพศสัมพันธ์กับใครเลย	3.89	1.06	3.57	1.22	3.80*
6.	คนเป็นโรคเอดส์ไม่จำเป็นต้องไปตรวจ รักษา เพราะไม่มีทางรักษาให้หายขาด	4.17	0.92	4.18	1.04	-0.07
7.	ท่านจะติดเชื้อเอดส์ เมื่อท่านว่ายน้ำ อยู่ในสระเดียวกับผู้ป่วยโรคเอดส์	3.68	0.89	3.58	0.09	1.52
8.	ควรใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ กับหญิงโลเกเนท่านนั้น	2.97	1.29	2.89	1.26	0.84
9.	โรคเอดส์มักเป็นกับผู้ที่มีพฤติกรรม รักร่วมเพศเท่านั้น	3.66	0.98	3.66	1.06	0.00
10.	ท่านไม่กล้าที่จะไปบริจาคโลหิต เพราะกลัวติดเชื้อโรคเอดส์	3.48	1.04	3.23	1.21	3.07*

## ตารางที่ 20 (ต่อ)

ลำดับที่	ทัศนคติทางลบเกี่ยวกับโรคเอดส์	ผู้บริหาร		ครูอนามัย		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
11.	ผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยจะไม่เป็น โรคเอดส์	3.44	1.05	3.56	1.04	-1.66
12.	ไม่ควรให้นักเรียนที่เป็นโรคเอดส์ เรียนร่วมกับคนปกติ	3.74	1.16	3.94	1.03	-2.53*
รวม		3.59	0.50	3.53	0.53	1.73

\* $p < .05$  (.05t  $\approx \pm 1.96$ )

จากตารางที่ 20 เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติทางลบเกี่ยวกับโรคเอดส์โดยล้วนรวม  
ระหว่างผู้บริหารและ ครูอนามัยโรงเรียน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  
ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารและครูอนามัยโรงเรียนมี  
ทัศนคติทางลบเกี่ยวกับโรคเอดส์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน  
6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 2, 4, 5, 10 และ ข้อ 12

**ตอนที่ 4 การปฎิบัติ และการเปรียบเทียบการปฎิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ของผู้บริหาร และครุ\_na\_m\_y โรงเรียนประถมศึกษา**

ผู้วิจัยได้ตรวจให้คะแนนการปฎิบัติ เกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้บริหาร และครุ\_na\_m\_y โรงเรียน นำมาหาค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) ค่าล่วงเบี้ยงเบนมาตรฐาน ( $SD$ ) และเปรียบเทียบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนน โดยการทดสอบค่า "ที" ( $T$ -Test) โดยล้วนรวม และเป็นรายข้อ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 21 ถึง ตารางที่ 30

**ตารางที่ 21 จำนวน และค่าร้อยละของระดับคะแนนการปฎิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ของผู้บริหาร และครุ\_na\_m\_y โรงเรียนประถมศึกษา**

เกณฑ์ระดับการปฎิบัติ	ค่าเฉลี่ย	ผู้บริหาร		ครุ_na_m_y	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
การปฎิบัติดีมาก	3.50 - 4.00(4)	33	8.40	29	7.40
การปฎิบัติดี	2.50 - 3.49(3)	356	90.80	361	92.10
การปฎิบัติพอใช้	1.50 - 2.49(2)	3	0.80	2	0.50
การปฎิบัติไม่ดี	1.00 - 1.49(1)	0	0	0	0
รวม		392	100	392	100

จากตารางที่ 21 แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.80 มีการปฎิบัติ เกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับดี รองลงมาร้อยละ 8.40 มีการปฎิบัติอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาการปฎิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของครุ\_na\_m\_y โรงเรียน พบว่า ครุ\_na\_m\_y โรงเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 92.10 มีการปฎิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับดี รองลงมา อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 7.40

ตารางที่ 22 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการปฎิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ เป็นรายข้อ

ผู้บริหาร (N=392)

ลำดับที่	การปฎิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ไม่เคยทำเลย		ทำนานครึ่ง		ทำบ่อยครึ่ง		ทำเป็นประจำ	
		N	ร้อยละ	N	ร้อยละ	N	ร้อยละ	N	ร้อยละ
1.	ท่านรับโลหิตเข้าสู่ร่างกาย	370	94.4	17	4.3	4	1.0	1	0.3
2.	ท่านใช้แปรงฟันร่วมกับผู้อื่น	347	88.7	37	9.5	5	1.3	2	0.5
3.	ท่านใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น	348	88.8	39	9.9	4	1.0	1	0.3
4.	ท่านใช้มีดโกนร่วมกับผู้อื่น	251	64.0	120	30.6	16	4.1	5	1.3
5.	ท่านหรือ (คู่สมรส, คู่อน) ของท่านเที่ยวโซเวตโดย ไม่ใช้ถุงยางอนามัย	291	74.4	74	18.9	14	3.6	12	3.1
6.	ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ท่าน หรือครอบครัวของท่านเจาหยู ที่ร้านเสริมสวย	350	89.3	37	9.4	2	0.5	3	0.8

ตารางที่ 22 (ต่อ)

ผู้บริหาร (N=392)

ลำดับที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ไม่เคยทำเลย		ทำนานครึ่ง		ทำน้อยครึ่ง		ทำเป็นประจำ	
		N	ร้อยละ	N	ร้อยละ	N	ร้อยละ	N	ร้อยละ
7.	ท่านใช้ที่ตัดเล็บร่วมกับผู้อื่น	117	29.8	138	35.2	88	22.4	49	12.5
8.	อ่านหน้าหรือติดตามน่าวา เกี่ยวกับโรคเอดส์	5	1.2	50	12.8	207	52.8	130	33.2
9.	ท่านถือยาเสพติด	383	97.7	3	0.8	4	1.0	2	0.5
10.	ท่านมีเพศสัมพันธ์กับผู้ ติดยาเสพติดชนิดเดียวกัน	382	97.4	4	1.0	3	0.8	3	0.8
11.	ท่านมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน	376	95.9	10	2.6	3	0.8	3	0.8
12.	ท่านมีเพศสัมพันธ์กับบุคคล มากกว่า 1 คนขึ้นไป	202	51.1	171	43.6	14	3.6	5	1.3
13.	ท่านใช้วิธีการฝังเข็มใน การรักษาโรค	375	95.7	9	2.3	5	1.3	3	0.8

ตารางที่ 22 (ต่อ)

ผู้บริหาร(N=392)

ลำดับที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ไม่เคยทำเลย		ทำนานครึ่ง		ทำบ่อยครั้ง		ทำเป็นประจำ	
		N	ร้อยละ	N	ร้อยละ	N	ร้อยละ	N	ร้อยละ
14.	ท่านได้รับฟังข่าวสารเกี่ยวกับ โรคเอดส์จากวิทยุและโทรทัศน์	4	1.0	18	4.6	186	47.4	184	46.9
15.	ท่านให้ความรู้แก่นักเรียน เกี่ยวกับโรคเอดส์	61	15.6	162	41.3	147	37.5	22	5.6
16.	ท่านให้คำปรึกษาแก่นักเรียน เพื่อไม่ให้ติดยาเสพติดชนิดฉีด	66	16.8	117	29.3	145	37.0	65	16.6
17.	ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ ติดยาเสพติดชนิดฉีด	341	87.0	22	5.6	21	5.4	8	2.0
18.	ให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับ เรื่องเพศศึกษา	100	25.5	172	43.9	73	18.6	47	12.0
19.	ท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์แก่ชุมชน	62	15.8	193	49.2	102	26.0	33	8.9

ตารางที่ 22 (ต่อ)

ผู้บริหาร(N=392)

ลำดับที่	การปฎิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ไม่เคยทำเลย	ทำนานครึ่ง	ทำครึ่งปี	ทำเป็นประจำ				
		N	ร้อยละ	N	ร้อยละ	N	ร้อยละ	N	ร้อยละ

20.	ร่วมมือกับสถานีอนามัยดำเนิน หรือหน่วยในการจัดนิทรรศการ การให้ความรู้แก่ชุมชน หน่วยบ้าน	94	24.0	203	51.8	67	17.1	28	7.1
21.	ท่านเข้าร่วมรณรงค์ต่อต้าน โรคเอดส์	137	35.0	167	42.7	69	17.6	18	4.6
22.	ท่านประสานงานติดต่อ รับข้อมูลน่าวาระเกี่ยวกับ โรคเอดส์จากเจ้าหน้าที่ กรายตรวจลักษณะสุข เพื่อเผยแพร่	34	8.7	106	27.0	183	46.7	69	17.6

ตารางที่ 22 (ต่อ)

ผู้บริหาร (N=392)

ลำดับที่ การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์

	ไม่เคยทำเลย	ทำนานครึ่ง	ทำน้อยครึ่ง	ทำเป็นประจำ	
N	ร้อยละ	N	ร้อยละ	N	ร้อยละ

23. ท่านกราดตัวให้นักเรียน

สนใจฟังน่าவและกการ

เคลื่อนไหวเกี่ยวกับโรคเอดส์

14	3.6	149	38.0	176	44.9	53	13.5
----	-----	-----	------	-----	------	----	------

24. จัดทำสื่อการสอนเกี่ยวกับ

โรคเอดส์เพื่อประกอบ

การเรียนการสอน

112	28.6	162	41.3	99	25.3	19	4.8
-----	------	-----	------	----	------	----	-----

จากตารางที่ 22 แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ในเรื่อง การไม่ฉีดยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 97.7 รองลงมา ร้อยละ 97.4 ไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด และร้อยละ 95.9 ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน

ตารางที่ 23 แสดงจำนวนและค่าร้อยละ ของครูอนามัยโรงเรียนด้านการปฎิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ เป็นรายข้อ

ครูอนามัยโรงเรียน(N=392)

ลักษณะ การปฎิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์

ไม่เคยทำเลย ทำนานครึ่ง ทำมือครึ่ง ทำเป็นประจำ

N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ

1. ท่านรับโลหิตเข้าสู่ร่างกาย	335	90.6	33	8.4	1	0.3	3	0.8
2. ท่านใช้แปรงสีฟันร่วมกับผู้อื่น	345	88.0	42	10.7	1	0.3	4	1.0
3. ท่านใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น	360	91.8	28	7.1	3	0.8	1	0.3
4. ท่านใช้มีดโกนร่วมกับผู้อื่น	340	86.7	47	12.0	4	1.0	1	0.3
5. ท่านหรือ คู่สมรส, คุณอน ของท่านเที่ยวโลเกนโดย ไม่ใช้ถุงยางอนามัย	311	79.9	65	16.7	5	1.3	8	2.1
6. ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ท่านหรือครอบครัวของท่าน <sup>เจา</sup> หูร้านเสริมสวย	345	88.0	42	10.7	2	0.5	3	0.8
7. ท่านใช้ที่ตัดเล็บร่วมกับผู้อื่น	104	26.5	167	42.6	78	19.9	43	11.0

ตารางที่ 23 (ต่อ)

ครุฑานามัยโรงเรียน (N=392)

ลำดับที่ การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์

ไม่เคยทำเลย ทำนานครึ่ง ทำน้อยครึ่ง ทำเป็นประจำ

N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ

8.	อ่านข่าวหรือติดตามข่าวเกี่ยวกับโรคเอดส์	1	0.3	43	11.0	217	55.4	131	33.4
9.	ท่านเดินทางไปเสพติด	385	98.2	0	0	1	0.3	6	0.8
10.	ท่านมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด	387	98.7	0	0	2	0.5	3	0.8
11.	ท่านมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน	380	96.9	7	1.8	2	0.5	3	0.8
12.	ท่านมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลมากกว่า 1 คนขึ้นไป	338	86.4	45	11.5	4	1.0	4	1.0
13.	ท่านใช้วิธีการฝังเข็มในการรักษาโรค	369	94.4	16	4.1	2	0.5	4	1.0
14.	ท่านได้รับฝังข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์จากวิทยุและโทรทัศน์	5	1.3	30	7.7	169	43.1	188	48.0
15.	ท่านให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับโรคเอดส์	16	4.1	160	40.8	168	42.9	48	12.2

ตารางที่ 23 (ต่อ)

ครุอนามัยโรงเรียน (N=392)

ลำดับที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ไม่เคยทำเลย		ทำงานครึ้ง		ทำบ่อยครั้ง		ทำเป็นประจำ	
		N	ร้อยละ	N	ร้อยละ	N	ร้อยละ	N	ร้อยละ
16.	ท่านให้คำปรึกษาแก่นักเรียน								
	เพื่อไม่ให้ติดยาเสพติดชนิดเด็ด	60	15.3	142	36.2	116	29.6	74	18.9
17.	ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่								
	ติดยาเสพติดชนิดเด็ด	348	88.7	19	4.8	15	3.8	10	2.6
18.	ให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับ								
	เรื่องเพศศึกษา	119	30.4	175	44.6	72	18.4	26	6.6
19.	ท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้								
	ความรู้เกี่ยวกับ โรคเอดส์แก่ชุมชน	109	27.9	184	47.1	70	17.9	28	7.2
20.	ร่วมมือกับสถานีอนามัยตำบล								
	หรือหมู่บ้านในการจัดนิทรรศการ								
	การให้ความรู้แก่ชุมชน หมู่บ้าน	131	33.4	174	44.4	61	15.6	26	6.6

ตารางที่ 23 (ต่อ)

ครูอนามัยโรงเรียน (N=392)

ลำดับที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ไม่เคยทำเลย		ทำงานครึ่ง		ทำบ่ายครึ่ง		ทำเป็นประจำ	
		N	ร้อยละ	N	ร้อยละ	N	ร้อยละ	N	ร้อยละ
21.	ท่านเข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์	200	51.2	138	35.3	34	8.7	19	4.9
22.	ท่านประسانงานติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโรคเอดส์จากเจ้าหน้าที่กระทรวง สาธารณสุขเพื่อเผยแพร่	217	85.0	186	47.4	87	22.2	34	8.7
23.	ท่านกราบตุนให้นักเรียนสนใจฟัง ข่าวและการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโรคเอดส์	15	3.8	145	37.0	165	42.1	67	17.1
24.	จัดทำสื่อการสอนเกี่ยวกับโรคเอดส์ เพื่อประกอบการเรียนการสอน	112	28.6	162	41.3	29	25.3	19	4.8

จากตารางที่ 23 แสดงให้เห็นว่า ครูอนามัยโรงเรียนส่วนใหญ่มีการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์โดยไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด คิดเป็นร้อยละ 98.7 รองลงมาคือไม่เคยคัดยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 98.2 และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 96.9

ตารางที่ 24 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การปฎิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์  
ของผู้บริหารโรงเรียน

ลำดับที่	การปฎิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ผู้บริหาร (N=392)		ระดับ การปฎิบัติ					
		$\bar{X}$	SD						
<b>ค้านการป้องกันตนเอง</b>									
ท่านได้ปฏิบัติสิ่งต่อไปนี้									
(-) 1.	ท่านรับโลหิตเข้าสู่ร่างกาย	3.92	0.32	ตีมาก					
(-) 2.	ท่านใช้แปรงสีฟันร่วมกับผู้อื่น	3.86	0.41	ตีมาก					
(-) 3.	ท่านใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น	3.87	0.38	ตีมาก					
(-) 4.	ท่านใช้มีดโกนร่วมกับผู้อื่น	3.57	0.63	ตีมาก					
(-) 5.	ท่านหรือ(คู่สมรส,คุณอน)ของท่าน <sup>เที่ยวโลเกต์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย</sup>	3.64	0.69	ตีมาก					
(-) 6.	ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาท่านหรือครอบครัว <sup>ของท่านเจ้าหนูที่ร้านเสริมสวย</sup>	3.87	0.41	ตีมาก					
(-) 7.	ท่านใช้ที่ตัดเล็บร่วมกับผู้อื่น	2.82	0.99	ตี					
(+)	อ่านข่าวหรือติดตามข่าวเกี่ยวกับโรคเอดส์	3.18	0.69	ตี					
(-)	ท่านฉีดยาเสพติด	3.95	0.30	ตีมาก					
(-)	ท่านมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด	3.95	0.32	ตีมาก					
(-)	ท่านมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน	3.93	0.34	ตีมาก					
(-)	ท่านมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลมากกว่า 1 คนขึ้นไป	3.45	0.63	ตี					
(-)	ท่านใช้วิธีการฝังเข็มในการรักษาโรค	3.92	0.37	ตีมาก					
(+)	ท่านได้รับฝังเข็มสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ จากวิทยุหรือโทรทัศน์	3.40	0.62	ตี					

## ตารางที่ 24 (ต่อ)

ลำดับที่	การปฎิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ผู้บริหาร (N=392)		ระดับ การปฎิบัติ		
		ค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}$ )	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)			
<b>ถ้านการป้องกันและให้ความช่วยเหลือ</b>						
<b>นักเรียนและชุมชน</b>						
(+) 15.	ท่านให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์	2.66	0.80	ดี		
(+) 16.	ท่านให้คำปรึกษากับนักเรียนเพื่อไม่ให้ติดยาเสพติดชนิดนิด	2.54	0.96	ดี		
(+) 17.	ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ติดยาเสพติดชนิดนิด	1.22	0.63	ไม่ดี		
(+) 18.	ให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา	2.17	0.94	พอใช้		
(+) 19.	ท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์แก่ชุมชน	2.28	0.83	พอใช้		
(+) 20.	ร่วมมือกับสถานีอนามัยดำเนินหรือหนุนนำในการจัดนิทรรศการการให้ความรู้แก่ชุมชน หมู่บ้าน	2.07	0.83	พอใช้		
(+) 21.	ท่านเข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์	1.91	0.84	พอใช้		
(+) 22.	ท่านประสานงานติดต่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์จากเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อเผยแพร่	2.26	0.85	พอใช้		
(+) 23.	ท่านกระตุ้นให้นักเรียนสนใจฟังข่าวและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโรคเอดส์	2.68	0.74	ดี		

## ตารางที่ 24 (ต่อ)

ลำดับที่	การปฎิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ผู้บริหาร (N=392)		ระดับ การปฎิบัติ
		$\bar{X}$	SD	
(+) 24.	จัดทำสื่อการสอนเกี่ยวกับโรคเอดส์เพื่อประกอบการเรียนการสอน	2.06	0.85	พอใช้
	รวม	3.05	0.29	ดี

(+) หมายถึง การปฏิบัติทางบวก

(-) หมายถึง การปฏิบัติทางลบ

จากตารางที่ 24 แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติในเกี่ยวกับโรคเอดส์โดยส่วนรวม อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารมีการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับดีมากจำนวน 10 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 และ 13 อยู่ในระดับดี 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ 7, 8, 12, 14, 15, 16 และข้อ 23 อยู่ในระดับพอใช้จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 18, 19, 20, 21, 22 และ 24 อยู่ในระดับไม่ดี 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 17

ตารางที่ 25 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การปฎิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์  
ของครูอนามัยโรงเรียน

ลำดับที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ครูอนามัย (N=392)		ระดับ การปฏิบัติ		
		$\bar{X}$	SD			
<b>ด้านการป้องกันตนเอง</b>						
ท่านได้ปฏิบัติสิ่งต่อไปนี้						
(-) 1.	ท่านรับโลหิตเข้าสู่ร่างกาย	3.88	0.38	ตีมาก		
(-) 2.	ท่านใช้แอลกอฮอล์ร่วมกับผู้อื่น	3.85	0.43	ตีมาก		
(-) 3.	ท่านใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น	3.90	0.34	ตีมาก		
(-) 4.	ท่านใช้มีดโกนร่วมกับผู้อื่น	3.85	0.40	ตีมาก		
(-) 5.	ท่านหรือ(คู่สมรส, คุณอน)ของท่าน <sup>เที่ยวโลเกต์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย</sup>	3.74	0.58	ตีมาก		
(-) 6.	ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาท่านหรือ					
<b>ครอบครัวของท่าน</b>						
เจ้าหน้าที่ร้านเสริมสวย						
(-) 7.	ท่านใช้ที่ตัดเล็บร่วมกับผู้อื่น	2.84	0.93	ตี		
(+)	อ่านข่าวหรือติดตามข่าวเกี่ยวกับ					
โรคเอดส์						
(-) 9.	ท่านฉีดยาเสพติด	3.94	0.38	ตีมาก		
(-) 10.	ท่านมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด	3.96	0.27	ตีมาก		
(-) 11.	ท่านมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน	3.94	0.32	ตีมาก		
(-) 12.	ท่านมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลมากกว่า 1 คนขึ้นไป	3.38	0.47	ตี		
(-) 13.	ท่านใช้วิธีการฝังเข็มในการรักษาโรค	3.91	0.38	ตีมาก		

## ตารางที่ 25(ต่อ)

ครุฑานามัย (N=392)

ลำดับที่	การปฎิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ระดับ		การปฎิบัติ
		$\bar{x}$	SD	

(+) 14.	ท่านได้รับฟังข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์จาก วิทยุหรือโทรทัศน์	3.37	0.68	ดี
<b>ด้านการป้องกันและให้ความช่วยเหลือ นักเรียนและชุมชน</b>				
(+) 15.	ท่านให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับ เรื่องโรคเอดส์	2.63	0.74	ดี
(+) 16.	ท่านให้คำปรึกษากับนักเรียนเพื่อ <sup>*</sup> ไม่ให้ติดยาเสพติดชนิดนี้ด	2.47	0.96	พอใช้
(+) 17.	ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ติดยา เสพติดชนิดนี้ด	1.20	0.65	ไม่ดี
(+) 18.	ให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง เพศศึกษา	2.00	0.86	พอใช้
(+) 19.	ท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคเอดส์แก่ชุมชน	2.04	0.86	พอใช้
(+) 20.	ร่วมมือกับสถานีอนามัยตำบล หรือหมู่บ้านในการจัดนิทรรศการ การให้ความรู้กับชุมชน หมู่บ้าน	1.95	0.86	พอใช้
(+) 21.	ท่านเข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์	1.67	0.82	พอใช้

## ตารางที่ 25(ต่อ)

ลำดับที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ครุอนามัย (N=392)		ระดับ การปฏิบัติ
		$\bar{X}$	SD	
(+) 22.	ท่านประสาณงานติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโรคเอดส์จากเจ้าหน้าที่ กรายทรงสาธารณะเพื่อเผยแพร่	2.18	0.87	พอใช้
(+) 23.	ท่านกระตันให้นักเรียนสนใจฟังข่าวและ ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโรคเอดส์	2.72	0.79	ดี
(+) 24.	จัดทำสื่อการสอนเกี่ยวกับโรคเอดส์ เพื่อประกอบการเรียนการสอน	1.92	0.87	พอใช้
รวม		3.03	0.27	ดี
  (+) หมายถึง การปฏิบัติก��บก (-) หมายถึง การปฏิบัติก��ลบ				
จากตารางที่ 25 แสดงให้เห็นว่าครุอนามัยมีการปฏิบัตินเกี่ยวกับโรคเอดส์โดย ส่วนรวม อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครุอนามัยโรงเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยว กับโรคเอดส์อยู่ในระดับดีมากจำนวน 10 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1,2,3,4,5,6,9,10,11 และ 13 อยู่ในระดับดี จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 7,8,12,14,15 และข้อ 23 อยู่ในระดับพอใช้ จำนวน 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ 16,18,19,20,21,22 และ 24 อยู่ในระดับไม่ดี 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 17				

ตารางที่ 26 เปรียบเทียบการปฎิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้บริหาร และครุอนามัยโรงเรียน

ลำดับ ที่	การปฎิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ผู้บริหาร (N=392)		ครุอนามัย (N=392)		$t$		
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD			
<b>ด้านการป้องกันตนเอง</b>								
ท่านได้ปฏิบัติลังต่อไปนี้								
(-)	1. ท่านรับโลหิตเข้าสูตร่างกาย	3.92	0.32	3.88	0.38	1.61		
(-)	2. ท่านใช้แอลกอฮอล์ร่วมกับผู้อื่น	3.86	0.41	3.85	0.43	0.24		
(-)	3. ท่านใช้มีดยาสูบร่วมกับผู้อื่น	3.87	0.37	3.90	0.34	-1.28		
(-)	4. ท่านใช้มีดโกนร่วมกับผู้อื่น	3.57	0.63	3.85	0.40	-7.32*		
(-)	5. ท่านหรือ คู่สมรส, คุณอน ของท่าน <sup>เที่ยวโลสเกตติโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย</sup>	3.64	0.69	3.74	0.58	-2.14*		
(-)	6. ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาท่านหรือครอบครัว <sup>ของท่านเจาหยูหุ่ร้านเสริมสวย</sup>	3.87	0.41	3.86	0.43	0.17		
(-)	7. ท่านใช้หัวตัดเล็บร่วมกับผู้อื่น	2.82	0.99	2.84	0.93	-0.33		
(+)	8. อ่านข่าวหรือติดตามข่าวเกี่ยวกับโรคเอดส์	3.18	0.69	3.21	0.63	-0.33		
(-)	9. ท่านฉีดยาเสพติด	3.95	0.30	3.94	0.38	0.31		
(-)	10. ท่านมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด	3.95	0.32	3.96	0.29	-0.68		
(-)	11. ท่านมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน	3.93	0.34	3.94	0.32	-0.58		
(-)	12. ท่านมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลมากกว่า 1 คนขึ้นไป	3.45	0.63	3.83	0.47	-9.56*		
(+)	13. ท่านใช้วิธีการฝังเข็มในการรักษาโรค	3.92	0.37	3.91	0.83	0.39		

## ตารางที่ 26 (ต่อ)

ลำดับ ที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ผู้บริหาร		ครุ腕น้ำมันย		<i>t</i>	
		(N=392)	$\bar{X}$	SD	(N=392)		
(+)	14. ท่านได้รับฟังข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ จากวิทยุหรือโทรทัศน์		3.40	0.62	3.37	0.68	0.54
ค้านการป้องกันและให้ความช่วยเหลือนักเรียน และชุมชน							
(+)	15. ท่านให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง โรคเอดส์		2.66	0.80	2.63	0.74	0.64
(+)	16. ท่านให้คำปรึกษากับนักเรียนเพื่อไม่ให้ ติดยาเสพติดชนิดฉีด		2.54	0.96	2.47	0.96	0.89
(+)	17. ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ติดยาเสพติด ชนิดฉีด		1.22	0.63	1.20	0.65	0.42
(+)	18. ให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง เพศศึกษา		2.17	0.94	2.00	0.86	2.56*
(+)	19. ท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคเอดส์แก่ชุมชน		2.28	0.83	2.04	0.86	3.91*
(+)	20. ร่วมมือกับสถานีอนามัยตำบลหรือหมู่บ้าน ในการจัดนิทรรศการการให้ความรู้แก่ ชุมชน หมู่บ้าน		2.07	0.83	1.95	0.86	1.97
(+)	21. ท่านเข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์		1.91	0.84	1.67	0.82	4.11*

## ตารางที่ 26 (ต่อ)

ลำดับ ที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ผู้บริหาร		ครุอนามัย		$t$
		(N=392)	SD	(N=392)	SD	
(+)	22. ท่านประسانงานติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโรคเอดส์จากเจ้าหน้าที่ กรุงเทพมหานครและเพื่อเผยแพร่	2.26	0.85	2.18	0.87	1.28
(+)	23. ท่านกระตื้นให้นักเรียนสนใจฟังข่าวและ ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโรคเอดส์	2.68	0.74	2.72	0.79	-0.79
(+)	24. จัดทำสื่อการสอนเกี่ยวกับโรคเอดส์ เพื่อประกอบการเรียนการสอน	2.06	0.85	1.92	0.87	2.31*
รวม		3.05	0.29	3.03	0.27	0.69

\* $p < .05$  (.05  $t \approx \pm 1.96$ )

(+) หมายถึง การปฏิบัติทางบวก

(-) หมายถึง การปฏิบัติทางลบ

จากตารางที่ 26 เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยส่วนรวม  
ระหว่างผู้บริหารและครุอนามัยโรงเรียน พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  
ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารและครุอนามัยโรงเรียนมี  
การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 7 ข้อ  
ได้แก่ ข้อ 4, 5, 12, 18, 19, 21 และข้อ 24

ตารางที่ 27 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการปฎิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของ  
ผู้บริหารและครุอนามัยโรงเรียน ในด้านการป้องกันตนเอง

(N=392)

ลำดับที่	การปฎิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ระดับ
	ด้านการป้องกันตนเอง	X SD การปฎิบัติ

ผู้บริหารโรงเรียน	3.67	0.24	ดีมาก
ครุอนามัยโรงเรียน	3.72	0.25	ดีมาก

จากตารางที่ 27 แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร มีการปฎิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ด้านการป้องกันตนเองโดยส่วนรวมอยู่ในระดับ ดีมาก  
และเมื่อพิจารณาการปฎิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ด้านการป้องกันตนเองของครุอนามัย  
โรงเรียน พบว่า มีการปฎิบัติอยู่ในระดับ ดีมาก



ตารางที่ 28 เปรียบเทียบการปฎิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้บริหาร และครุอานามัยโรงเรียน  
ด้านการป้องกันตนเอง

ลำดับ ที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ด้านการป้องกันตนเอง	ผู้บริหาร (N=392)		ครุอานามัย (N=392)		$t$
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
ท่านได้ปฏิบัติลงต่อไปนี้						
(-)	1. ท่านรับโลหิตเข้าสู่ร่างกาย	3.92	0.32	3.88	0.38	1.61
(-)	2. ท่านใช้แปรงลิฟฟ์ร่วมกับผู้อื่น	3.86	0.41	3.85	0.43	0.24
(-)	3. ท่านใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น	3.87	0.37	3.90	0.34	-1.28
(-)	4. ท่านใช้มิดโภนร่วมกับผู้อื่น	3.57	0.63	3.85	0.40	-7.32*
(-)	5. ท่านหรือ คู่สมรส, คุณอน ของท่าน <sup>เที่ยวโลเก็นโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย</sup>	3.64	0.69	3.74	0.58	-2.14*
(-)	6. ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาท่านหรือครอบครัวของท่านเจาะหูที่ร้านเสริมสวย	3.87	0.41	3.86	0.43	0.17
(-)	7. ท่านใช้หีตัดเล็บร่วมกับผู้อื่น	2.82	0.99	2.84	0.93	-0.33
(+)	8. อ่านข่าวหรือติดตามข่าวเกี่ยวกับโรคเอดส์	3.18	0.69	3.21	0.63	-0.33
(-)	9. ท่านฉีดยาเสพติด	3.95	0.30	3.94	0.38	0.31
(-)	10. ท่านมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดยาเสพติดชนิดนิด	3.95	0.32	3.96	0.29	-0.68
(-)	11. ท่านมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน	3.93	0.34	3.94	0.32	-0.58

ตารางที่ 28 (ต่อ)

ลำดับ ที่	การปฎิเสธเกี่ยวกับโรคเอดส์ ด้านการป้องกันตนเอง		ผู้บริหาร	ครุอนามัย	$t$	
			(N=392)	(N=392)		
			$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD
(-)	12. ท่านมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลมากกว่า 1 คนขึ้นไป		3.45	0.63	3.83	0.47 -9.56*
(+)	13. ท่านใช้วิธีการฝังเข็มในการรักษาโรค	3.92	0.37	3.91	0.83 0.39	
(+)	14. ท่านได้รับฟังข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ จากวิทยุหรือโทรทัศน์	3.40	0.62	3.37	0.68 0.54	
รวม		3.67	0.24	3.72	0.25 -2.95*	

\* $p < .05$  (.05  $t \approx \pm 1.96$ )

(+) หมายถึง การปฏิเสธทางบวก

(-) หมายถึง การปฏิเสธทางลบ

จากตารางที่ 28 เมื่อเปรียบเทียบการปฏิเสธเกี่ยวกับโรคเอดส์ด้านการป้องกันตนเองโดยส่วนรวม ระหว่างผู้บริหารและครุอนามัย โรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครุอนามัยโรงเรียนมีการปฏิเสธเกี่ยวกับโรคเอดส์ในการป้องกันตนเองดีกว่าผู้บริหารและเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารและครุอนามัย โรงเรียนมีการปฏิเสธเกี่ยวกับโรคเอดส์ด้านการป้องกันตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 3 ข้อโดยครุอนามัยโรงเรียนมีการปฏิเสธดีกว่าผู้บริหารได้แก่ ข้อ

4. ท่า�ใช้มีดโกนร่วมกับผู้อื่น
5. ท่า�หรือ คู่สมรส, คู่นอนของท่า�เที่ยวโลเกต์โดยไม่ใช้  
ถุงยางอนามัย
12. ท่า�มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลมากกว่า 1 คนขึ้นไป

ตารางที่ 29 ค่าเฉลี่ย และค่าล่วงเบี้ยงเบนมาตรฐานการปฎิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้บริหารและครุอนามัยโรงเรียน ในด้านการป้องกันและให้ความช่วยเหลือนักเรียนและชุมชน

(N=392)

ลักษณะที่	การปฎิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ระดับ
	ด้านการป้องกันและให้ความช่วยเหลือ	การปฎิบัติ
	นักเรียนและชุมชน	X SD

ผู้บริหารโรงเรียน	2.18	0.59	พอใช้
-------------------	------	------	-------

ครุอนามัยโรงเรียน	2.08	0.59	พอใช้
-------------------	------	------	-------

จากตารางที่ 29 แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร มีการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ด้านการป้องกันและให้ความช่วยเหลือนักเรียนและชุมชน อยู่ในระดับ พอใช้ และเมื่อพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ด้านการป้องกันและให้ความช่วยเหลือนักเรียนและชุมชน ของครุอนามัยโรงเรียน พบว่า มีการปฏิบัติในระดับ พอใช้ นักเรียนและชุมชน ของครุอนามัยโรงเรียน พบว่า มีการปฏิบัติในระดับ พอใช้

ตารางที่ 30 เปรียบเทียบการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ของผู้บริหารและครุโภานามัยโรงเรียน  
ในด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนและชุมชน

ลำดับ ที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ด้านการป้องกันและให้ความช่วยเหลือ นักเรียนและชุมชน	ผู้บริหาร		ครุโภานามัย		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	

(+).1.	ท่านให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง โรคเอดส์	2.66	0.80	2.63	0.74	0.64
(+).2.	ท่านให้คำปรึกษากับนักเรียนเพื่อไม่ให้ ติดยาเสพติดชนิดน้ำเงี้ยว	2.54	0.96	2.47	0.96	0.89
(+).3.	ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ติดยาเสพติด ชนิดน้ำเงี้ยว	1.22	0.63	1.20	0.65	0.42
(+).4.	ให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง เพศศึกษา	2.17	0.94	2.00	0.86	2.56*
(+).5.	ท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคเอดส์แก่ชุมชน	2.28	0.83	2.04	0.86	3.91*
(+).6.	ร่วมมือกับสถานีอนามัยดำเนินการหรือหน่วย ในการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ชุมชน หมู่บ้าน	2.07	0.83	1.95	0.86	1.97
(+).7.	ท่านเข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์	1.91	0.84	1.67	0.82	4.11*
(+).8.	ท่านประสานงานติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโรคเอดส์จากเจ้าหน้าที่ กระทรวงสาธารณสุขเพื่อเผยแพร่	2.26	0.85	2.18	0.87	1.28

## ตารางที่ 30 (ต่อ)

ลำดับ ที่	การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ด้านการป้องกันและให้ความช่วยเหลือ นักเรียนและชุมชน	ผู้บริหาร		ครุอนามัย		<i>t</i>
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
(+) 9.	ท่านกระตันให้นักเรียนสนใจฟังข่าวและ ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโรคเอดส์	2.68	0.74	2.72	0.79	-0.79
(+) 10.	จัดทำสื่อการสอนเกี่ยวกับโรคเอดส์ เพื่อประกอบการเรียนการสอน	2.06	0.85	1.92	0.87	2.31*
รวม		2.18	0.59	2.08	0.59	2.55*

\* $p < .05$  ( $.05t \alpha = \pm 1.96$ )

(+) หมายถึง การปฏิบัติทางบวก

(-) หมายถึง การปฏิบัติทางลบ

จากตารางที่ 30 เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ด้านการป้องกัน และให้ความช่วยเหลือนักเรียนและชุมชน โดยล้วนรวม ระหว่างผู้บริหารและครุอนามัย โรงเรียน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารมี การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ด้านการป้องกันและให้ความช่วยเหลือนักเรียนและชุมชน ต่ำกว่า ครุอนามัยโรงเรียน และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารและครุอนามัย โรงเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ด้านการป้องกันและให้ความช่วยเหลือนักเรียนและ ชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 4 ข้อโดยผู้บริหารมีการ ปฏิบัติต่ำกว่าครุอนามัยโรงเรียน ได้แก่ ข้อ

18. ให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา
19. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์แก่ชุมชน
21. ท่านเข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
24. จัดทำสื่อการสอนเกี่ยวกับโรคเอดส์เพื่อประกอบการเรียนการสอน