



บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

รูปแบบการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) โดยทำการศึกษาเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (cross- sectional studies) และทำการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน ตุลาคม 2548 ถึงเดือน มกราคม 2549 รวมระยะเวลา 4 เดือน

ระเบียบวิธีวิจัย

ประชากรที่ศึกษา

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นสตรีหลังคลอด โดยคลอดและรับบริการตรวจสุขภาพหลังคลอดครั้งแรก ณ ห้องตรวจนรีเวชกรรม (คลินิกตรวจหลังคลอด) กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

กลุ่มตัวอย่าง

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด (Purposive Sampling) จำนวนทั้งสิ้น 235 ราย โดยเลือกจากสตรีหลังคลอดที่มารับบริการตรวจสุขภาพหลังคลอดครั้งแรก ณ ห้องตรวจนรีเวชกรรม (คลินิกตรวจหลังคลอด) กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ในระหว่างเดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนมกราคม 2549 และกำหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

1. เป็นสตรีในระยะหลังคลอดที่มีสถานภาพสมรสคู่ ไม่ได้หย่า หรือแยกกันอยู่กับสามีในระยะ 6 สัปดาห์หลังคลอด
2. ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย

การคำนวณกลุ่มตัวอย่าง

คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร

$$n = Z^2 pq / d^2 \quad (\text{Daniel, 1991})$$

เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

$Z =$ ค่ามาตรฐานตามโค้งปกติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% = 1.96

$p =$ สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศสัมพันธ์ในระยะหลังคลอด

$q =$ สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีเพศสัมพันธ์ในระยะหลังคลอด

$d =$ ความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างที่ยอมรับให้เกิดขึ้นได้ = 0.05

จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า สตรีหลังคลอดมีเพศสัมพันธ์ในระยะ 6 สัปดาห์หลังคลอด ร้อยละ 18.80 (วิภาพร เสนารัตน์, 2542) ดังนั้น

$$p = 0.188$$

$$q = 1 - 0.188 = 0.812$$

$$n = \frac{(1.96)^2(0.188)(0.812)}{(0.05)^2} = 234.57 \text{ หรือประมาณ } 235 \text{ ราย}$$

ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ทั้งหมดจำนวน 235 ราย

สถานที่ศึกษา

สถานที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ คือ ห้องตรวจนรีเวชกรรม (คลินิกตรวจหลังคลอด) กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ลักษณะของเครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการศึกษาค้นคว้า จากตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ศึกษา โดยแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลของสตรีในระยะหลังคลอด

1.1 ข้อมูลที่ได้จากเวชระเบียน ประกอบด้วยวันที่คลอด จำนวนการตั้งครรภ์ วิธีการคลอด การตัดและเย็บแผลฝีเย็บ จำนวน 4 ข้อ

1.2 ข้อมูลทั่วไปที่ได้จากการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ข้อมูลด้านประชากร การศึกษา เศรษฐกิจ -สังคม และด้านร่างกาย จำนวน 15 ข้อ

ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลด้านความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในระยะหลังคลอด

ลักษณะคำถามข้อมูลความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในระยะหลังคลอดประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด 8 ข้อ โดยข้อคำถามเป็นลักษณะให้เลือกตอบ รู้ หรือไม่รู้ ให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก และมีเนื้อหาในรายละเอียดของข้อคำถามความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในระยะหลังคลอด ดังนี้

- ระยะเวลาที่ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ในระยะหลังคลอด : โดยทั่วไปแพทย์หรือพยาบาลจะแนะนำให้สตรีหลังคลอดงดการมีเพศสัมพันธ์ ประมาณ 6 สัปดาห์หลังคลอด หรือจนกระทั่งมาตรวจร่างกายหลังคลอดแล้ว (วราวุธ สุมาวงศ์, 2533)

- เหตุผลของการงดการมีเพศสัมพันธ์ในระยะหลังคลอด : การงดการมีเพศสัมพันธ์ในระยะหลังคลอดชั้หลักกว่าใน 6 สัปดาห์หลังคลอดนี้แผลในโพรงมดลูก แผลฝีเย็บ หรือแผลผ่าตัดบริเวณหน้าท้องต้องการเวลาเพื่อให้แผลหายสนิทจะได้ไม่เกิดการติดเชื้อตามมาหลังจากมีเพศสัมพันธ์กัน

- ระยะเวลาของการเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในระยะหลังคลอดที่เหมาะสม : การมีเพศสัมพันธ์ในระยะหลังคลอดที่เหมาะสมไม่สามารถใช้เวลาเป็นตัวกำหนดได้ ทั้งนี้ควรขึ้นอยู่กับความพร้อมของสตรีหลังคลอดและสามีเป็นสำคัญ

- ความต้องการทางเพศในระยะหลังคลอด : สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะหลังคลอด ซึ่งความต้องการทางเพศมีทั้งความต้องการทางเพศที่เพิ่มขึ้น ลดลง หรือคงเดิม ซึ่งส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ได้ในระยะหลังคลอด

- ปัญหาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ในระยะหลังคลอด คือ ความยุ่งยาก ความลำบาก อุปสรรคหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในการกลับมามีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกหลังคลอด และตลอดระยะ 6 สัปดาห์หลังคลอด เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของสตรีในระยะหลังคลอดและสามี ได้แก่ การเจ็บปวดจากการมีเพศสัมพันธ์ การมีเลือดออกจากช่องคลอด การอักเสบติดเชื้อ ความรู้สึกคับข้องใจ เครียด วิตกกังวล กลัวในความไม่พร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์ในระยะหลังคลอด

- การป้องกันปัญหาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ : ควร มีเพศสัมพันธ์เมื่อน้ำคาวปลาหมด หรือแผลฝีเย็บติดสนิท ควมกำเนิดก่อนมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง รวมทั้งดูแลรักษาความสะอาดของอวัยวะสืบพันธุ์ก่อนและหลังมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และอาจให้สามีสวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อในโพรงมดลูก

- การบริหารร่างกายภายหลังคลอด : โดยเฉพาะการบริหารฟีเย็บและอุ้งเชิงกราน (Kegel exercise) เป็นการบริหารเพื่อเพิ่มเพิ่มความแข็งแรงแก่กล้ามเนื้อรอบช่องคลอดและพื้นเชิงกรานและยังเป็นการเพิ่มความพึงพอใจทางเพศสัมพันธ์อีกวิธีหนึ่ง

ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทางด้านจิตใจ

ลักษณะคำถามข้อมูลทางด้านจิตใจ ประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในระยะหลังคลอดได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาในการตอบสนองทางเพศของสตรีในระยะหลังคลอด สภาพความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจของสตรีในระยะหลังคลอด การกลับมามีเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสมของสตรีในระยะหลังคลอด ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์หลังคลอด รวมทั้งการระบุความต้องการขอความช่วยเหลือเรื่องเพศสัมพันธ์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีข้อคำถามทั้งหมด 13 ข้อ แบ่งเป็นข้อความในทางบวกจำนวน 7 ข้อ คือข้อ 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13 และข้อความในทางลบจำนวน 6 ข้อ คือ 3, 4, 5, 9, 10, 11 คำถามเป็นลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ตอนที่ 4 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ของสตรีหลังคลอด ประกอบด้วย

- 4.1 การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในระยะหลังคลอด จำนวน 3 ข้อ
 - 4.2 ปัญหาและภาวะแทรกซ้อนจากการมีเพศสัมพันธ์ในระยะหลังคลอด จำนวน 1 ข้อ
- ข้อคำถามเป็นคำถามแบบมีโครงสร้างทั้งปลายปิด และปลายเปิด

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ

ผู้วิจัยดำเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1 กำหนดโครงสร้างและขอบเขตของเนื้อหาที่จะถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
- 2 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการสร้างแบบสัมภาษณ์
- 3 ร่างแบบสัมภาษณ์ และนำแบบสัมภาษณ์ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและนำมาปรับปรุงแก้ไข
- 4 การตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม

4.1 ความถูกต้องของเนื้อหา (Content validity) โดยให้ผู้ทรงวุฒิจำนวน 3 ท่านเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและรายละเอียดของข้อคำถาม ความเหมาะสมของภาษาในข้อคำถามทุกข้อ

4.2 ความน่าเชื่อถือ (Reliability) นำแบบสอบถามที่ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายๆกันกับประชากรที่ศึกษา คือ สตรีหลังคลอดที่มารับบริการตรวจสุขภาพหลังคลอดที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 30 คน และนำไปแก้ไขข้อบกพร่องก่อนนำไปใช้จริงและหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของ ครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient)

4.3 สร้างเครื่องมือลงรหัส

เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมาย

1. แบบสัมภาษณ์ความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในระยะหลังคลอด มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ (วิภาพร เสนารัตน์, 2542)

ตอบถูกได้ 1 คะแนน

ตอบผิด หรือไม่ตอบ ได้ 0 คะแนน

การแปลความหมายใช้เกณฑ์การประเมินผลความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ในระยะหลังคลอด โดยแบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2532)

สูง	ร้อยละ 76 – 100	หมายถึง	มีความรู้ระดับดี
ปานกลาง	ร้อยละ 50 – 75	หมายถึง	มีความรู้ระดับปานกลาง
ต่ำ	ร้อยละ 0 – 49	หมายถึง	มีความรู้ระดับต่ำ

2. แบบสัมภาษณ์ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในระยะหลังคลอด โดยกำหนดให้คะแนนการตอบแบบสัมภาษณ์เป็นรายข้อดังนี้

ข้อคำถามที่มีลักษณะทางบวก (Positive Statement) ให้คะแนนดังนี้

ตัวเลือก	คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิ่ง	5
เห็นด้วย	4
ไม่แน่ใจ	3
ไม่เห็นด้วย	2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	1

ข้อคำถามที่มีลักษณะทางลบ (Negative Statement) ให้คะแนนดังนี้

ตัวเลือก	คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิ่ง	1
เห็นด้วย	2
ไม่แน่ใจ	3
ไม่เห็นด้วย	4
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	5

การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยใช้เกณฑ์การประเมินผลทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในระยะหลังคลอด โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538)

คะแนนเฉลี่ย 3.67 – 5.00	หมายถึง	สตรีหลังคลอดมีทัศนคติที่ดี
คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.66	หมายถึง	สตรีหลังคลอดมีทัศนคติปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.33	หมายถึง	สตรีหลังคลอดมีทัศนคติที่ไม่ดี

การหาคุณภาพของเครื่องมือ

1. หาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการพิจารณาถึงความสอดคล้อง หรือ 1 ความครบถ้วนของเนื้อหาสาระ ความสมบูรณ์ด้านภาษาที่ใช้ ความต่อเนื่องของข้อคำถาม โดยการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้จริง การพิจารณาข้อคำถามแต่ละข้อผู้วิจัยมีดัชนีวัด ดังต่อไปนี้

- ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม หรือ จุดประสงค์ (IC, Index of consistency) วิธีนี้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาแต่ละคนจะให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้

+ 1	หมายถึง	แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นวัดวัตถุประสงค์ หรือพฤติกรรมข้อนั้น
0	หมายถึง	ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นวัดวัตถุประสงค์ หรือพฤติกรรมข้อนั้น
- 1	หมายถึง	แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นวัดวัตถุประสงค์ หรือพฤติกรรมข้อนั้น

2. การหาความเชื่อมั่น Reliability) โดยผู้วิจัยได้นำแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับสตรีในระยะหลังคลอดที่มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่จะทำการศึกษา จำนวน 30 ราย แล้วนำมาคำนวณหาความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนนาค (Cronbach' s Alpha Coefficient) เพื่อดูว่าข้อคำถามใดบ้างที่ต้องทำการปรับปรุงแก้ไข โดยใช้เกณฑ์ถ้าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อคำถาม มีค่าระหว่าง 0 ถึง 0.20 ควรทำการปรับปรุงแก้ไข ถ้าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อคำถามมีค่าน้อยกว่า 0 ควรตัดทิ้ง (คูสิต สุจิรารัตน์,

2544) สำหรับการพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อคำถามแต่ละข้อในแบบสัมภาษณ์ พบว่าอยู่ในช่วงและผู้วิจัยไม่ได้ตัดข้อคำถามใดๆออกเนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบาค (Cronbach' s Alpha Coefficient) สูงกว่า 0.70 (ดังตารางที่ 1) หลังจากนั้นผู้วิจัยได้นำแบบสัมภาษณ์ไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริง จำนวน 235 ราย แล้ววิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของแบบสัมภาษณ์ด้วยวิธีเดียวกัน

ตารางที่ 1 ค่าความเที่ยงของแบบสัมภาษณ์ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ของสตรีในระยะหลังคลอด

แบบสัมภาษณ์	ค่าความเที่ยง (n = 30)
ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ของสตรีในระยะหลังคลอด	0.84

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ผู้วิจัยขอหนังสือแนะนำตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อขออนุมัติในการเก็บรวบรวมข้อมูล

2. เมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเก็บข้อมูลได้ ผู้วิจัยเข้าพบหัวหน้าห้องตรวจนรีเวชกรรม (คลินิกตรวจหลังคลอด) กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเพื่อขอเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล สัปดาห์ละ 2 วัน คือทุกวันอังคารและพฤหัสบดี และเริ่มทำการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2548 ถึง 31 มกราคม 2549 จำนวนทั้งสิ้น 235 ราย

3. ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติจากเพิ่มประวัติ คือเป็นสตรีในระยะหลังคลอดที่มารับบริการตรวจสุขภาพหลังคลอดครั้งแรก และขอความร่วมมือในการทำวิจัยพร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างทุกรายในขณะที่กลุ่มตัวอย่างรอรับการตรวจจากแพทย์ ผู้วิจัยแนะนำตัวและอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทราบ เมื่อกลุ่มตัวอย่างให้ความร่วมมือ ผู้วิจัยเชิญกลุ่มตัวอย่างนั่งในสถานที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะในห้องใดห้องหนึ่งในหน่วยที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล

4. เมื่อกลุ่มตัวอย่างให้ความร่วมมือในการวิจัย ผู้วิจัยเริ่มทำการสัมภาษณ์ โดยเริ่มสัมภาษณ์ตามลำดับดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของสตรีในระยะหลังคลอด ข้อมูลด้านความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ในระยะหลังคลอด ข้อมูลด้านจิตใจ และข้อมูลเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ของสตรีหลังคลอดเป็นชุดสุดท้าย ในการสัมภาษณ์นั้นถ้ากลุ่มตัวอย่างมีคำตอบเพิ่มเติมก็จดบันทึกตามพฤติกรรมนั้นๆ

5. เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสัมภาษณ์เสร็จ ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล แปลข้อมูลที่เป็นรหัสตามคู่มือลงรหัสที่เตรียมไว้ทำการบันทึกข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม SPSS 11.5 for windows เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ตามขั้นตอนต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม SPSS/ PC+ โดยกำหนดความมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 มีการวิเคราะห์ตามลำดับดังนี้

1. สถิติพรรณนา : วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของสตรีในระยะหลังคลอด และข้อมูลการมีเพศสัมพันธ์ในระยะหลังคลอด ใช้การแจกแจงความถี่ และคำนวณหาค่าร้อยละ นำเสนอในรูปแบบตาราง

2. สถิติวิเคราะห์ : ใช้ทดสอบตัวแปรต่างๆ ด้วยสถิติวิเคราะห์ ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ดังนี้

- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยต่างๆกับการมีเพศสัมพันธ์ของสตรีในระยะหลังคลอด ใช้การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มด้วยสถิติทดสอบ chi-square ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ เพื่อให้ทราบลักษณะและทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการมีเพศสัมพันธ์ของสตรีในระยะหลังคลอด