#### ผลของโปรแกรมการจัดการอาการที่เน้นการสวดมนต์ต่ออาการปวดของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย



นางสาวเบญจมาศ ตระกูลงามเด่น

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



# THE EFFECT OF SYMPTOM MANAGEMENT PROGRAM FOCUSING PRAYING ON PAIN OF TERMINAL CANCER PATIENTS

Miss Benchamart Trakoolngamden

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Nursing Science Program in Nursing Science

Faculty of Nursing

Chulalongkorn University

Academic Year 2011

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ผลของโปรแกรมการจัดการอาการที่เน้นการสวดมนต์ต่อ
	อาการปวดของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
โดย	นางสาวเบญจมาศ ตระกูลงามเด่น
สาขาวิชา	พยาบาลศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีพร ธนศิลป์
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลง ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบ	กรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง กักเซ็ต
TOUT IS THE THE PROPERTY OF TH	12 M 1 I M 1
(รองศาสตราจารย์ ร้	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อยตำรวจเอกหญิง ดร. ยุพิน อังสุโรจน์)
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	
	บ วอลาส์ ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ัดร. ประนอม รอดคำดี)
	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(รองศาสตราจารย์ ด	ร. สุรพร ธนคลบ)
(อาจารย์ ดร. ซูศักดิ์	วันวัด กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย ขัมภลิขิต)

เบญจมาศ ตระกูลงามเด่น : ผลของโปรแกรมการจัดการอาการที่เน้นการสวดมนต์ต่อ อาการปวดของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย (THE EFFECT OF SYMPTOM MANAGEMENT PROGRAM FOCUSING PRAYING ON PAIN OF TERMINAL CANCER PATIENTS) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: รศ. ดร. สุรีพร ธนศิลป์ , 221 หน้า

การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการอาการที่เน้น การสวดมนต์ต่ออาการปวดของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้ป่วยมะเร็ง ที่เข้ารับบริการที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร จำนวน 60 ราย ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มควบคุมจนครบ 30 ราย แล้วจึงเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลใน กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ในขณะที่กลุ่มทดลองได้รับการพยาบาล ตามปกติร่วมกับโปรแกรมการจัดการอาการที่เน้นการสวดมนต์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ โปรแกรมการจัดการอาการที่เน้นการสวดมนต์ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากรูปแบบการจัดการอาการของ Dodd et al. (2001) และแนวคิดเกี่ยวกับการสวดมนต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพยาบาลแบบ ผสมผสาน โดยโปรแกรมประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การประเมินความต้องการและ ประสบการณ์การรับรู้ของผู้ป่วย 2) การให้ความรู้ในการจัดการอาการปวด 3) การฝึกทักษะการ จัดการอาการปวดและการสวดมนต์ 4) การประเมินผล สื่อที่ใช้ในโปรแกรมประกอบด้วย แผนการ สอน คู่มือการจัดการอาการปวดด้วยตนเอง และเครื่องเล่นบันทึกเสียงและเทปบันทึกการสวดมนต์ โดยโปรแกรมและสื่อผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบประเมินอาการปวด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบความแปรปรวน และสถิติทดสอบที ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

- 1. อาการปวดภายหลังการทดลอง 4 วันและ 7 วันของกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
- 2. อาการปวดภายหลังการทดลอง 4 วันและ 7 วันของกลุ่มทดลอง น้อยกว่าก่อนการ ทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	ลายมือชื่อนิสิต เปกรหาห งาร:กฎงเหตน
ปีการศึกษา255 <b>4</b>	ลายมือชื่ออ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

KEYWORDS; SYMPTOM MANAGEMENT / PRAYING / PAIN / TERMINAL CANCER

**PATIENTS** 

BENCHAMART TRAKOOL NGAMDEN: THE EFFECT OF SYMPTOM MANAGEMENT PROGRAM FOCUSING PRAYING ON PAIN OF TERMINAL CANCER PATIENTS. THESIS ADVISOR: ASSOC. PROF. SUREEPORN

THANASILP, Ph.D., 221 pp.

This quasi-experimental research aimed to test the effect of symptom

management program focusing on praying on pain of terminal cancer patients. Study

sample were 60 terminal cancer patients who were treated at Arokayasala Wat

Khampramong, Skon Nakhon Province. The subjects were divided into control group

and experimental group. The control group received routine nursing care, while the

experimental group received routine nursing care and the Symptom Management

Program focusing on Praying. The program was based on the Symptom Management

Model (Dodd et al., 2001) and praying as part of complementary concepts that

comprised of four sessions: a) symptom experience assessment, b) knowledge

providing, c) symptom management training and praying, d) evaluation phase. The

Wong-Baker face pain rating scale was used to measure the collected data.

Furthermore, Independent t-test was used to analyze comparison of data between the

two groups.

The major findings showed that:

The 4 days and 7 days pain of experimental group were significantly lower

than those of the control group (p<.05).

The 4 days and 7 days posttest pain of the experimental group were

significantly lower than that of the pretest phase (p<.05).

9

#### กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของ รอง ศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร ธนศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ซึ่งกรุณให้าความรู้ ขึ้แนะแนวทาง ในการทำวิจัย รวมทั้งคำชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ตลอดจนแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเมตตา ห่วงใย เอาใจใส่ และส่งเสริมให้กำลังใจเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาของการทำ วิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม รอดคำดี ประธานสอบวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความเมตตา ให้ข้อเสนอแนะในการ แก้ไขวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาตรวจสอบความ ตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแก่พระอาจารย์ ดร. ปพนพัชร์ จิรธัมโม เจ้าอาวาสวัดคำ ประมง ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งและให้โอกาสผู้วิจัยได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่าง ยิ่งในชีวิต และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่และจิตอาสาทุกคน ณ อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัด สกลนคร ที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้ รวมถึงความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ ดูแลเอาใจ ใส่ผู้วิจัยเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการเก็บข้อมูลการวิจัย และที่ขาดมิได้ คือ กราบขอบพระคุณ ผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่เสียสละเวลาและให้ความร่วมมือในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้เป็น อย่างดียิ่ง

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ สนับสนุนทุนบางส่วนในการทำวิจัยครั้งนี้

ท้ายสุดนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่และพี่สาวทุกคนอันเป็นที่รักยิ่ง ที่คอย ให้กำลังใจด้วยความรัก ความห่วงใย และขอขอบคุณเพื่อนๆอันเป็นที่รักทุกคน ที่คอยเสียสละเวลา อันมีค่าเพื่อให้ผู้วิจัยได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนและดำเนินการวิจัยได้เต็มเวลา ให้คำแนะนำอันเป็น ประโยชน์ ให้กำลังใจตลอดมาจนกระทั่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา

### สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อไทย	9
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ৰ
กิตติกรรมประกาศ	n
สารบัญ	ช
สารบัญตาราง	ผ
สารบัญภาพ	Ŋ
บทที่	
1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา	7
แนวเหตุผลและสมมุติฐานการวิจัย	7
ขอบเขตการวิจัย	10
คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย	10
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	12
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	14
แนวคิดเกี่ยวกับผู้ป่วยมะ รึงระยะสุดท้ายและการรักษาพยาบาล	14
แนวคิดเกี่ยวกับอาการปวดของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย	21
แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลแบบผสมผสาน	39
แนวคิดเกี่ยวกับการสวดมนต์	42
แบบจำลองของการจัดการกับอาการ	45
โปรแกรมการจัดการอาการที่เน้นการสวดมนต์	48
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	51

		หน้
3 1	วิธีดำเนินการวิจัย	5
	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	6
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	6
	การดำเนินการวิจัย	7
	การเก็บรวบรวมข้อมูล	8
	การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง	8
	การวิเคราะห์ข้อมูล	8
4	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	8
5	สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	ç
	สรุปผลการวิจัย	ç
	อภิปรายผลการวิจัย	10
	ข้อเสนอแนะ	11
รายก	ารอ้างอิง	11
ภาคเ	มนวก	12
	ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ	12
	ภาคผนวก ข จดหมายอนุญาตให้ใช้เครื่องมือวิจัย	
	และจดหมายขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย	12
	ภาคผนวก ค เอกสารรับรองการพิจารณาจริยธรรมและ	
	เอกสารการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง	13
	ภาคผนวก ง ตัวอย่างเครื่องมือ	14
	ภาคผนวก จ ตารางวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม	16
ประวั	ั วัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	22

### สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	แสดงคุณสมบัติของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง เมื่อได้รับการจับคู่จำแนก	
	ตามเพศ ระยะของโรคมะเร็ง ชนิดของโรคมะเร็ง และชนิดของยาแก้ปวด	62
2	จำนวนร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม อายุ เพศ	
	ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ และบุคคลที่ช่วยเหลือดูแลเป็นขั้นตอน	87
3	จำนวนร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการรักษาของ	
	กลุ่มตัวอย่าง	89
4	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอาการปวดจำแนกตามเวลาในกลุ่มทดลองและก่อน	
	การทดลองและหลังการทดลองในวันที่ 4 และวันที่ 7 ในกลุ่มควบคุม	94
5	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอาการปวดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	
	ก่อนการทดลอง หลังการทดลองวันที่ 4 และหลังการทดลองวันที่ 7 วิเคราะห์	
	ข้อมูลโดยใช้สถิติ Independent t-test	95
6	การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยคะแนนอาการปวดภายของกลุ่ม	
	ทดลองก่อนการทดลอง หลังการทดลองวันที่ 4 และวันที่ 7 จำแนกตามเวลา	
	ในการสวดมนต์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ One-way repeated measure	
	ANOVA	96
7	เปรียบเทียบความแตกต่างอาการปวดของกลุ่มทดลองเป็นรายคู่ จำแนก	
	ตามเวลาในการสวดมนต์ ด้วยวิธีการ LSD	96
8	การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยคะแนนอาการปวดภายในกลุ่ม	
	ควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลองวันที่ 4 และหลังการทดลองวันที่ 7	
	จำแนกตามเวลา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ One-way repeated measure	
	ANOVA	97
9	เปรียบเทียบความแตกต่างอาการปวดของกลุ่มควบคุมเป็นรายคู่ ก่อนการ	
	ทดลอง หลังการทดลองวันที่ 4 และหลังการทดลองวันที่ 7 ด้วยวิธีการ	
	I SD.	97

ตารางที่	เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยอาการปวดในกลุ่มทดลองก่อนและหลังการ
10	สวดมนต์
11	เปรียบเทียบความแตกต่างอาการปวดของกลุ่มทดลองเป็นรายคู่ จำแนก
	ตามเวลาในการสวดมนต์ โดยใช้สถิติ LSD
12	แสดงจำนวน ร้อยละของประสบการณ์การมีอาการในผู้ป่วยมะเร็งระยะ
	สุดท้าย (n=60)
13	แสดงจำนวน ร้อยละ ตามระดับความถี่ ความรุนแรง และความทุกข์ทรมาน
	จากอาการที่พบในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย (n=60)
14	แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสบการณ์มีอาการ ความถื่
	ของอาการความรุนแรงของอาการ และความทุกข์ทรมานจากอาการ
15	แสดงคะแนนอาการปวดของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายกลุ่มทดลองและกลุ่ม
	ควบคุมหลังการทดลองในวันที่ 1, 4 และ7วัน (n=60)
16	แสดงคะแนนอาการปวดของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายกลุ่มทดลองแต่ละวัน
	ตลอดการทดลอง (n=30)
17	ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความผาสุก
	ด้านจิตวิญญาณของกลุ่มทดลองโดยรวม รายด้านและรายข้อ (n=30)
18	แสดงอัตราการเต้นของหัวใจของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายกลุ่มทดลองก่อน
	และหลังการทดลองแต่ละวัน (n=30)
19	แสดงอัตราการหายใจของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายกลุ่มทดลองก่อนและ
	หลังการทดลองแต่ละวัน (n=30)
20	แสดงค่าความดันโลหิตตัวบนของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายกลุ่มทดลองก่อน
	และหลังการทดลองแต่ละวัน (n=30)
21	แสดงค่าความดันโลหิตตัวล่างของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายกลุ่มทดลองก่อง
	และหลังการทดลองแต่ละวัน (n=30)
22	แสดงค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ ความดันโลหิตตัวบน
	ความดันโลหิตตัวล่าง ก่อนและหลังการสวดมนต์ใน 7 วันของกลุ่มทดลอง
	(n=30)

## สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	กรอบแนวคิดการวิจัย	58
2	สรุปขั้นตอนการดำเนินการ	85
3	กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอาการปวดก่อนการทดลองและหลังการทดลอง	
	ของกลุ่มทดลองใน 7 วันและก่อนการทดลองและหลังการทดลองในวันที่ 4	
	และวันที่ 7 ของกลุ่มควบคุม	94
4	กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยอาการปวดของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการ	
	สวดมนต์	166