2.50

การวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อ คริปโตสปอริเดียม ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยการหาลำดับดีเอ็นเอ

นางสาวรัตนา เตียงทิพย์



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางการแพทย์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2543 ISBN 974-13-0889-2 ลิขสิทธิ์ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

GENETIC ANALYSIS OF *CRYPTOSPORIDIUM* FROM HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS-INFECTED PATIENTS IN KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL BY DNA SEQUENCING

Miss Rattana Tiengtip

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science in Medical Parasitology

Department of Parasitology

Faculty of Medicine

Chulalongkorn University

Academic year 2000

ISBN 974-13-0889-2

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อคริป	โตสปอริเดียมในผู้ป่วย	
	ที่ติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์		
	โดยการหาลำดับดีเอ็นเอ		
โดย	นางสาวรัตนา เตียงทิพย์		
สาขาวิชา	ปรสิตวิทยาทางการแพทย์		
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สมชาย จงวุฒิเวศย์		
คณะแพทยศาสตร์ จุฬ	าลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบั	บนีเป็นส่วนหนึ่งของ	
การศึกษาตามหลักสูต	รปริญญามหาบัณฑิต		
	01		
	Black Com	ล บดีคณะแพทยศาสตร์	
	(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรั	ตนกุล)	
คณะกรรมการสอบวิทเ	ยานิพนธ์		
	Ding Jhn	ประธานกรรมการ	
	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเสร็		
	Men &	อาจารย์ที่ปรึกษา	
	(รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สมช	าย จงวุฒิเวศย์)	
	Otos Oronans	กรรมการ	
	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อริยา จินดามพร)		

รัตนา เตียงทิพย์: การวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อคริปโตสปอริเดียมในผู้ป่วยที่ติด เชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยการหาลำดับ ดีเอ็นเอ (GENETIC ANALYSIS OF *CRYPTOSPORIDIUM* FROM HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS-INFECTED PATIENTS IN KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL BY DNA SEQUENCING)

อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.นพ.สมชาย จงวุฒิเวศย์, 73 หน้า. ISBN 974-13-0889-2

โรค cryptosporidiosis เป็นโรคติดเชื้อจากโปรโตซัวชนิดหนึ่งในกลุ่มคอคซิเดีย ใน genus Cryptosporidium ซึ่งพบการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยเฉพาะในผู้ติดเชื้อ ไวรัสเอชไอวี ในปัจจุบันมีการจำแนกสปีชีส์ ของเชื้อ Cryptosporidium ได้ 10 สปีชีส์ โดยอาศัย คุณลักษณะความจำเพาะของโฮสต์ รูปร่าง ลักษณะของโอโอซีสต์ ตำแหน่งของการติดเชื้อ และการ วิเคราะห์ทางอณูชีววิทยา เนื่องจากในปัจจุบันไม่มียาชนิดใดที่ให้ผลในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการป้องกันและการควบคุมการแพร่กระจายของโรคจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ปัจจุบันการศึกษา สปีซีส์ ของเชื้อ Cryptosporidium ในกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวียังมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นจึงได้ทำการ วิเคราะห์ Cryptosporidium จำนวน 30 ตัวอย่างจากอุจจาระของผู้ป่วยเอชไอวี ที่มารับการรักษาที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างปี ค.ศ.1966 ถึง ค.ศ. 2000 ผู้ป่วยทั้งหมดมีอาการท้องเสียเรื้อรัง และมี ปริมาณลิ้มโฟไซต์ชนิด CD4+ ต่ำ (ค่าเฉลี่ย <u>+</u> ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 121.07 <u>+</u> 152.39) การ ทำให้ดีเอ็นเอบริสุทธิ์โดยการย่อยด้วยโปตีนเนสเค และการสกัดโปรตีนส่วนเกินออกโดย ฟีนอล/ คลอโรฟอร์ม หลังจากการทำให้โอโอซีสต์เข้มข้นขึ้นโดย การลอยตัวในสารละลายน้ำตาลแล้วทำการเพิ่ม ปริมาณในส่วนของยืน small subunit ribosomal ribonucleic acid (SSU rRNA) โดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่ โพลิเมอร์เรส ซึ่งครอบคลุมความยาว 670 คู่เบส การหาลำดับเบสของดีเอ็นเอ โดยการวิเคราะห์จาก 2 ทิศทาง ผลการศึกษาพบ Cryptosporidium ทั้งสิ้น 4 สปีชีส์ ได้แก่ C. parvum (human genotype) มี จำนวน 25 ราย C. meleagridis 3 ราย C. muris 1 ราย และ C. felis 1 ราย โอโอซีสต์ ของ C. muris และ C. parvum ไม่มีความแตกต่างจากการวัดความกว้างและความยาว อย่างไรก็ตาม โอโอซีสต์ของ C. muris มีขนาดใหญ่กว่า โอโอซีสต์ ของ Cryptosporidium species อื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่ โอโอซีสต์ ของ C. felis มีขนาดเล็กสุดเป็นที่น่าสังเกตว่าเชื้อ C. meleagridis และ C. muris พบในเด็กที่มีการติดเชื้อเอชไอวีส่วน C. parvum human genotype พบมากในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี แสดงว่าการแพร่กระจายระหว่างคนนั้นมีความสำคัญในกลุ่มผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทยนอก จากนี้ในกลุ่มอายุที่แตกต่างกันจะพบการติดเชื้อจากสปีชีส์ ที่ต่างกัน และ/หรือ จากแหล่งที่มาของเชื้อที่ ต่างกัน

ภาควิชา	ปรสิตวิทยา
สาขาวิชา	ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
ปีการศึกษา	2543

ลายมือชื่อนิสิต	3ेला भा	เ ลียที่คน ย	
ลายมือชื่ออาจาร	ย์ที่ปรึกษา	Man	
ลายมือชื่ออาจาร	ย์ที่ปรึกษาร่วม	٠	

4275246830: MAJOR MEDICAL PARASITOLOGY

KEY WORD: CRYPTOSPORIDIUM PARVUM / SEQUENCE / HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS / SMALL SUBUNIT RIBOSOMAL RNA

RATTANA TIENGTIP: GENETIC ANALYSIS OF *CRYPTOSPORIDIUM* FROM HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS-INFECTED PATIENS IN KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL BY DNA SEQUENCING.

THESIS ADVISOR: ASSOC. PROF. SOMCHAI JONGWUTIWES, M.D., Ph.D. 73 pp. ISBN 974-13-0889-2

Cryptosporidiosis, an infectious disease caused by a coccidian protozoa in the genus Cryptosporidium, has been recognized increasingly among immunocompromised patients, especially those infected with human immunodeficiency virus (HIV). At present, 10 species of Cryptosporidium have been considered to be valid based on host range, oocyst morphology, predilection site of infection and molecular analysis. Since no effective anti-cryptosporidial agents are available, prevention and control of disease transmission are of primary importance. To date, little has been known regarding species of Cryptosporidium infecting HIV-infected individuals. Therefore, 30 isolates of Cryptosporidium from diarrheal stools of HIV-infected patients attending King Chulalongkorn Memorial Hospital during 1996-2000 were recruited for analysis. All of these patients suffered from chronic diarrhea and had low level of CD4+ lymphocytes (mean \pm SD = 103.72 \pm 134.20). After sugar flotation, Cryptosporidium DNA was purified from each isolate by proteinase K digestion followed by phenol/chloroform extraction. Amplification of a polymorphic region encompassing 670 bp of the small subunit ribosomal RNA (SSU rRNA) gene was performed by nested polymerase chain reaction (PCR). Direct sequencing of the amplified DNA was determined from both directions. Results have shown that 4 species of Cryptosporidium were identified, i.e, C. parvum (human genotype), C. meleagridis, C. muris and C. felis occuring in 25, 3, 1 and 1 isolates, respectively. Oocysts of C. meleagridis and C. parvum are indistinguishable based on their dimensions. However, C. muris possesses a significantly larger oocysts dimension than those of other species while oocysts of C. felis are the smallest. It is of note that only C. meleagridis and C. muris were found in HIV-infected children whereas C. parvum (human genotype) predominates among HIV-infected adults. These findings suggest that anthroponotic transmission plays an important role among HIV-infected adults and that different age groups of HIV-infected Thai patients are vulnerable to infection from different species of Cryptosporidium and/or from different sources.

Department	Parasitology	Student's signatureวิดาหา
Field of study	Medical Parasitlogy	Advisor's signature
Academic year		Co- Advisor's signature



กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งในความ
กรุณาของ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สมชาย จงวุฒิเวศย์ อาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาปรสิต
วิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือให้ความรู้ความ
เข้าใจ ข้อแนะนำในการแก้ปัญหาต่างๆ ตลอดจนการแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ในการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้มาด้วยดีตลอด ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา จินดามพร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ สิทธิเจริญชัย ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ และช่วยแก้ไข วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

กราบขอบพระคุณ หัวหน้าสถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิกที่สนับสนุนการลาศึกษา ต่อในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกท่านที่ได้เอื้อเฟื้อช่วยเหลือในด้านสถานที่ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ใน

ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่แผนกโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้ความเอื้อเฟื้อในการถ่ายภาพ และสไลด์ผลการวิจัย

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนงานวิจัยจากบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และทุนอุดหนุนส่งเสริมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท-เอก ในสถาบันอุดมศึกษาของ รัฐ ทบวงมหาวิทยาลัย

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และพี่ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและเป็นกำลังใจมาโดยตลอด

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	٩
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ବ
กิตติกรรมประกาศ	2
สารบัญ	ข
สารบัญตาราง	ฃ
สารบัญภาพ	ខា
คำย่อ	ល្ង
บทที่	
1. ความสำคัญและที่มาของปัญหา	1
2. สอบสวนเอกสาร	5
3. วิธีดำเนินการวิจัย	26
4. ผลการทดลอง	38
5. วิจารณ์ผลการทดลอง	58
รายการอ้างอิง	62
ภาคผนวก	70
ประวัติผู้เขียน	73

สารบัญตาราง

ุกา	รางที่	หน้า
	1. แสดงผลการทดลองการเกิดการติดต่อของเชื้อ Cryptosporidium ระหว่างโฮสต์ต่างๆ	
	(cross-transmission)	9
	2. แสดงการระบาดของเชื้อ Cryptosporidium จากแหล่งน้ำต่างๆ	23
	3. แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	39
	4. แสดงผลการตรวจทางโลหิตวิทยา และปริมาณ CD4+ และ CD8+ Lymphocyte	41
	5. แสดงอาการแทรกซ้อนและการตรวจพบเชื้ออื่นๆ ร่วมด้วย	42
	6. แสดงอาการที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์	43
	7. แสดงขนาดของ oocvst จากการวัด 30 oocvst ในแต่ละตัวอย่าง	47

สารบัญภาพ

รูปจ์	ที่	ู้ใ
	1. วงชีวิตของเชื้อ Cryptosporidium spp. 24	
	2. แสดงโครงสร้างของ dRhodamine dye terminators	
	3. แสดงตัวอย่างลักษณะ oocyst ของ <i>Cryptosporidium</i> จากผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส HIV	
	ย้อมด้วยสี modifed Kinyoun acid fast	
	4. แสดงตัวอย่าง oocyst ของ <i>Cryptosporidium</i> ที่แยกออกจากอุจจาระ โดยวิธี	
	Sheather sugar flotation	
	5. แสดงผลิตผล PCR รอบแรกบนอะกาโรสเจล 15 ตัวอย่างแรกความเข้มข้นร้อยละ 2 48	
	6. แสดงผลิตผล PCR รอบสองบนอะกาโรสเจล 15 ตัวอย่างแรกความเข้มข้นร้อยละ 2 48	
	7. แสดงผลิตผล PCR รอบแรกบนอะกาโรสเจล 15 ตัวอย่างหลังความเข้มข้นร้อยละ 2 49	
	8. แสดงผลิตผล PCR รอบสองบนอะกาโรสเจล 15 ตัวอย่างหลังความเข้มข้นร้อยละ 2 49	
	9. แสดงตัวอย่างของ electropherogram จากการใช้ primer P3	
	10. แสดงตัวอย่างของ electropherogram จากการใช้ primer P4	
	11. แสดงผลการวิเคราะห์การเรียงลำดับเบสของ DNA ในส่วน SSU rRNA gene ของเชื้อ	
	Cryptosporidium ในแต่ละตัวอย่าง53	
	12. แสดงผลการวิเคราะห์การเรียงลำดับเบสของ DNA ในส่วน SSU rRNA gene ของเชื้อ	
	Cryptosporidium ในแต่ละตัวอย่างเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อื่น	
	13. แสดงผลการวิเคราะห์การเรียงลำดับเบสของ DNA ในส่วน SSU rRNA gene ของเชื้อ	
	Cryptosporidium ในแต่ละตัวอย่างเปรียบเทียบกับสายพันธุ์	
	Cryptosporidium parvum57	

คำย่อ

bp = basepair

°C = degree celsius

DNA = deoxyribonucleic acid

Kda = Kilodalton

Kb = Kilobase

Mb = Megabase

mI = millilitre

mM = millimolar

PCR = polymerase chain reaction

RNA = ribonucleic acid

S = Svedberg unit

spp = species

SSU rRNA = small subunit ribosomal RNA

UV = ultraviolet

 μ I = microlitre

TX = Taxas

UK = United Kingdom

US = United States

OR = Oregon