

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

n	แทน	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
mean	แทน	คะแนนเฉลี่ย
SD	แทน	ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t	แทน	ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาในการแจกแจงค่าที (t – Distribution)
F	แทน	ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาในการแจกแจงค่าเอฟ (F – Distribution)

ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นลำดับดังนี้

- ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของพระภิกษุสงฆ์
- ตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์
- ตอนที่ 3 วิเคราะห์กลุ่มอาการทางสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์ตามตัวแปรต่าง ๆ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพระภิกษุสงฆ์

ตารางที่ 2 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของพระภิกษุสงฆ์

ตัวแปรที่ศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
1. อายุ (ปี)		
21-25 ปี	328	36.4
26-40 ปี	347	38.6
41-60 ปี	225	25.0
2. เชื้อชาติ		
ไทย	883	98.1
จีน	8	0.9
ลาว	7	0.8
มอญ	2	0.2
3. สถานภาพสมรส (ก่อนบวช)		
โสด	748	83.1
แต่งงานอยู่ด้วยกัน	67	7.4
แต่งงานแยกกันอยู่	28	3.1
หย่าร้าง	33	3.3
หม้าย	24	2.7
4. รายได้ของครอบครัวก่อนบวช (บาท ต่อเดือน)		
ต่ำกว่า 5,000	481	53.4
5,000 - 10,000	322	35.8
10,000 – 50,000	80	8.9
50,000 ขึ้นไป	17	1.9

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ตัวแปรที่ศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
5. การประกอบอาชีพ (ก่อนบวช)		
นักเรียน – นักศึกษา	249	27.7
พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานเอกชน	85	9.4
ค้าขาย	82	9.1
ข้าราชการ	24	2.7
เกษตรกร	198	22.0
รับจ้างทั่วไป	208	23.1
ไม่ได้ประกอบอาชีพ	54	6.0
6. ภูมิลำเนาเดิม		
กรุงเทพมหานคร	329	36.6
ต่างจังหวัด	571	63.4
7. โรคทางกาย		
ไม่มี	686	76.2
มี	214	23.8
8. ระดับการศึกษา (ก่อนบวช)		
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า	425	47.2
มัธยมศึกษาตอนต้น	202	22.4
มัธยมศึกษาตอนปลาย	154	17.1
ป.ว.ช.	45	5.0
ป.ว.ศ.	41	4.6
ปริญญาตรี	29	3.2
อื่นๆ	4	0.4

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า พระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ระหว่าง 26-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.4 สำหรับกลุ่มอายุ 41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 25 มีอายุเฉลี่ย 33.13 ปี

เชื้อชาติส่วนใหญ่มีเชื้อชาติไทย คิดเป็นร้อยละ 98.1 รองลงมา คือ เชื้อชาติจีนและลาว คิดเป็นร้อยละ 0.9 และ 0.8 ตามลำดับ

สถานภาพสมรส (ก่อนบวช) ส่วนใหญ่เป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 83.1 รองลงมา คือ แต่งงานอยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 7.4 และสถานภาพสมรสหม้าย มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.7

รายได้ต่อเดือนทั้งครอบครัว (ก่อนบวช) ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 53.4 รองลงมา คือ รายได้อยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาทต่อเดือนและระหว่าง 10,000-50,000บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ35.8 และร้อยละ8.9 ตามลำดับ

การประกอบอาชีพ (ก่อนบวช) ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน-นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 27.7 รองลงมา ได้แก่ อาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 22.0 สำหรับอาชีพข้าราชการ พบน้อยที่สุด เพียงร้อยละ1.9

ภูมิลำเนาเดิมส่วนใหญ่พระภิกษุสงฆ์มีภูมิลำเนาอยู่ที่ต่างจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 63.4 ส่วนมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่กรุงเทพมหานครมีเพียง ร้อยละ36.6

โรคทางกาย ส่วนใหญ่มีโรคทางกาย คิดเป็นร้อยละ 23.8

ระดับการศึกษา (ก่อนบวช) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า คิดเป็นร้อยละ 47.2 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 22.4 และ 17.1 ตามลำดับ

ตารางที่ 3 แสดงเหตุผลของการบวช

เหตุผลที่บวช	จำนวน	ร้อยละ
เพื่อทดแทนคุณบิดามารดาหรือผู้มีพระคุณ	414	46.0
เพื่อสละทางโลก	54	6.0
เปิดโอกาสให้ได้มีการศึกษาที่สูงขึ้น	192	21.3
เพื่อต้องการศึกษารธรรมให้ลึกซึ้ง	147	16.3
บวชตามประเพณี	64	7.1
อื่นๆ ระบุ	29	3.2
รวม	900	100

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่บวชของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่บวชเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาหรือผู้มีพระคุณ มากที่สุด ซึ่งมี ร้อยละ 46.0 รองลงมาคือ เพื่อเปิดโอกาสให้ได้มีการศึกษาที่สูงขึ้น ซึ่งมี ร้อยละ 21.3 ส่วนเหตุผลอื่น ๆ ที่พบ อาทิเช่น บวชเพื่อแก้บน บวชเพราะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง

ตารางที่ 4 แสดงถึงจำนวนพรรษาที่บวช (ปี)

จำนวนพรรษาที่บวช (ปี)	จำนวน	ร้อยละ
1-5	554	60.4
6-10	152	16.9
11-20	130	14.4
21 ขึ้นไป	74	8.2
รวม	900	100

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าพระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่มีจำนวนพรรษาที่บวชอยู่ระหว่าง 1-5 ปี ซึ่งพบร้อยละ 60.4 รองลงมา คือ อยู่ระหว่าง 6-10 ปี และ 11-20 ปี ซึ่งพบร้อยละ 16.9 และ 14.4 ตามลำดับ และน้อยที่สุดคือ พระภิกษุสงฆ์ที่มีจำนวนพรรษา 21ปีขึ้นไป มีเพียงร้อยละ 8.2 เท่านั้น

ตารางที่ 5 แสดงถึงสถานภาพของสงฆ์

สถานภาพของสงฆ์	จำนวน	ร้อยละ
เจ้าอาวาส	27	3.0
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	21	2.3
รองเจ้าอาวาส	6	0.7
ผู้ช่วยรองเจ้าอาวาส	5	0.6
พระลูกวัด	841	93.4
รวม	900	100

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีสถานภาพของสงฆ์เป็นพระลูกวัด มากที่สุด คือ ร้อยละ 93.4 รองลงมา คือ พระภิกษุสงฆ์ที่มีสถานภาพของสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส ซึ่งมีร้อยละ 3 และร้อยละ 2.3 ตามลำดับ และน้อยที่สุด คือ พระภิกษุสงฆ์ที่มีสถานภาพของสงฆ์เป็นผู้ช่วยรองเจ้าอาวาส มีเพียง ร้อยละ 0.6

ตารางที่ 6 แสดงถึงการศึกษาศักยภาพแผนกธรรมของพระภิกษุสงฆ์

การศึกษาศักยภาพแผนกธรรม	จำนวน	ร้อยละ
นักธรรมตรี	189	21.0
นักธรรมโท	73	8.1
นักธรรมเอก	484	53.8
ไม่ได้เข้ารับการศึกษาศักยภาพ	154	17.1
รวม	900	100

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าพระภิกษุสงฆ์มีระดับการศึกษาศักยภาพแผนกธรรมระดับนักธรรมเอก มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมา คือ พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาศักยภาพแผนกธรรมระดับนักธรรมตรี และไม่ได้เข้ารับการศึกษาศักยภาพ ร้อยละ 21.0 และ 17.1 ตามลำดับ และน้อยที่สุด คือ พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาศักยภาพแผนกธรรมระดับนักธรรมโท ร้อยละ 8.1

ตารางที่ 7 แสดงถึงการศึกษาศรีธรรมแผนกบาลีของพระภิกษุสงฆ์

การศึกษาศรีธรรมแผนกบาลี	จำนวน	ร้อยละ
บาลีประโยค 1-2	92	10.2
เปรียญธรรม 3 ประโยค	54	6.0
เปรียญธรรม 4 ประโยค	80	8.9
เปรียญธรรม 5 ประโยค	62	6.9
เปรียญธรรม 6 ประโยค	69	7.7
เปรียญธรรม 7 ประโยค	52	5.8
เปรียญธรรม 8 ประโยค	5	0.6
เปรียญธรรม 9 ประโยค	9	1.0
ไม่ได้เข้ารับการศึกษาศรีธรรม	477	53.0
รวม	900	100

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่าพระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาศรีธรรมแผนกบาลี มีถึง ร้อยละ 53.0 รองลงมา คือ พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาศรีธรรมแผนกบาลีระดับบาลีประโยค 1- 2 และเปรียญธรรม 4 ประโยค มีร้อยละ 10.2 และ ร้อยละ 8.9 ตามลำดับ และเปรียญธรรม 8 ประโยค มีจำนวนน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 0.6

ตารางที่ 8 แสดงถึงการใช้ยาและสารเสพติดของพระภิกษุสงฆ์ (ก่อนบวช)

การใช้ยาและสารเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
ไม่ใช้	562	62.4
ใช้	338	37.6
รวม	900	100

ตารางที่ 9 แสดงถึงยาและสารเสพติดที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ (ก่อนบวช)

ประเภทของ * สารเสพติด	ไม่ใช้		ใช้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ยาแก้ปวด	810	90.0	90	10.0
2. ยานอนหลับ	892	99.1	8	0.9
3. ยาขยันหรือยาบ้า	884	98.2	16	1.8
4. เครื่องดื่มหรือสารชูกำลัง	814	90.4	86	9.6
5. เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์	849	94.3	51	5.7
6. อื่น ๆ ระบุ	887	98.6	13	1.4

หมายเหตุ * หมายถึง ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นถึงการใช้ยาและสารเสพติดของพระภิกษุสงฆ์ (ก่อนบวช) มากที่สุด คือ ยาแก้ปวด ซึ่งมี ร้อยละ 10 รองลงมา คือ เครื่องดื่มหรือสารชูกำลัง เช่น ลิโพ กระทั่งแดง และเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ มีร้อยละ 9.6 และร้อยละ 5.7 ตามลำดับ ที่พบน้อยที่สุด คือ การใช้นอนหลับ มีเพียงร้อยละ 0.9

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์
 ตารางที่ 10 จำนวนและร้อยละของพระภิกษุสงฆ์ จำแนกตาม ประเภทของสุขภาพจิต

ประเภทของสุขภาพจิต	จำนวน	ร้อยละ
ปกติ	595	66.11
มีปัญหาสุขภาพจิต	305	33.89
รวม	900	100

จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่า พระภิกษุสงฆ์ส่วนมากมีสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ คือ มีคะแนนเฉลี่ยของปัญหาสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ปกติทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 66.11 และพระภิกษุสงฆ์ที่มีปัญหาสุขภาพจิต คือค่าคะแนนเฉลี่ยของปัญหาสุขภาพจิตสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อย 1 ด้านขึ้นไปมี ร้อยละ 33.89

ตารางที่ 11 แสดงกลุ่มอาการที่พบในพระภิกษุสงฆ์ที่มีปัญหาสุขภาพจิต

กลุ่มอาการ	สูงกว่าเกณฑ์ปกติ	
	จำนวน	ร้อยละ
1. ความรู้สึกว่ามีอาการทางกาย	112	36.72
2. การย่ำคิดย่ำทำ	91	29.83
3. ความรู้สึกไม่กล้าติดต่อกับบุคคลอื่น	81	26.50
4. ความซึมเศร้า	106	34.75
5. ความวิตกกังวล	28	9.18
6. ความรู้สึกไม่เป็นมิตร	90	29.51
7. ความรู้สึกกลัวโดยไม่มีสาเหตุ	137	44.92
8. ความคิดระแวง	106	34.75
9. พฤติกรรมและความคิดที่บ่งชี้ถึงอาการของโรคจิต	154	50.49

จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีปัญหาสุขภาพจิต 305 รูป มีปัญหาสุขภาพจิต ด้านพฤติกรรมและความคิดที่บ่งชี้ถึงอาการของโรคจิต มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.49 รองลงมา คือ ปัญหาสุขภาพจิต ด้านความกลัวโดยไม่มีเหตุผลและด้านความรู้สึกว่ามีอาการทางกาย คิดเป็นร้อยละ 44.92 และ 36.72 ตามลำดับ และปัญหาสุขภาพจิตด้านความวิตกกังวล พบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.18

ตอนที่ 3 วิเคราะห์กลุ่มอาการทางสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์ตามตัวแปรต่าง ๆ
 ตารางที่ 12 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิต ของพระภิกษุสงฆ์จำแนกตามอายุ

กลุ่มอาการ	อายุ (ปี)			21- 25			26 – 40			41 – 60			F
	n	mean	SD	n	mean	SD	n	mean	SD				
1.ความรู้สึกว่ามีอาการทางกาย	328	0.65	0.53	347	0.67	0.51	225	0.75	0.63	2.11			
2.การย่ำคิด ย่ำทำ	328	1.13	0.59	347	1.11	0.57	225	1.02	0.64	2.39			
3.ความรู้สึกไม่กล้าติดต่อกับบุคคลอื่น	328	1.06	0.59	347	1.02	0.60	225	0.85	0.70	7.66**			
4.ความซึมเศร้า	328	0.88	0.50	347	0.83	0.53	225	0.73	0.48	5.81**			
5.ความวิตกกังวล	328	0.81	0.54	347	0.73	0.54	225	0.63	0.53	7.80**			
6.ความรู้สึกไม่เป็นมิตร	328	0.79	0.61	347	0.75	0.54	225	0.61	0.54	7.03**			
7.ความรู้สึกกลัวโดยไม่มีสาเหตุ	328	0.73	0.54	347	0.68	0.53	225	0.61	0.55	3.16			
8.ความคิดระแวง	328	0.95	0.64	347	0.87	0.66	225	0.79	0.67	4.14			
9.พฤติกรรมและความคิดที่บ่งชี้ถึงอาการของโรคจิต	328	0.85	0.57	347	0.75	0.55	225	0.58	0.53	15.47**			

** p < 0.005

จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิต ด้านความรู้สึกไม่กล้าติดต่อกับบุคคลอื่น ด้านความซึมเศร้า ด้านความวิตกกังวล ด้านความรู้สึกไม่เป็นมิตร และด้านพฤติกรรมและความคิดที่บ่งชี้ถึงอาการของโรคจิต ของพระภิกษุสงฆ์ เมื่อจำแนกตาม อายุ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 ส่วนคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตด้านอื่น ๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005

ตารางที่ 13 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิต ด้านความรู้สึกรู้สึกไม่กล้าติดต่อกับบุคคลอื่น ระหว่างพระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุแตกต่างกัน โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)

อายุ (ปี)		41-60	26-40	21-25
	mean	0.85	1.02	1.06
41-60	0.85	-	0.17	0.21**
26-40	1.02		-	0.04

**p < 0.005

จากตารางที่ 13 แสดงให้เห็นว่า พระภิกษุสงฆ์กลุ่มอายุ 21-25 ปี มีค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิต ด้านความรู้สึกรู้สึกไม่กล้าติดต่อกับบุคคลอื่น สูงกว่า พระภิกษุสงฆ์กลุ่มอายุ 41-60 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005

ตารางที่ 14 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิต ด้านความซึมเศร้า ระหว่างพระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุแตกต่างกัน โดยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe)

อายุ (ปี)		41-60	26-40	21-25
	mean	0.73	0.83	0.88
41-60	0.73	-	0.10	0.15**
26-40	0.83		-	0.05

**p < 0.005

จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็นว่า พระภิกษุสงฆ์กลุ่มอายุ 21-25 ปี มีค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิต ด้านความซึมเศร้า สูงกว่า พระภิกษุสงฆ์กลุ่มอายุ 41-60 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005

ตารางที่ 15 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิต ด้านความวิตกกังวล ระหว่างพระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุแตกต่างกัน โดยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe)

อายุ (ปี)		41-60	26-40	21-25
	mean	0.63	0.73	0.81
41-60	0.63	-	0.10	0.18**
26-40	0.73		-	0.08

**p < 0.005

จากตารางที่ 15 แสดงให้เห็นว่า พระภิกษุสงฆ์กลุ่มอายุ 21-25 ปี มีค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิต ด้านความวิตกกังวล สูงกว่า พระภิกษุสงฆ์กลุ่มอายุ 41-60 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิต ด้านความรู้สึกไม่
เป็นมิตร ระหว่างพระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุแตกต่างกัน โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)

อายุ (ปี)		41 -60	26-40	21-25
	mcan	0.61	0.75	0.79
41-60	0.61	-	0.14	0.18**
26-40	0.75		-	0.04

** p < 0.005

จากตารางที่ 16 แสดงให้เห็นว่า พระภิกษุสงฆ์กลุ่มอายุ 21-25 ปี มีค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิต ด้านความรู้สึกไม่เป็นมิตร สูงกว่า พระภิกษุสงฆ์กลุ่มอายุ 41-60 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005

ตารางที่ 17 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิต ด้านพฤติกรรมและความคิดที่บ่งชี้ถึงอาการของโรคจิต ระหว่างพระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุแตกต่างกัน โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)

อายุ (ปี)		41 -60	26-40	21-25
	mean	0.58	0.75	0.85
41-60	0.58	-	0.17**	0.27**
26-40	0.75		-	0.10

** p < 0.005

จากตารางที่ 17 แสดงให้เห็นว่า พระภิกษุสงฆ์กลุ่มอายุ 21-25 ปี และกลุ่มอายุ 26-40 ปี มีค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิต ด้านพฤติกรรมและความคิดที่บ่งชี้ถึงอาการของโรคจิต สูงกว่าพระภิกษุสงฆ์กลุ่มอายุ 41-60 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005

ตารางที่ 18 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์ จำแนกตาม
สถานภาพ สมรส (ก่อนบวช)

กลุ่มอาการ	สถานภาพสมรส (ก่อนบวช)			โสด			คู่			หม้าย/หย่าร้าง/ แยกกันอยู่			F
	n	mean	SD	n	mean	SD	n	mean	SD	n	mean	SD	
1.ความรู้สึกว่ามีอาการทางกาย	748	0.65	0.50	67	0.73	0.61	85	0.94	0.78	11.93**			
2.การย่ำคิด ย่ำทำ	748	1.09	0.58	67	0.98	0.58	85	1.22	0.77	3.21			
3.ความรู้สึกไม่กล้าติดต่อกับบุคคลอื่น	748	1.00	0.58	67	0.84	0.67	85	1.07	0.88	2.69			
4.ความซึมเศร้า	748	0.82	0.49	67	0.76	0.60	85	0.91	0.61	1.85			
5.ความวิตกกังวล	748	0.73	0.52	67	0.68	0.55	85	0.82	0.69	1.37			
6.ความรู้สึกไม่เป็นมิตร	748	0.73	0.55	67	0.70	0.65	85	0.75	0.64	0.13			
7.ความรู้สึกกลัวโดยไม่มีสาเหตุ	748	0.68	0.52	67	0.60	0.57	85	0.78	0.66	2.16			
8.ความคิดระแวง	748	0.88	0.65	67	0.79	0.66	85	0.97	0.77	1.43			
9.พฤติกรรมและความคิดที่บ่งชี้ถึง อาการของโรคจิต	748	0.75	0.54	67	0.59	0.60	85	0.77	0.68	2.83			

**p < 0.005

จากตารางที่ 18 แสดงให้เห็นว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิต ด้านความรู้สึกว่ามีอาการทางกาย ของพระภิกษุสงฆ์ จำแนกตาม สถานภาพสมรส (ก่อนบวช) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 ส่วนคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตด้านอื่น ๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005

ตารางที่ 19 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิต ด้านความรู้สึกรู้สึกว่ามีอาการทางกาย ระหว่างพระภิกษุสงฆ์ที่มีสถานภาพสมรส (ก่อนบวช) แยกกัน โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)

สถานภาพสมรส (ก่อนบวช)		โสด	คู่	หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
	mean	0.65	0.73	0.94
โสด	0.65	-	0.08	0.29**
คู่	0.73		-	0.21

**p < 0.005

จากตารางที่ 19 แสดงให้เห็นว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีสถานภาพสมรส (ก่อนบวช) แยกกัน มีกลุ่มอาการทางสุขภาพจิต ด้านความรู้สึกรู้สึกว่ามีอาการทางกาย แยกกัน โดยพระภิกษุสงฆ์ที่มีสถานภาพสมรส (ก่อนบวช) หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิต ด้านความรู้สึกรู้สึกว่ามีอาการทางกาย สูงกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีสถานภาพสมรส (ก่อนบวช) โสด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005

ตารางที่ 20 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์ จำแนกตามรายได้ของครอบครัว (ก่อนบวช)

รายได้ครอบครัว (บาท ต่อ เดือน)	0-5,000			5,000-10,000			10,000 ขึ้นไป			F
	n	mean	SD	n	mean	SD	n	mean	SD	
1.ความรู้สึกว่ามีอาการทางกาย	481	0.71	0.56	322	0.66	0.54	97	0.61	0.49	1.60
2.การย่ำคิด ย้ำทำ	481	1.15	0.62	322	1.06	0.58	97	0.93	0.56	5.92**
3.ความรู้สึกไม่กล้าติดต่อกับบุคคลอื่น	481	1.03	0.67	322	0.95	0.56	97	0.92	0.58	2.40
4.ความซึมเศร้า	481	0.87	0.53	322	0.76	0.47	97	0.80	0.56	3.90
5.ความวิตกกังวล	481	0.77	0.57	322	0.71	0.52	97	0.63	0.46	3.01
6.ความรู้สึกไม่เป็นมิตร	481	0.77	0.58	322	0.71	0.55	97	0.65	0.54	2.36
7.ความรู้สึกกลัวโดยไม่มีสาเหตุ	481	0.72	0.56	322	0.64	0.51	97	0.63	0.50	2.65
8.ความคิดระแวง	481	0.90	0.67	322	0.87	0.65	97	0.81	0.65	0.72
9.พฤติกรรมและความคิดที่บ่งชี้ถึง อาการของโรคจิต	481	0.77	0.58	322	0.72	0.56	97	0.67	0.51	1.50

**p < 0.005

จากตารางที่ 20 แสดงให้เห็นว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิต ด้านการย่ำคิดย้ำทำของพระภิกษุสงฆ์ จำแนกตามรายได้ของครอบครัว (ก่อนบวช) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 ส่วนคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตด้านอื่น ๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005

ตารางที่ 21 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตด้านการย่ำคิดย่ำทำระหว่าง พระภิกษุสงฆ์ที่มีรายได้ของครอบครัว (ก่อนบวช) แตกต่างกัน โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)

รายได้ครอบครัว (ก่อนบวช)		10,000 ขึ้นไป	5,000-10,000	ต่ำกว่า 5,000
	mean	0.93	1.06	1.15
10,000 ขึ้นไป	0.93	-	0.13	0.22 **
5,000-10,000	1.06		-	0.09

** p < 0.005

จากตารางที่ 21 แสดงให้เห็นว่าพระภิกษุสงฆ์ที่มีรายได้ของครอบครัว (ก่อนบวช) แตกต่างกัน มีกลุ่มอาการทางสุขภาพจิต ด้านการย่ำคิดย่ำทำ แตกต่างกัน โดยพระภิกษุสงฆ์ที่มีรายได้ของครอบครัว (ก่อนบวช) ต่ำกว่า 5,000 บาท มีค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตด้านการย่ำคิดย่ำทำ สูงกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีรายได้ของครอบครัว (ก่อนบวช) 10,000 บาทขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005

ตารางที่ 22 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์ จำแนกตาม ภูมิภาคตาม ภูมิภาคตาม

กลุ่มอาการ	ภูมิภาคตาม			ต่างจังหวัด			t
	n	mean	SD	n	mean	SD	
1.ความรู้สึกว่ามีอาการทางกาย	329	0.64	0.53	571	0.71	0.55	-1.88
2.การย่ำคิด ย่ำทำ	329	1.02	0.59	571	1.14	0.60	-2.79
3.ความรู้สึกไม่กล้าติดต่อกับบุคคลอื่น	329	0.89	0.65	571	1.05	0.60	-3.75**
4.ความซึมเศร้า	329	0.77	0.52	571	0.85	0.50	-2.40
5.ความวิตกกังวล	329	0.66	0.52	571	0.78	0.55	-3.19**
6.ความรู้สึกไม่เป็นมิตร	329	0.68	0.59	571	0.76	0.56	-2.01
7.ความรู้สึกกลัวโดยไม่มีสาเหตุ	329	0.58	0.50	571	0.74	0.56	-4.53**
8.ความคิดระวาง	329	0.85	0.67	571	0.90	0.65	-1.06
9.พฤติกรรมและความคิดที่บ่งชี้ถึงอาการของโรคจิต	329	0.68	0.60	571	0.78	0.54	-2.52

** p < 0.005

จากตารางที่ 22 แสดงให้เห็นว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิต ด้านความรู้สึกไม่กล้าติดต่อกับบุคคลอื่น ด้านความวิตกกังวล และด้านความรู้สึกกลัวโดยไม่มีสาเหตุของพระภิกษุสงฆ์ เมื่อจำแนกตามภูมิภาคตาม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 โดยภูมิภาคตาม อยู่ต่างจังหวัดมีคะแนนเฉลี่ยด้านต่างๆ สูงกว่า ภูมิภาคตาม อยู่กรุงเทพมหานคร ส่วนคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตด้านอื่น ๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005

ตารางที่ 23 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์ จำแนกตาม การมีโรคทางกาย

การมีโรคทางกาย กลุ่มอาการ	ไม่มี			มี			t
	n	mean	SD	n	mean	SD	
1.ความรู้สึกว่ามีอาการทางกาย	686	0.60	0.51	214	0.94	0.57	-8.18**
2.การย่ำคิด ย่ำทำ	686	1.06	0.60	214	1.21	0.58	-3.33**
3.ความรู้สึกไม่กล้าติดต่อกับบุคคลอื่น	686	0.97	0.62	214	1.04	0.63	-1.33
4.ความซึมเศร้า	686	0.81	0.52	214	0.87	0.49	-1.67
5.ความวิตกกังวล	686	0.70	0.54	214	0.83	0.55	-2.98**
6.ความรู้สึกไม่เป็นมิตร	686	0.72	0.57	214	0.78	0.55	-1.51
7.ความรู้สึกกลัวโดยไม่มีสาเหตุ	686	0.67	0.52	214	0.73	0.60	-1.58
8.ความคิดระแวง	686	0.86	0.66	214	0.94	0.67	-1.54
9.พฤติกรรมและความคิดที่บ่งชี้ถึงอาการของโรคจิต	686	0.74	0.57	214	0.76	0.54	-0.46

**p < 0.005

จากตารางที่ 23 แสดงให้เห็นว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิต ด้านความรู้สึกว่ามีอาการทางกาย ด้านการย่ำคิดย่ำทำ และด้านความวิตกกังวล ของพระภิกษุสงฆ์ จำแนกตาม การมีโรคทางกาย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 โดยพระภิกษุสงฆ์ที่มีโรคทางกาย จะมีคะแนนเฉลี่ยด้านต่าง ๆ เหล่านี้ สูงกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่ไม่มีโรคทางกาย ส่วนคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตด้านอื่น ๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005

ตารางที่ 24 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์จำแนกตามการใช้ยาและสารเสพติด (ก่อนบวช)

การใช้ยาและสารเสพติด กลุ่มอาการ	ไม่ใช้			ใช้			t
	n	mean	SD	n	mean	SD	
1.ความรู้สึกว่ามีอาการทางกาย	562	0.63	0.52	338	0.76	0.57	-3.58**
2.การย่ำคิด ย่ำทำ	562	1.05	0.57	338	1.17	0.65	-2.80
3.ความรู้สึกไม่กล้าติดต่อกับบุคคลอื่น	562	0.98	0.63	338	1.01	0.62	-0.76
4.ความซึมเศร้า	562	0.80	0.47	338	0.87	0.57	-1.96
5.ความวิตกกังวล	562	0.70	0.51	338	0.78	0.59	-2.10
6.ความรู้สึกไม่เป็นมิตร	562	0.70	0.54	338	0.78	0.61	-2.06
7.ความรู้สึกกลัวโดยไม่มีสาเหตุ	562	0.68	0.52	338	0.69	0.57	-0.50
8.ความคิดระแวง	562	0.85	0.64	338	0.93	0.69	-1.88
9.พฤติกรรมและความคิดที่บ่งชี้ถึงอาการของโรคจิต	562	0.73	0.52	338	0.76	0.62	-0.89

** p < 0.005

จากตารางที่ 24 แสดงให้เห็นว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิต ด้านความรู้สึกว่ามีอาการทางกาย ของพระภิกษุสงฆ์ จำแนกตามการใช้ยาและสารเสพติด (ก่อนบวช) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 โดยพระภิกษุสงฆ์ที่มีการใช้ยาและสารเสพติด (ก่อนบวช) จะมีคะแนนเฉลี่ยด้านต่าง ๆ เหล่านี้ สูงกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่ไม่ได้ใช้ยาและสารเสพติด (ก่อนบวช) ส่วนคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตด้านอื่น ๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.005

ตารางที่ 25 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์ จำแนกตามระดับการศึกษา (ก่อนบวช)

ระดับการศึกษา(ก่อนบวช) กลุ่มอาการ	ประถมศึกษา			มัธยมศึกษา			ป.ว.ช - ป.ว.ส.			ปริญญาตรี ขึ้นไป			F
	n	mean	SD	n	mean	SD	n	mean	SD	n	mean	SD	
1.ความรู้สึกว่ามีอาการทางกาย	425	0.72	0.55	356	0.66	0.56	86	0.63	0.50	33	0.53	0.46	2.11
2.การฆ่าเกิด ฆ่าทำ	425	1.13	0.59	356	1.08	0.62	86	1.08	0.54	33	0.77	0.50	4.02
3.ความรู้สึกไม่กล้าติดต่อกับบุคคลอื่น	425	1.03	0.66	356	0.97	0.59	86	0.97	0.58	33	0.84	0.60	1.30
4.ความขี้เมรัย	425	0.84	0.51	356	0.79	0.50	86	0.82	0.45	33	0.88	0.73	0.87
5.ความวิตกกังวล	425	0.76	0.55	356	0.73	0.56	86	0.72	0.48	33	0.55	0.43	1.65
6.ความรู้สึกไม่เป็นมิตร	425	0.74	0.54	356	0.74	0.60	86	0.74	0.56	33	0.55	0.60	1.19
7.ความรู้สึกกลัวโดยไม่มีสาเหตุ	425	0.73	0.57	356	0.65	0.51	86	0.63	0.52	33	0.56	0.48	2.54
8.ความคิดระวาง	425	0.86	0.65	356	0.90	0.68	86	0.97	0.65	33	0.72	0.54	1.33
9.พฤติกรรมและความคิดที่บ่งชี้ถึงอาการของโรคจิต	425	0.74	0.55	356	0.75	0.60	86	0.76	0.51	33	0.60	0.42	0.73

** p < 0.005

จากตารางที่ 25 แสดงให้เห็นว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตทุกด้าน ของพระภิกษุ
สงฆ์ จำแนกตามระดับการศึกษา (ก่อนบวช) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.005

ตารางที่ 26 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์ จำแนกตามการประกอบอาชีพ (ก่อนบวช)

การประกอบอาชีพ (ก่อนบวช) กลุ่มอาการ	ประกอบอาชีพ			ไม่ได้ประกอบอาชีพ			t
	n	mean	SD	n	mean	SD	
1.ความรู้สึกว่ามีอาการทางกาย	597	0.70	0.56	303	0.65	0.53	-1.32
2.การย่ำคิดย่ำทำ	597	1.08	0.61	303	1.11	0.58	0.67
3.ความรู้สึกไม่กล้าติดต่อกับบุคคลอื่น	597	0.94	0.61	303	1.09	0.64	3.28**
4.ความซึมเศร้า	597	0.79	0.53	303	0.88	0.48	2.29
5.ความวิตกกังวล	597	0.70	0.54	303	0.80	0.54	2.61
6.ความรู้สึกไม่เป็นมิตร	597	0.71	0.56	303	0.78	0.59	1.72
7.ความรู้สึกกลัวโดยไม่มีสาเหตุ	597	0.67	0.54	303	0.71	0.54	0.96
8.ความคิดระแวง	597	0.84	0.66	303	0.95	0.66	2.35
9.พฤติกรรมและความคิดที่ปองซีถึง อาการของโรคจิต	597	0.70	0.57	303	0.83	0.54	3.45**

** p < 0.005

จากตารางที่ 26 แสดงให้เห็นว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตด้านความรู้สึกไม่กล้าติดต่อกับบุคคลอื่น และด้านพฤติกรรมและความคิดที่ปองซีถึงอาการของโรคจิตของพระภิกษุสงฆ์ จำแนกตามการประกอบอาชีพ (ก่อนบวช) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 โดยพระภิกษุสงฆ์ที่ก่อนบวชไม่ได้ประกอบอาชีพ จะมีคะแนนเฉลี่ยด้านดังกล่าว สูงกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่ก่อนบวชมีการประกอบอาชีพ ส่วนคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตด้านอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005

ตารางที่ 27

เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์ จำแนกตาม จำนวนพรรษา (ปี)

กลุ่มอาการ	จำนวนพรรษา (ปี)			1-5			6-10			11-20			21 ขึ้นไป			F
	n	mean	SD	n	mean	SD	n	mean	SD	n	mean	SD				
1.ความรู้สึกว่ามีอาการทางกาย	544	0.68	0.56	152	0.69	0.53	130	0.70	0.54	74	0.65	0.47	0.18			
2.การย่ำคิดย่ำทำ	544	1.11	0.61	152	1.12	0.58	130	1.08	0.61	74	0.97	0.57	1.22			
3.ความรู้สึกลงใจกับคนอื่น	544	1.02	0.64	152	1.00	0.58	130	0.97	0.63	74	0.76	0.59	3.85			
4.ความซึมเศร้า	544	0.86	0.54	152	0.82	0.51	130	0.77	0.46	74	0.65	0.37	4.27			
5.ความวิตกกังวล	544	0.77	0.55	152	0.74	0.56	130	0.68	0.50	74	0.54	0.43	4.44			
6.ความรู้สึกไม่เป็นมิตร	544	0.76	0.60	152	0.74	0.55	130	0.70	0.50	74	0.56	0.42	2.80			
7.ความรู้สึกกลัวโดยไม่มีสาเหตุ	544	0.70	0.55	152	0.67	0.53	130	0.70	0.56	74	0.52	0.46	2.70			
8.ความกึดระแวง	544	0.92	0.67	152	0.84	0.66	130	0.84	0.66	74	0.73	0.60	2.25			
9.พฤติกรรมและความคิดที่บ่งชี้ถึงอาการของโรคจิต	544	0.78	0.58	152	0.75	0.60	130	0.69	0.48	74	0.49	0.41	6.39**			

** p < 0.005

จากตารางที่ 27 แสดงให้เห็นว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิต ด้านพฤติกรรมและความคิดที่บ่งชี้ถึงอาการของโรคจิต เมื่อจำแนกตาม จำนวนพรรษา พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 ส่วนคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตด้านอื่น ๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.005

ตารางที่ 28 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิต ด้านพฤติกรรมและความคิดที่บ่งชี้ถึงอาการของโรคจิต ระหว่างพระภิกษุสงฆ์ที่มีจำนวนพรรษาแตกต่างกัน โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)

จำนวนพรรษา (ปี)		21ขึ้นไป	11-20	6-10	1-5	
	mcan	0.49	0.69	0.75	0.78	
21 ขึ้นไป		0.49	-	0.20	0.26	0.29**
11-20		0.69	-	-	-	0.09
6-10		0.75		-	-	0.03

** p < 0.005

จากตารางที่ 28 แสดงให้เห็นว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีจำนวนพรรษา 1-5 ปี มีค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิต ด้านพฤติกรรมและความคิดที่บ่งชี้ถึงอาการของโรคจิต สูงกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีจำนวนพรรษา 21 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005

ตารางที่ 29 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์ จำแนกตาม การศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท

แผนกธรรม กลุ่มอาการ	เรียนปริญญาตรี-ปริญญาโท			ไม่ได้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท			t
	n	mean	SD	n	mean	SD	
1.ความรู้สึกว่ามีอาการทางกาย	746	0.69	0.55	154	0.66	0.55	0.57
2.การย่ำคิด ย้ำทำ	746	1.11	0.60	154	1.02	0.59	1.60
3.ความรู้สึกไม่กล้าติดต่อกับบุคคลอื่น	746	1.03	0.63	154	0.78	0.57	4.63**
4.ความซึมเศร้า	746	0.85	0.51	154	0.70	0.50	3.34**
5.ความวิตกกังวล	746	0.75	0.54	154	0.67	0.56	1.66
6.ความรู้สึกไม่เป็นมิตร	746	0.75	0.56	154	0.65	0.60	1.88
7.ความรู้สึกกลัวโดยไม่มีสาเหตุ	746	0.70	0.54	154	0.60	0.53	2.19
8.ความคิดระแวง	746	0.90	0.66	154	0.80	0.66	1.72
9.พฤติกรรมและความคิดที่บ่งชี้ถึงอาการของโรคจิต	746	0.77	0.57	154	0.61	0.52	3.18**

**p < 0.005

จากตารางที่ 29 แสดงให้เห็นว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิต ด้านความรู้สึกไม่กล้าติดต่อกับบุคคลอื่น ด้านความซึมเศร้า และด้านพฤติกรรมและความคิดที่บ่งชี้ถึงอาการของโรคจิต ของพระภิกษุสงฆ์ เมื่อจำแนกตามการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 ส่วนคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตด้านอื่น ๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005

ตารางที่30 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์ จำแนกตาม การศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลี

ปัญหาสุขภาพจิต	แผนกบาลี			ไม่ได้เข้ารับการศึกษ			t
	n	mean	SD	n	mean	SD	
1.ความรู้สึกว่ามีอาการทางกาย	423	0.69	0.55	477	0.67	0.54	0.56
2.การย่ำคิด ย่ำทำ	423	1.14	0.62	477	1.05	0.58	2.12
3.ความรู้สึกไม่กล้าติดต่อกับบุคคลอื่น	423	1.08	0.62	477	0.91	0.62	4.12**
4.ความซึมเศร้า	423	0.88	0.52	477	0.77	0.50	3.06**
5.ความวิตกกังวล	423	0.78	0.56	477	0.69	0.52	2.53
6.ความรู้สึกไม่เป็นมิตร	423	0.78	0.57	477	0.69	0.57	2.44
7.ความรู้สึกกลัวโดยไม่มีสาเหตุ	423	0.73	0.56	477	0.64	0.52	2.43
8.ความคิดระแวง	423	0.91	0.65	477	0.85	0.67	1.32
9.พฤติกรรมและความคิดที่บ่งชี้ถึงอาการของโรคจิต	423	0.80	0.55	477	0.69	0.57	2.87**

** p < 0.005

จากตารางที่30 แสดงให้เห็นว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิต ด้านความรู้สึกไม่กล้าติดต่อกับบุคคลอื่น ด้านความซึมเศร้า และด้านพฤติกรรมและความคิดที่บ่งชี้ถึงอาการของโรคจิต ของพระภิกษุสงฆ์ เมื่อจำแนกตามการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลี พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 ส่วนคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตด้านอื่น ๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.005

ตารางที่ 31 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์ จำแนกตาม สถานภาพของ สงฆ์

กลุ่มอาการ	เจ้าอาวาส			ผู้ช่วยเจ้าอาวาส			รองเจ้าอาวาส			ผู้ช่วยรองเจ้าอาวาส			พระลูกวัด			F
	n	mean	SD	n	mean	SD	n	mean	SD	n	mean	SD	n	mean	SD	
1.ความรู้สึกว่ามีอาการทางกาย	27	0.65	0.45	21	0.56	0.45	6	0.61	0.44	5	0.23	0.22	841	0.69	0.55	1.20
2.การฆ่าคิดฆ่าทำ	27	0.99	0.55	21	1.07	0.52	6	1.38	0.87	5	0.70	0.41	841	1.10	0.60	1.11
3.ความรู้สึกไม่กล้าติดต่อกับบุคคลอื่น	27	0.93	0.66	21	0.81	0.54	6	1.09	0.98	5	0.60	0.42	841	1.00	0.62	1.07
4.ความซึมเศร้า	27	0.71	0.41	21	0.69	0.43	6	0.92	0.48	5	0.80	0.97	841	0.83	0.51	0.78
5.ความวิตกกังวล	27	0.60	0.47	21	0.58	0.39	6	0.72	0.57	5	0.44	0.21	841	0.74	0.55	1.21
6.ความรู้สึกไม่เป็นมิตร	27	0.64	0.53	21	0.56	0.37	6	0.97	0.64	5	1.30	0.79	841	0.74	0.57	2.18
7.ความรู้สึกกลัวโดยไม่มีสาเหตุ	27	0.66	0.45	21	0.57	0.48	6	0.48	0.45	5	0.63	0.39	841	0.69	0.55	0.48
8.ความคิดระวาง	27	0.85	0.68	21	0.74	0.47	6	1.06	1.09	5	0.67	0.46	841	0.88	0.66	0.50
9.พฤติกรรมและความคิดที่ปองร้ายถึงอาการของโรคจิต	27	0.61	0.53	21	0.47	0.34	6	0.87	0.69	5	0.62	0.33	841	0.75	0.57	1.79

** p < 0.005

จากตารางที่ 31 แสดงให้เห็นว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตทุกด้านของพระภิกษุสงฆ์ จำแนกตามสถานภาพของสงฆ์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005

ตารางที่ 32 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตของพระภิกษุสงฆ์ จำแนกตาม เหตุผลของการบวช

เหตุผลของการบวช ปัญหาสุขภาพจิต	เพื่อศึกษาพระธรรม			เพื่อทดแทนประเพณี			t
	n	mean	SD	n	mean	SD	
1.ความรู้สึกว่ามีอาการทางกาย	201	0.73	0.60	699	0.67	0.53	0.15
2.การย่ำคิด ย่ำทำ	201	1.11	0.64	699	1.09	0.59	0.63
3.ความรู้สึกไม่กล้าติดต่อกับบุคคลอื่น	201	0.99	0.72	699	0.99	0.60	0.99
4.ความซึมเศร้า	201	0.84	0.57	699	0.82	0.49	0.53
5.ความวิตกกังวล	201	0.72	0.59	699	0.74	0.53	0.80
6.ความรู้สึกไม่เป็นมิตร	201	0.74	0.61	699	0.73	0.56	0.75
7.ความรู้สึกกลัวโดยไม่มีสาเหตุ	201	0.73	0.58	699	0.67	0.53	0.19
8.ความคิดระแวง	201	0.87	0.71	699	0.88	0.64	0.86
9.พฤติกรรมและความคิดที่บ่งชี้ถึงอาการของโรคจิต	201	0.71	0.57	699	0.75	0.56	0.39

** p < 0.005

จากตารางที่ 32 แสดงให้เห็นว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มอาการทางสุขภาพจิตทุกด้านของพระภิกษุสงฆ์ จำแนกตามเหตุผลของการบวช ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005