

บทที่ 4

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิจัยเรื่องการศึกษาค่านิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยมทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการเปรียบเทียบค่านิยมทางเพศระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง และมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งหมด 11 แห่งทั่วประเทศ จำนวน 500 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลเองสำหรับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ส่วนมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเก็บข้อมูลโดยส่งทางไปรษณีย์ ได้รับแบบสอบถามคืนมา 478 ฉบับ ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้รับไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (เอส พี เอส เอส) SPSS for Windows version 8.0 แล้วนำเสนอผลการวิจัยออกเป็น 2 ตอน ตามลำดับดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของลักษณะประชากร เศรษฐกิจ สังคม ค่านิยมทางเพศ และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศกับค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ได้รับ โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบค่านิยมทางเพศระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง และมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค โดยใช้วิธีวิเคราะห์โดยค่าที (T-test)

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของลักษณะประชากร เศรษฐกิจ สังคม ค่านิยมทางเพศ

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค

| มหาวิทยาลัย | จำนวนนักศึกษาทั้งหมด (n = 478) | | นักศึกษาชาย (n = 164) | | นักศึกษาหญิง (n = 314) | |
|---------------|-----------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| กรุงเทพมหานคร | 187 | 39.12 | 64 | 39.02 | 124 | 39.49 |
| ภูมิภาค | 291 | 60.87 | 100 | 60.97 | 190 | 60.50 |

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า จำนวนนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 ของคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร มีจำนวนทั้งหมด 187 คน คิดเป็นร้อยละ 39.12 โดยเป็นเพศชาย 64 คน คิดเป็นร้อยละ 39.02 และเพศหญิง 124 คน คิดเป็นร้อยละ 39.49 และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคมีจำนวนทั้งหมด 291 คน คิดเป็นร้อยละ 60.37 เป็นเพศชาย 100 คนคิดเป็นร้อยละ 60.97 เป็นเพศหญิง 190 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50

ตารางที่ 2 จำนวน ร้อยละของนักศึกษาและค่าใช้จ่ายประจำเดือนที่ได้รับและชนิดของที่พักอาศัย

| ข้อมูล | จำนวนนักศึกษาทั้งหมด (n = 478) | | นักศึกษาชาย (n = 164) | | นักศึกษาหญิง (n = 314) | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| | ค่าใช้จ่ายประจำเดือนที่ได้รับ | | | | | |
| น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000 | 37 | 7.7 | 18 | 11.0 | 19 | 6.1 |
| 2,001 - 3,000 | 144 | 30.1 | 45 | 27.4 | 99 | 31.5 |
| 3,001 - 4,000 | 163 | 34.1 | 56 | 34.1 | 107 | 34.1 |
| 4,001 - 5,000 | 89 | 18.6 | 31 | 18.9 | 58 | 18.5 |
| มากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 | 49 | 9.4 | 14 | 8.5 | 31 | 9.9 |
| ที่พักอาศัยในปัจจุบัน | | | | | | |
| พักกับบิดามารดา | 94 | 19.7 | 31 | 18.9 | 63 | 20.1 |
| เช่าบ้านอยู่กับเพื่อน | 61 | 12.8 | 29 | 17.7 | 32 | 10.2 |
| พักที่หอพักแยกชาย - หญิง | 39 | 8.2 | 24 | 14.6 | 15 | 4.8 |
| พักที่หอพักรวมชาย - หญิง | 206 | 43.1 | 49 | 29.9 | 157 | 50.0 |
| อื่นๆ(อยู่วัด, อาศัยเพื่อน) | 78 | 16.3 | 31 | 18.9 | 47 | 15.0 |

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือนเป็นจำนวนเงิน 3,001-4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.1 โดยที่เพศชายและเพศหญิงได้รับค่าใช้จ่ายเท่ากับคือร้อยละ 34.1 รองลงมาคือนักศึกษาที่ได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือนเป็นจำนวนเงิน 2,001-3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.1 เป็นเพศชาย ร้อยละ 27.4 และเพศหญิง ร้อยละ 31.5 และนักศึกษาที่ได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือนเป็นจำนวนเงิน 4,001-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.6 โดยพบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 18.9 และเพศหญิง ร้อยละ 18.5

ที่พักอาศัยในปัจจุบัน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่พักที่หอพักรวมชาย-หญิง คิดเป็นร้อยละ 43.1 โดยเป็นเพศชาย ร้อยละ 29.1 และเพศหญิง ร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ พักอยู่กับบิดามารดา ร้อยละ 19.7 เป็นเพศชาย ร้อยละ 18.9 และเพศหญิง ร้อยละ 20.1 และพักอยู่ในที่อื่นๆ (อยู่วัด หรืออาศัยบ้านเพื่อน) คิดเป็นร้อยละ 16.3 ซึ่งพบว่า เป็นเพศชายร้อยละ 18.9 และเพศหญิง ร้อยละ 15.0

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาจำแนกตามค่านิยมทางเพศ

| ค่านิยม | ระดับคะแนน | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---------|-------------|------------|--------|
| เชิงลบ | 25 – 86 | 44 | 9.2 |
| เชิงบวก | 86.01 – 125 | 434 | 90.8 |

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการตอบแบบวัดค่านิยมเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ กลุ่มตัวอย่างมีค่านิยมในเชิงบวกทั้งหมด 434 คน คิดเป็นร้อยละ 90.8 ที่เหลือมีค่านิยมต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเชิงลบ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับทิศทางของค่านิยม จำแนกเป็นรายชื่อ

| ค่านิยมทางเพศ | | นักศึกษาทั้งหมด (n=478) | | ทิศทาง ค่านิยม |
|--|-----|----------------------------|------|-------------------|
| | | \bar{X} | SD | |
| 1. ผู้ชายต้องการคู่สมรสที่เป็นสาวพรหมจรรย์ | (+) | 3.79 | 1.11 | บวก |
| 2. หญิงชายไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน | (+) | 3.64 | 1.18 | บวก |
| 3. การมีเพศสัมพันธ์ถือเป็นการแสดงออกทางความรักที่มีต่อกัน | (-) | 2.99 | 1.16 | ลบ |
| 4. การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ซึ่งยอมรับกันได้ | (-) | 3.11 | 1.10 | ลบ |
| 5. การมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศหลายคน เป็นการแข่งขัน เพื่อแสดงความสามารถในด้านเพศ | (-) | 4.04 | 1.12 | บวก |
| 6. การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานของหญิง ไม่เป็นที่ยอมรับของ สังคมไทย | (+) | 3.69 | 1.04 | บวก |
| 7. การเสียตัวของหญิงถือเป็นเรื่องเสียหาย | (+) | 3.60 | 1.20 | บวก |
| 8. การขึ้นครุครั้งแรกกับหญิงบริการถือเป็นเรื่องปกติของชายไทย | (-) | 3.46 | 1.26 | ลบ |
| 9. การมีคูรักรหลายคนในเวลาเดียวกันทำให้มี โอกาสเลือกคูครอง ได้ดี | (-) | 3.39 | 1.30 | ลบ |
| 10. การมีเพศสัมพันธ์กับคูรักรทำให้ลดอัตราเสี่ยงจาก โรคเอดส์ | (-) | 2.61 | 1.12 | ลบ |
| 11. การรักษาความบริสุทธิ์ของหญิงเป็นสิ่งสำคัญ | (+) | 4.19 | 0.90 | บวก |
| 12. การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นการระบายความเครียดที่ ปลอดภัย | (+) | 3.64 | 0.99 | บวก |
| 13. หญิงหรือชายที่มีคูรักรหลายคนในเวลาเดียวกันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ | (-) | 3.90 | 1.03 | บวก |
| 14. การถูกเนื้อต้องตัวกับคูรักรเป็นสิ่งที่ทำได้ | (-) | 2.46 | 0.99 | ลบ |
| 15. การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน แสดงถึงความจริงใจที่มีต่อกัน | (-) | 3.66 | 1.08 | บวก |
| 16. หญิงหรือชายที่เปลี่ยนคู่นอนหลายคนถือว่าเป็นผู้ที่เก่งและมี ความสามารถ | (-) | 4.36 | 0.99 | บวก |
| 17. การใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ทำให้ความรู้สึก ลดลง | (-) | 2.99 | .80 | ลบ |
| 18. การใช้ถุงยางอนามัยเพื่อเป็นการคุมกำเนิดอย่างเดียวเท่านั้น | (-) | 3.61 | .99 | บวก |
| 19. ควรใช้ถุงยางอนามัยเฉพาะหญิง/ชายบริการทางเพศเท่านั้น | (-) | 4.00 | .98 | บวก |
| 20. การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดความ ต้องการทางเพศ | (-) | 3.02 | .98 | ลบ |
| 21. การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ทำให้รู้สึกตื่นเต้น ขณะมีเพศสัมพันธ์ | (-) | 3.02 | .92 | ลบ |

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| ค่านิยมทางเพศ | | นักศึกษาทั้งหมด (n=478) | | ทิศทาง ค่านิยม |
|--|-----|----------------------------|------|-------------------|
| | | \bar{X} | SD | |
| 22. ความไม่ตั้งใจและขาดการป้องกันในการมีเพศสัมพันธ์ เป็นสาเหตุของการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมและต้องการทำแท้ง | (+) | 3.97 | 1.07 | บวก |
| 23. นักเรียน/นักศึกษาที่ทำแท้งเนื่องจากกลัวผู้ปกครองจะทราบเรื่องการตั้งครรภ์หรืออับอายผู้อื่น | (+) | 3.80 | 1.14 | บวก |
| 24. หญิงสาวที่ตั้งครรภ์เนื่องจากถูกข่มขืน ควรทำแท้งได้หากหญิงผู้นั้นยินยอม | (+) | 4.20 | .94 | บวก |
| 25. การมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน ปลอดภัยจากการติดเอดส์หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | (-) | 3.96 | 1.02 | บวก |
| | รวม | 3.52 | .45 | บวก |

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีค่านิยมในเชิงบวกโดยเฉลี่ยของระดับค่านิยมเท่ากับ 3.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อความที่นักศึกษาอยู่ในเชิงลบมีเพียง 9 ข้อ ดังนี้ 1) การมีเพศสัมพันธ์ถือเป็นการแสดงออกทางความรักที่มีต่อกัน 2) การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ซึ่งยอมรับกันได้ 3) การขึ้นครุครั้งแรกกับหญิงบริการถือเป็นเรื่องปกติของชายไทย 4) การมีคูรักรหลายคนในเวลาเดียวกันทำให้มีโอกาสเลือกคูครองได้ดี 5) การมีเพศสัมพันธ์กับคูรักรทำให้ลดอัตราเสี่ยงจากโรคเอดส์ 6) การถูกเนื้อต้องตัวกับคูรักรเป็นสิ่งที่ทำได้ 7) การใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ทำให้ความรู้สึกลดลง 8) การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดความต้องการทางเพศ 9) การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ทำให้รู้สึกตื่นเต้นขณะมีเพศสัมพันธ์

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบค่านิยมทางเพศ

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางเพศระหว่างนักศึกษาชายและหญิง จำแนกเป็นรายชื่อ

| | ค่านิยมทางเพศ | | นักศึกษาชาย | | นักศึกษาหญิง | | t – test |
|-----|---|-----|-------------|------|--------------|------|----------|
| | | | X | SD | X | SD | |
| 1. | ผู้ชายต้องการคู่สมรสที่เป็นสาวพรหมจรรย์ | (+) | 4.07 | 1.00 | 3.65 | 1.14 | 4.154* |
| 2. | หญิงชายไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน | (+) | 3.20 | 1.25 | 3.88 | 1.07 | -5.864* |
| 3. | การมีเพศสัมพันธ์ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่เป็นการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อกัน | (-) | 2.59 | 1.10 | 3.20 | 1.14 | -5.633* |
| 4. | การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ซึ่งยอมรับกันได้ | (-) | 2.81 | 1.09 | 3.27 | 1.08 | -4.403* |
| 5. | การมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศหลายคน เป็นการแข่งขันเพื่อแสดงความสามารถในด้านเพศ | (-) | 3.61 | 1.16 | 4.27 | 1.02 | -6.127* |
| 6. | การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานของหญิงไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมไทย | (+) | 3.60 | 1.09 | 3.73 | 1.02 | -1.283 |
| 7. | การเสียตัวของหญิงถือเป็นเรื่องเสียหาย | (+) | 3.43 | 1.22 | 3.69 | 1.18 | -2.246* |
| 8. | การขึ้นครุครั้งแรกกับหญิงบริการถือเป็นเรื่องปกติของชายไทย | (-) | 3.38 | 1.21 | 3.50 | 1.28 | -1.006 |
| 9. | การมีคูรักรหลายคนในเวลาเดียวกันทำให้มีโอกาสเลือกคูครองได้ดี | (-) | 3.07 | 1.33 | 3.56 | 1.25 | -4.038* |
| 10. | การมีเพศสัมพันธ์กับคูรักรทำให้ลดอัตราเสี่ยงจากโรคเอดส์ | (-) | 2.24 | 1.04 | 2.81 | 1.12 | -5.392* |
| 11. | การรักษาความบริสุทธิ์ของหญิงเป็นสิ่งสำคัญ | (+) | 4.08 | 0.91 | 4.25 | 0.89 | -1.963 |
| 12. | การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นการระบายความเครียดที่ปลอดภัย | (+) | 3.95 | 0.95 | 3.47 | 0.98 | 5.147* |
| 13. | หญิงหรือชายที่มีคูรักรหลายคนในเวลาเดียวกันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ | (-) | 3.62 | 1.09 | 4.04 | 0.98 | -4.111* |
| 14. | การถูกเนื้อต้องตัวกับคูรักรเป็นสิ่งที่ทำได้ | (-) | 2.26 | 0.90 | 2.57 | 1.02 | -3.433* |
| 15. | การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน แสดงถึงความจริงใจที่มีต่อกัน | (-) | 3.20 | 1.05 | 3.90 | 1.01 | -7.177* |
| 16. | หญิงหรือชายที่เปลี่ยนคู่นอนหลายคนถือว่าเป็นผู้ที่เก่งและมีความสามารถ | (-) | 4.00 | 1.18 | 4.55 | 0.81 | -5.310* |
| 17. | การใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ทำให้ความรู้สึกลดลง | (-) | 2.80 | 0.93 | 3.08 | 0.70 | -3.312* |



ตารางที่ 5 (ต่อ)

| คำนิยามทางเพศ | | นักศึกษาชาย | | นักศึกษาหญิง | | t – test |
|--|-----|-------------|------|--------------|------|----------|
| | | X | SD | X | SD | |
| 18. การใช้ถุงยางอนามัยเพื่อเป็นการคุมกำเนิดอย่าง เดียวเท่านั้น | (-) | 3.47 | 1.09 | 3.69 | 0.93 | -2.184* |
| 19. ควรใช้ถุงยางอนามัยเฉพาะหญิง/ชายบริการทาง เพศเท่านั้น | (-) | 3.82 | 1.07 | 4.09 | 0.92 | -2.734* |
| 20. การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดความต้องการทางเพศ | (-) | 2.78 | 1.09 | 3.14 | 0.90 | -3.670* |
| 21. การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ทำให้ รู้สึกตื่นเต้นขณะมีเพศสัมพันธ์ | (-) | 2.80 | 1.01 | 3.13 | 0.84 | -3.559* |
| 22. ความไม่ตั้งใจและขาดการป้องกันในการมีเพศ สัมพันธ์ เป็นสาเหตุของการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และต้องการทำแท้ง | (+) | 3.95 | 1.02 | 3.98 | 1.09 | -0.348 |
| 23. นักเรียน/นักศึกษาที่ทำแท้งเนื่องจากผู้ปกครองจะ ทราบเรื่องการตั้งครรภ์หรืออับอายผู้อื่น | (+) | 3.96 | 1.06 | 3.72 | 1.17 | 2.143* |
| 24. หญิงสาวที่ตั้งครรภ์เนื่องจากถูกข่มขืน ควรทำแท้ง ได้หากหญิงผู้นั้นยินยอม | (+) | 4.30 | 0.85 | 4.21 | 0.98 | 0.945 |
| 25. การมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน ปลอดภัยจากการติดเชื้อหรือโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ | (-) | 3.60 | 1.00 | 4.14 | 0.96 | -5.540* |

$p \leq .05$ (.05t $\infty = \pm 1.96$)

ตารางที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคำนิยามทางเพศระหว่างนักศึกษาเพศชายและ
เพศหญิง พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นคำนิยามทาง
เพศในข้อที่ 6, 8, 11, 22 และข้อ 24 พบว่าไม่มีความแตกต่าง คือ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานของ
หญิงไทยไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมไทย การรักษาความบริสุทธิ์ของหญิงไทยเป็นสิ่งสำคัญ ความไม่ตั้งใจ
และขาดการป้องกันในการมีเพศสัมพันธ์เป็นสาเหตุของการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และต้องการทำแท้ง
หญิงสาวที่ตั้งครรภ์เนื่องจากถูกข่มขืนควรทำแท้งได้หากหญิงผู้นั้นยินยอม

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบค่านิยมทางเพศระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครกับใน
ส่วนภูมิภาค

| ค่า นียมทางเพศ | | ม. ใน กทม. | | ม. ในภูมิภาค | | t - test |
|--|-----|------------|------|--------------|------|----------|
| | | n = 186 | | n = 186 | | |
| | | \bar{X} | SD | \bar{X} | SD | |
| 1. ผู้ชายต้องการคู่สมรสที่เป็นสาวพรหมจรรย์ | (+) | 3.72 | 1.16 | 3.84 | 1.07 | -1.107 |
| 2. หญิงชายไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน | (+) | 3.74 | 1.15 | 3.59 | 1.19 | 1.365 |
| 3. การมีเพศสัมพันธ์ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่เป็นการ แสดงออกถึงความรักที่มีต่อกัน | (-) | 3.02 | 1.16 | 2.97 | 1.17 | .510 |
| 4. การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นพฤติกรรมของ คนรุ่นใหม่ซึ่งยอมรับกันได้ | (-) | 3.22 | 1.07 | 3.04 | 1.13 | 1.701 |
| 5. การมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศหลายคน เป็น การแข่งขันเพื่อแสดงความสามารถในด้านเพศ | (-) | 4.10 | 1.08 | 4.00 | 1.14 | .944 |
| 6. การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานของหญิงไม่เป็นที่ ยอมรับของสังคมไทย | (+) | 3.74 | 0.98 | 3.66 | 1.08 | .827 |
| 7. การเสียตัวของหญิงถือเป็นเรื่องเสียหาย | (+) | 3.63 | 1.18 | 3.58 | 1.21 | .464 |
| 8. การขึ้นครุครั้งแรกกับหญิงบริการถือเป็นเรื่องปกติ ของชายไทย | (-) | 3.48 | 1.24 | 3.45 | 1.27 | .282 |
| 9. การมีคู่รักหลายคนในเวลาเดียวกันทำให้มีโอกาส เลือกคู่ครองได้ดี | (-) | 3.33 | 1.33 | 3.43 | 1.28 | -.807 |
| 10. การมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักทำให้ลดอัตราเสี่ยงจาก โรคเอดส์ | (-) | 2.55 | 1.14 | 2.65 | 1.12 | -.886 |
| 11. การรักษาความบริสุทธิ์ของหญิงเป็นสิ่งสำคัญ | (+) | 4.25 | 0.91 | 4.15 | 0.89 | 1.213 |
| 12. การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นการระบาย ความเครียดที่ปลอดภัย | (+) | 3.61 | 1.05 | 3.65 | 0.96 | -.499 |
| 13. หญิงหรือชายที่มีคู่รักหลายคนในเวลาเดียวกันเป็น สิ่งที่น่าภูมิใจ | (-) | 3.92 | 0.97 | 3.88 | 1.08 | .413 |
| 14. การถูกเนื้อต้องตัวกับคู่รักเป็นสิ่งที่ทำได้ | (-) | 2.38 | 0.90 | 2.51 | 1.04 | -1.533 |
| 15. การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน แสดงถึงความจริง ใจที่มีต่อกัน | (-) | 3.78 | 1.08 | 3.58 | 1.07 | 2.020* |
| 16. หญิงหรือชายที่เปลี่ยนคู่นอนหลายคนถือว่าเป็นผู้ที่ เก่งและมีความสามารถ | (-) | 4.46 | 0.91 | 4.29 | 1.04 | 1.864 |
| 17. การใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ทำให้ความ รู้สึกลดลง | (-) | 3.10 | 0.78 | 2.91 | 0.81 | 2.444* |

ตารางที่ 6 (ต่อ)

| คำนิยามทางเพศ | | ม. ใน กทม. | | ม. ในภูมิภาค | | t - test |
|---|-----|------------|------|--------------|------|----------|
| | | n = 186 | | n = 186 | | |
| | | \bar{X} | SD | \bar{X} | SD | |
| 18. การใช้ถุงยางอนามัยเพื่อเป็นการคุมกำเนิดอย่างเดียวกัน | (-) | 3.77 | 0.98 | 3.51 | 0.99 | 2.754* |
| 19. ควรใช้ถุงยางอนามัยเฉพาะหญิงบริการทางเพศเท่านั้น | (-) | 4.19 | 0.90 | 3.88 | 1.01 | 3.487* |
| 20. การคุมสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ทำให้เกิดความต้องการทางเพศ | (-) | 2.97 | 0.91 | 3.05 | 1.03 | -0.907 |
| 21. การคุมสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ทำให้รู้สึกตื่นเต้นขณะมีเพศสัมพันธ์ | (-) | 3.08 | 0.78 | 2.98 | 1.00 | 1.199 |
| 22. ความไม่ตั้งใจและขาดการป้องกันในการมีเพศสัมพันธ์เป็นสาเหตุของการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมและต้องการทำแท้ง | (+) | 3.99 | 1.04 | 3.95 | 1.08 | .425 |
| 23. นักเรียน/นักศึกษาที่ทำแท้งเนื่องจากผู้ปกครองจะทราบเรื่องการตั้งครรภ์หรืออายผู้อื่น | (+) | 3.91 | 1.06 | 3.74 | 1.19 | 1.614 |
| 24. หญิงสาวที่ตั้งครรภ์เนื่องจากถูกข่มขืน ควรทำแท้งได้หากหญิงผู้นั้นยินยอม | (+) | 4.24 | 0.94 | 4.25 | 0.94 | -0.114 |
| 25. การมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาด้วยกันปลอดภัยจากการติดเชื้อหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | (-) | 4.04 | 1.03 | 3.90 | 1.02 | 1.391 |

$p \leq .05$ (.05t00 = ± 1.96)

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าการเปรียบเทียบคำนิยามทางเพศ ระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ และ ศิลปากร) กับมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น เชียงใหม่ บурพา นครสวรรค์ สงขลานครินทร์ มหาสารคาม และทักษิณ) พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน แสดงถึงความจริงใจที่มีต่อกัน การใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ทำให้ความรู้สึกลดลง การใช้ถุงยางอนามัยเพื่อเป็นการคุมกำเนิดอย่างเดียวกัน และควรใช้ถุงยางอนามัยเฉพาะหญิงบริการทางเพศเท่านั้น ในส่วนเรื่องอื่นๆ ไม่พบว่ามี ความแตกต่าง

ตอนที่ 3 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาเพศชายจำแนกตามพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

| พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ | นักศึกษาชาย (n = 164) | | | |
|---|-----------------------|--------|--------|--------|
| | เคย | | ไม่เคย | |
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| การแต่งกายล่อแหลม | 37 | 22.6 | 120 | 73.2 |
| การเที่ยวสถานเริงรมย์ | 140 | 85.4 | 24 | 14.6 |
| การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ | 137 | 83.5 | 27 | 16.5 |
| การใช้สื่อกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ | 135 | 82.3 | 29 | 17.7 |

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาชายเคยเที่ยวสถานเริงรมย์ ร้อยละ 85.4 เคยดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ร้อยละ 83.5 เคยใช้สื่อกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ ร้อยละ 82.3 เคยแต่งกายล่อแหลม ร้อยละ 22.6

ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาหญิงจำแนกตามพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

| พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ | นักศึกษาหญิง (n = 314) | | | |
|---|------------------------|--------|--------|--------|
| | เคย | | ไม่เคย | |
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| การแต่งกายล่อแหลม | 99 | 31.5 | 215 | 68.5 |
| การเที่ยวสถานเริงรมย์ | 235 | 74.8 | 79 | 25.2 |
| การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ | 219 | 69.7 | 93 | 29.6 |
| การใช้สื่อกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ | 118 | 37.6 | 196 | 62.4 |

จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาหญิงเคยเที่ยวสถานเริงรมย์ ร้อยละ 74.8 เคยดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ร้อยละ 69.7 เคยใช้สื่อกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ ร้อยละ 37.6 เคยแต่งกายล่อแหลม ร้อยละ 31.5

ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละของนักศึกษา จำแนกตามพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

| พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ | นักศึกษาทั้งหมด (n = 478) | | | |
|---|---------------------------|--------|--------|--------|
| | เคย | | ไม่เคย | |
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| การแต่งกายล่อแหลม | 136 | 28.5 | 355 | 70.1 |
| การเที่ยวสถานเริงรมย์ | 375 | 78.5 | 103 | 21.5 |
| การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ | 356 | 74.5 | 120 | 25.1 |
| การใช้สื่อกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ | 253 | 52.9 | 225 | 47.1 |

จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาเคยเที่ยวสถานเริงรมย์ ร้อยละ 78.5 เคยดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ร้อยละ 74.5 เคยใช้สื่อกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ ร้อยละ 52.9 เคยแต่งกายล่อแหลม ร้อยละ 28.5

ตารางที่ 10 จำนวนและร้อยละของนักศึกษา จำแนกตามพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ กับค่าใช้จ่ายที่ได้รับ (ต่อเดือน)

| ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ (ต่อเดือน) | กลุ่มนักศึกษาที่ได้รับค่าใช้จ่าย (ต่อเดือน) | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|---------|--------|
| | ≤ 2,000 | | 2,001-3,000 | | 3,001-4,000 | | 4,001-5,000 | | ≥ 5,000 | |
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ | | | | | | | | | | |
| การแต่งกายล่อแหลม | | | | | | | | | | |
| นักศึกษาชาย | 2 | 5.4 | 13 | 35.1 | 11 | 29.7 | 7 | 18.9 | 4 | 10.8 |
| นักศึกษาหญิง | 5 | 5.1 | 24 | 24.2 | 39 | 39.4 | 19 | 19.2 | 12 | 12.1 |
| การเที่ยวสถานบันเทิง | | | | | | | | | | |
| นักศึกษาชาย | 8 | 5.7 | 40 | 28.6 | 51 | 36.4 | 28 | 20.0 | 13 | 9.3 |
| นักศึกษาหญิง | 14 | 6.0 | 70 | 29.8 | 82 | 34.9 | 43 | 18.3 | 26 | 11.1 |
| การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ | | | | | | | | | | |
| นักศึกษาชาย | 9 | 6.6 | 35 | 25.5 | 53 | 38.7 | 26 | 19.0 | 14 | 10.2 |
| นักศึกษาหญิง | 11 | 5.0 | 67 | 30.6 | 80 | 36.5 | 38 | 17.4 | 23 | 10.5 |
| การใช้สื่อกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ | | | | | | | | | | |
| นักศึกษาชาย | 11 | 8.1 | 35 | 25.9 | 51 | 37.8 | 24 | 17.8 | 14 | 10.4 |
| นักศึกษาหญิง | 6 | 5.1 | 34 | 28.8 | 43 | 36.4 | 20 | 16.9 | 15 | 12.7 |

จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่ได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท พบว่า นักศึกษาชายมีการแต่งกายล่อแหลม ร้อยละ 5.4 นักศึกษาหญิงมีการแต่งกายล่อแหลม ร้อยละ 5.1 นักศึกษาชายมีการเที่ยวสถานบันเทิง ร้อยละ 5.7 นักศึกษาหญิงมีการเที่ยวสถานบันเทิง ร้อยละ 6.0 มีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ นักศึกษาชาย ร้อยละ 6.6 และ นักศึกษาหญิง ร้อยละ 5.0 นักศึกษาชายมีการใช้สื่อกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ ร้อยละ 8.1 นักศึกษาหญิง ร้อยละ 5.1

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับประจำเดือนตั้งแต่ 2,001-3,000 บาท พบว่า นักศึกษาชายมีการแต่งกายล่อแหลม ร้อยละ 35.1 นักศึกษาหญิง ร้อยละ 24.2 นักศึกษาหญิงมีการเที่ยวสถานบันเทิง ร้อยละ 29.8 และ นักศึกษาชาย ร้อยละ 28.6 นักศึกษาหญิงมีการใช้สื่อกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ ร้อยละ 28.8 และ นักศึกษาชาย ร้อยละ 25.9 และ นักศึกษาหญิงมีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ นักศึกษาชาย คือ ร้อยละ 30.6 และ นักศึกษาชาย ร้อยละ 25.5

นักศึกษาชาย ร้อยละ 25.9 และนักศึกษาหญิงมีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์นักศึกษาชาย คือ ร้อยละ 30.6 และนักศึกษาชาย ร้อยละ 25.5

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับประจำเดือนตั้งแต่ 3,001-4,000 บาท พบว่า นักศึกษาหญิงมีการแต่งกายล่อแหลม ร้อยละ 39.4 และนักศึกษาชาย ร้อยละ 29.7 การเที่ยวสถานบันเทิง พบว่า นักศึกษาชายมีการเที่ยวสถานบันเทิง ร้อยละ 36.4 และนักศึกษาหญิง ร้อยละ 34.9 การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ พบว่า นักศึกษาชายมีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ร้อยละ 38.7 และนักศึกษาหญิง ร้อยละ 36.5 การใช้สื่อกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ พบว่า นักศึกษาชายมีการใช้สื่อกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ ร้อยละ 37.8 และนักศึกษาหญิง ร้อยละ 36.4

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับประจำเดือนตั้งแต่ 4,001-5,000 บาท พบว่า นักศึกษาชายมีการแต่งกายล่อแหลม ร้อยละ 18.9 นักศึกษาหญิงมีการแต่งกายล่อแหลม ร้อยละ 19.2 การเที่ยวสถานบันเทิง พบว่า นักศึกษาชายมีการเที่ยวสถานบันเทิง ร้อยละ 20.0 นักศึกษาหญิง ร้อยละ 18.3 การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ พบว่า นักศึกษาชายมีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ร้อยละ 19 นักศึกษาหญิง ร้อยละ 17.4 การใช้สื่อกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ พบว่า นักศึกษาชายมีการใช้สื่อกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ ร้อยละ 17.8 นักศึกษาหญิง ร้อยละ 16.9

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับประจำเดือนตั้งแต่ 5,001 บาทหรือมากกว่า พบว่า นักศึกษาชายมีการแต่งกายล่อแหลม ร้อยละ 10.8 นักศึกษาหญิงมีการแต่งกายล่อแหลม ร้อยละ 12.1 การเที่ยวสถานบันเทิง พบว่า นักศึกษาชายมีการเที่ยวสถานบันเทิง ร้อยละ 9.3 นักศึกษาหญิง ร้อยละ 11.1 การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ พบว่า นักศึกษาชายมีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ร้อยละ 10.2 นักศึกษาหญิง ร้อยละ 10.5 การใช้สื่อกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ พบว่า นักศึกษาชายมีการใช้สื่อกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ ร้อยละ 10.4 นักศึกษาหญิง ร้อยละ 12.7

ตารางที่ 11 จำนวน และร้อยละของนักศึกษาเพศชาย และเพศหญิง กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์

| พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ | นักศึกษาทั้งหมด (n = 478) | | นักศึกษาชาย (n = 164) | | นักศึกษาหญิง (n = 314) | |
|---------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| การมีเพศสัมพันธ์ | | | | | | |
| เคย | 180 | 37.6 | 105 | 64.0 | 75 | 23.9 |
| ไม่เคย | 298 | 62.3 | 59 | 35.9 | 239 | 76.1 |
| อายุของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก | | | | | | |
| 13 - 15 ปี | 30 | 16.7 | 22 | 13.4 | 8 | 2.5 |
| 16 - 18 ปี | 83 | 46.1 | 57 | 34.8 | 26 | 8.3 |
| 19 - 21 ปี | 65 | 36.1 | 24 | 14.6 | 41 | 13.1 |
| 22 ปีขึ้นไป | 2 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| คู่เพศสัมพันธ์ครั้งแรก | | | | | | |
| คู่อีก | 122 | 65.5 | 60 | 57.7 | 62 | 81.6 |
| เพื่อน | 35 | 19.4 | 16 | 22.1 | 12 | 15.8 |
| หญิง/ชายบริการทางเพศ | 17 | 9.4 | 3 | 15.4 | 1 | 1.3 |
| อื่นๆ | 4 | 2.2 | 2 | 2.9 | 1 | 1.3 |
| ไม่ตอบ | 2 | 1.1 | - | 1.9 | - | - |

จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาเคยมีเพศสัมพันธ์ จำนวน 180 คน คิดเป็น ร้อยละ 37.6 เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.0 และเพศหญิงร้อยละ 23.9 อายุของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมากที่สุดคือ อายุระหว่าง 16-18 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.1 รองลงมาคืออายุระหว่าง 19-21 ปี คิดเป็น ร้อยละ 36.1 และอายุ 13-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.7 ปี ซึ่งเพศชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุ ระหว่าง 13- 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.4 รองลงมาคืออายุระหว่าง 19-21 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.61 และอายุระหว่าง 13-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.4 ส่วนเพศหญิงพบว่า มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุระหว่าง 19-21 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.1 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 16-18 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.3 และอายุระหว่าง 13-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.5 โดยส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์กับคู่อีกคิดเป็นร้อยละ 65.5 รองลงมาคือเพื่อน ร้อยละ 19.4 และหญิงบริการทางเพศ ร้อยละ 9.4 โดยพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคู่อีกมากที่สุด คือ เพศชายร้อยละ 57.7 และเพศหญิงร้อยละ 81.6 รองลงมาคือ เพื่อน โดยเพศชายคิดเป็นร้อยละ 22.1 และเพศหญิง คิดเป็น ร้อยละ 15.8 และเพศชายมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการทางเพศ ร้อยละ 15.4

ตารางที่ 12 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงกับสาเหตุ จำนวนครั้งของการมีเพศสัมพันธ์ และจำนวนคู่เพศสัมพันธ์ ของการมีเพศสัมพันธ์

| พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ | นักศึกษาทั้งหมด (n = 478) | | นักศึกษาชาย (n=164) | | นักศึกษาหญิง (n=314) | |
|---------------------------------|------------------------------|--------|------------------------|--------|-------------------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| สาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ | | | | | | |
| อยากลอง | 106 | 22.2 | 72 | 43.9 | 34 | 10.3 |
| ถูกรักชักชวน | 41 | 8.6 | 17 | 10.4 | 24 | 7.6 |
| ความใกล้ชิด | 118 | 24.7 | 59 | 36.0 | 59 | 18.8 |
| หาประสบการณ์ | 77 | 16.1 | 63 | 38.4 | 14 | 4.5 |
| ถูกบังคับ | 14 | 2.9 | 8 | 4.9 | 6 | 1.9 |
| มีความต้องการทางเพศ | 92 | 19.2 | 70 | 42.7 | 22 | 7.0 |
| ต้องการผูกมัดฝ่ายตรงข้าม | 35 | 7.3 | 17 | 10.4 | 17 | 5.4 |
| อื่นๆ(ถูกล่อลวง, คนรักต้องการ) | 12 | 2.5 | 9 | 5.5 | 1 | 0.3 |
| จำนวนครั้งของการมีเพศสัมพันธ์ใน | | | | | | |
| ระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา | | | | | | |
| ครั้งเดียว | 28 | 5.9 | 16 | 9.8 | 12 | 3.8 |
| นานๆ ครั้ง (1 ครั้ง/เดือน) | 57 | 11.9 | 34 | 20.7 | 23 | 7.3 |
| บ่อยครั้ง (1 ครั้ง/สัปดาห์) | 53 | 11.1 | 22 | 13.4 | 31 | 9.9 |
| เป็นประจำ (ทุกวัน) | 11 | 2.3 | 8 | 4.9 | 3 | 1.0 |
| อื่นๆ(นานกว่า 3 เดือน) | 28 | 5.9 | 22 | 13.4 | 6 | 1.9 |
| ไม่ตอบ | 301 | 62.9 | 62 | 37.8 | 239 | 76.1 |
| จำนวนคู่ของการมีเพศสัมพันธ์ | | | | | | |
| 1 คน | 117 | 24.5 | 56 | 34.1 | 61 | 19.4 |
| 2 คน | 16 | 3.3 | 13 | 7.9 | 3 | 1.0 |
| 3 คน | 3 | 0.6 | 1 | 0.6 | 2 | 0.6 |
| 4 คน | 1 | 0.2 | 1 | 0.6 | - | - |
| ไม่ตอบ | 341 | 62.9 | 93 | 56.7 | 248 | 79.0 |

จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่า สาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ส่วนใหญ่มีสาเหตุเนื่องมาจากความใกล้ชิด คิดเป็นร้อยละ 24.7 รองลงมาคือ อยากลอง ร้อยละ 22.2 และมีความต้องการทางเพศ ร้อยละ 19.2 ซึ่งพบว่าเพศชายมีสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมาจากอยากลอง คิดเป็นร้อยละ

ส่วนเพศหญิงพบว่ามีความถี่จากความใกล้ชิด ร้อยละ 18.8 รองลงมาคือ อายากลอง ร้อยละ 10.3 และ คู่รักชักรวน ร้อยละ 7.6

จำนวนครั้งของการมีเพศสัมพันธ์ในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษามีเพศสัมพันธ์ นานๆ ครั้ง (1 ครั้ง/เดือน) ร้อยละ 11.9 รองลงมาคือ บ่อยครั้ง (1ครั้ง/สัปดาห์) ร้อยละ 11.1 โดยพบว่าเพศชายมีเพศสัมพันธ์นานๆ ครั้ง (1 ครั้ง/เดือน) ร้อยละ 20.7 รองลงมาคือ บ่อยครั้ง (1ครั้ง/สัปดาห์) ร้อยละ 13.4 ส่วนเพศหญิงมีเพศสัมพันธ์ บ่อยครั้ง (1ครั้ง/สัปดาห์) คิดเป็นร้อยละ 9.9 รองลงมาคือ นานๆ ครั้ง (1 ครั้ง/เดือน) ร้อยละ 7.3

จำนวนคู่เพศสัมพันธ์ พบว่า นักศึกษามีจำนวนคู่เพศสัมพันธ์สูงสุดคือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 รองลงมาคือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 และ 3 คนคิดเป็นร้อยละ 0.6 ตามลำดับ โดยพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีจำนวนคู่เพศสัมพันธ์เท่ากันคือจำนวน 1 คน เพศชาย ร้อยละ 34.15 รองลงมาคือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 และ 3 คนคิดเป็นร้อยละ 0.6 และเพศหญิงร้อยละ 19.4 รองลงมาคือ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และ 3 คนคิดเป็นร้อยละ 0.6

ตารางที่ 13 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาชายกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการทางเพศ

| พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ | นักศึกษาทั้งหมด (n = 478) | | นักศึกษาชาย (n = 164) | |
|---|------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการทางเพศ | | | | |
| เคย | 58 | 13.4 | 58 | 35.4 |
| ไม่เคย | 106 | 22.2 | 41 | 25.0 |
| ไม่ตอบ | 314 | 65.7 | 65 | 39.6 |
| การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการทางเพศในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา | | | | |
| ครั้งเดียว | 24 | 5.0 | 24 | 5.0 |
| นานๆ ครั้ง (1 ครั้ง/เดือน) | 24 | 5.0 | 24 | 5.0 |
| บ่อยครั้ง (1 ครั้ง/สัปดาห์) | 6 | 1.3 | 6 | 1.3 |
| เป็นประจำ (ทุกวัน) | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 |
| อื่นๆ (นานกว่า 3 เดือน) | 28 | 5.9 | 28 | 5.9 |
| ไม่ตอบ | 394 | 82.4 | 96 | 82.4 |

จากตารางที่ 13 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาชายมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการทางเพศ ร้อยละ 35.4 และในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาชายมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการทางเพศ นานกว่า 3 เดือนที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 5.9 รองลงมาคือครั้งเดียวร้อยละ 5.0 และ นานๆ ครั้ง (1 ครั้ง/เดือน) ร้อยละ 5.0

ตารางที่ 14 จำนวนนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงกับการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการทางเพศและกับคู่อุปสรรคสัมพันธ์

| พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ | นักศึกษาทั้งหมด (n = 478) | | นักศึกษาชาย (n = 164) | | นักศึกษาหญิง (n = 314) | |
|---|------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| การใช้ถุงยางอนามัยกับหญิงบริการทางเพศ | | | | | | |
| ไม่ใช้ | 25 | 5.2 | 25 | 5.2 | - | - |
| ใช้บางครั้ง | 19 | 4.0 | 19 | 4.0 | - | - |
| ใช้ทุกครั้ง | 66 | 13.8 | 66 | 13.8 | - | - |
| อื่นๆ | 22 | 4.6 | 22 | 4.6 | - | - |
| ไม่ตอบ | 346 | 72.4 | 346 | 72.4 | - | - |
| การใช้ถุงยางอนามัยกับคู่อุปสรรคสัมพันธ์ | | | | | | |
| ไม่ใช้ | 46 | 9.6 | 28 | 17.1 | 18 | 5.7 |
| ใช้บางครั้ง | 78 | 16.3 | 42 | 25.6 | 36 | 11.5 |
| ใช้ทุกครั้ง | 51 | 10.7 | 33 | 20.1 | 18 | 5.7 |
| อื่นๆ | 1 | 0.2 | - | - | 1 | 0.3 |
| ไม่ตอบ | 302 | 63.1 | 61 | 31.1 | 241 | 46.7 |
| การเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | | | | | | |
| เคย | 13 | 2.7 | 12 | 7.3 | 1 | 0.3 |
| ไม่เคย | 164 | 34.3 | 91 | 55.6 | 73 | 23.3 |
| ไม่ตอบ | 302 | 63.2 | 62 | 37.8 | 240 | 76.4 |

จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาชายมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับหญิงบริการทางเพศ ร้อยละ 13.8 รองลงมาคือไม่ใช้ ร้อยละ 5.2 และอื่นๆร้อยละ 4.6 นักศึกษาไม่ตอบร้อยละ 72.4

การใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์กับคู่อุปสรรคสัมพันธ์ พบว่า นักศึกษามีการใช้ถุงยางอนามัยบางครั้ง ร้อยละ 16.3 รองลงมาคือใช้ทุกครั้ง ร้อยละ 10.7 และไม่ใช้เลยร้อยละ 9.6 นักศึกษาไม่ตอบร้อยละ 63.1 ซึ่งพบว่า นักศึกษาชายใช้บางครั้งร้อยละ 25.6 รองลงมา คือ ใช้ทุกครั้งร้อยละ 20.1 และไม่ใช้ ร้อยละ 17.1 นักศึกษาชายไม่ตอบร้อยละ 37.1 ส่วนนักศึกษาหญิงมีการใช้ถุงยางอนามัยบางครั้งร้อยละ 11.5 รองลงมาคือ ใช้ทุกครั้งและไม่ใช้เลยเท่ากันคือ ร้อยละ 5.7 และพบว่านักศึกษาหญิงไม่ตอบร้อยละ 76.7

การเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบว่า นักศึกษาเคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ร้อยละ 2.7 นักศึกษาไม่ตอบคิดเป็นร้อยละ 63.0 โดยพบว่านักศึกษาชายเคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ร้อยละ 7.3 นักศึกษาไม่ตอบคิดเป็นร้อยละ 37.2 ส่วนนักศึกษาหญิงเคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 0.3 นักศึกษาไม่ตอบคิดเป็นร้อยละ 76.4

ตารางที่ 15 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงกับการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ก่อนมีเพศสัมพันธ์

| พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ | นักศึกษาทั้งหมด (n = 478) | | นักศึกษาชาย (n = 164) | | นักศึกษาหญิง (n = 314) | |
|---|------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ | | | | | | |
| เคย | 92 | 19.2 | 56 | 34.1 | 36 | 11.5 |
| ไม่เคย | 84 | 17.6 | 48 | 29.3 | 36 | 11.5 |
| ไม่ตอบ | 302 | 63.2 | 60 | 36.6 | 242 | 77.0 |
| จำนวนครั้งของการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา | | | | | | |
| ครั้งเดียว | 34 | 7.1 | 17 | 10.4 | 17 | 5.4 |
| นานๆครั้ง (1ครั้ง/เดือน) | 45 | 9.4 | 29 | 17.7 | 16 | 5.1 |
| บ่อยครั้ง (1ครั้ง/สัปดาห์) | 11 | 2.3 | 6 | 3.7 | 5 | 1.6 |
| เป็นประจำ (ทุกวัน) | 4 | 0.8 | 4 | 2.4 | - | - |
| อื่นๆ(ดื่มมากกว่า 3 เดือน) | 17 | 3.6 | 15 | 9.1 | 2 | 0.6 |
| ไม่ตอบ | 367 | 76.8 | 93 | 56.7 | 256 | 81.5 |

จากตารางที่ 15 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ก่อนมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 19.2 โดยเพศชายมีการดื่มร้อยละ 34.1 และเพศหญิงร้อยละ 11.5 ซึ่งพบว่านักศึกษาไม่ตอบ ร้อยละ 63.2 เป็นเพศชาย ร้อยละ 36.6 และเพศหญิงร้อยละ 77.0

จำนวนครั้งของการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษามีการดื่มนานๆครั้ง (1ครั้ง/เดือน)ร้อยละ 9.4 รองลงมา คือ ดื่มครั้งเดียวร้อยละ 7.1 โดยเพศชายมีการดื่มนานๆครั้ง (1ครั้ง/เดือน)มากที่สุดคือ ร้อยละ 17.7 รองลงมาคือ ดื่มครั้งเดียวร้อยละ 10.4 ส่วนเพศหญิงมีการดื่มครั้งเดียวมากที่สุด คือ ร้อยละ 5.4 รองลงมา คือ ดื่มนานๆครั้ง (1ครั้ง/เดือน) ร้อยละ 5.1 และมีนักศึกษาไม่ตอบ ร้อยละ 76.8 เป็นเพศชาย ร้อยละ 56.7 และเพศหญิงร้อยละ 81.1

ตารางที่ 16 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงในการคุมกำเนิดและวิธีการคุมกำเนิด

| พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ | นักศึกษาทั้งหมด | | นักศึกษาชาย | | นักศึกษาหญิง | |
|--------------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|
| | (n = 478) | | (n = 164) | | (n = 314) | |
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| การคุมกำเนิด | | | | | | |
| ไม่ใช้ | 17 | 3.6 | 9 | 5.5 | 8 | 2.5 |
| ใช้บางครั้ง | 68 | 14.2 | 36 | 22.0 | 32 | 10.2 |
| ใช้ทุกครั้ง | 89 | 18.6 | 55 | 33.4 | 34 | 10.8 |
| อื่นๆ | 5 | 1.0 | 4 | 2.4 | 1 | 0.3 |
| ไม่ตอบ | 299 | 62.5 | 60 | 36.6 | 239 | 76.1 |
| วิธีการคุมกำเนิด | | | | | | |
| ยาเม็ดคุมกำเนิด | 75 | 15.7 | 33 | 20.1 | 42 | 13.4 |
| ถุงยางอนามัย | 122 | 25.5 | 73 | 44.5 | 49 | 15.6 |
| หลั่งอสุจินอกช่องคลอด | 87 | 18.2 | 50 | 30.5 | 37 | 11.8 |
| นับระยะปลอดภัย | 63 | 13.2 | 24 | 14.6 | 72 | 22.9 |
| อื่นๆ | 7 | 1.5 | 4 | 2.4 | 3 | 1.0 |

จากตารางที่ 16 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่มีเพศสัมพันธ์มีการคุมกำเนิดทุกครั้งร้อยละ 18.6 รองลงมาคือใช้บางครั้งร้อยละ 14.2 และไม่มีการคุมกำเนิดเลย ร้อยละ 3.6 มีนักศึกษาไม่ตอบร้อยละ 62.5 โดยที่เพศชายมีการคุมกำเนิดทุกครั้งร้อยละ 33.5 รองลงมาคือใช้บางครั้ง ร้อยละ 22.0 และไม่มีการคุมกำเนิดเลย ร้อยละ 5.5 เพศชายไม่ตอบร้อยละ 36.6 ส่วนเพศหญิงมีการคุมกำเนิดทุกครั้ง ร้อยละ 10.8 รองลงมาคือใช้บางครั้ง ร้อยละ 10.2 และไม่มีการคุมกำเนิดเลยร้อยละ 2.5 และไม่ตอบร้อยละ 76.1

วิธีการคุมกำเนิด ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษามีวิธีการคุมกำเนิดโดยใช้ถุงยางอนามัยมากที่สุดคือ ร้อยละ 25.5 รองลงมาคือหลั่งอสุจินอกช่องคลอด ร้อยละ 18.2 และการใช้ยาคุมกำเนิด ร้อยละ 15.7 โดยพบว่า เพศชายใช้ถุงยางอนามัยมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมาคือหลั่งอสุจินอกช่องคลอด ร้อยละ 30.5 และการใช้ยาคุมกำเนิด ร้อยละ 20.1 ส่วนเพศหญิงมีวิธีการคุมกำเนิดโดยการนับระยะปลอดภัยมากที่สุดคือร้อยละ 22.9 รองลงมาคือการใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 15.6 และการใช้ยาคุมกำเนิด ร้อยละ 13.4 ตามลำดับ

ตารางที่ 17 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาชายและนักศึกษาคหึงกับการตั้งครรภหรือคู่เพศสัฒพันฐเคยตั้งครรภ และการทำแ้ทงหรือคู่เพศสัฒพันฐเคยทำแ้ทง

| พฤติกรรมการมีเพศสัฒพันฐ | นักศีกษาท้งหมด (n = 478) | | นักศีกษาชาย (n = 164) | | นักศีกษาคหึง (n = 314) | |
|---|-----------------------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------|--------|
| | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| การตั้งครรภหรือคู่เพศสัฒพันฐเคยตั้งครรภ | | | | | | |
| เคย | 24 | 5.0 | 16 | 9.8 | 8 | 2.5 |
| ไม่เคย | 154 | 32.2 | 87 | 53.0 | 66 | 21.0 |
| ไม่ดอบ | 300 | 62.8 | 61 | 37.2 | 240 | 76.4 |
| การทำแ้ทง หรือคู่เพศสัฒพันฐเคยทำแ้ทง | | | | | | |
| เคย | 22 | 4.6 | 14 | 8.5 | 8 | 2.5 |
| ไม่เคย | 154 | 32.2 | 88 | 53.0 | 66 | 21.0 |
| ไม่ดอบ | 302 | 63.2 | 62 | 37.8 | 240 | 76.4 |

จากตารางที่ 17 แสดงให้เห็นว่า นักศีกษาเคยตั้งครรภหรือคู่เพศสัฒพันฐเคยตั้งครรภ ร้อยละ 5.0 โดยที่เพศชายมีคู่เพศสัฒพันฐเคยตั้งครรภ ร้อยละ 9.8 เพศคหึงเคยตั้งครรภร้อยละ 2.5 และพบว่า นักศีกษาไม่ดอบ ร้อยละ 62.8 โดยเพศชายไม่ดอบ ร้อยละ 37.2 และเพศคหึงไม่ดอบ ร้อยละ 76.4และ ยังพบว่านักศีกษาเคยการทำแ้ทงหรือคู่เพศสัฒพันฐเคยทำแ้ทง กิดเป็นร้อยละ 4.6 ซึ่งพบว่าเพศชายมีคู่เพศสัฒพันฐเคยทำแ้ทง ร้อยละ8.5 เพศคหึงเคยทำแ้ทง ร้อยละ2.5 และพบว่า นักนักศีกษาไม่ดอบ ร้อยละ 63.8 โดยเพศชายไม่ดอบ ร้อยละ 37.8 และเพศคหึงไม่ดอบ ร้อยละ 76.4